



M15793



LIVRARIA DEMOCRATICA
- DE -
(LOPES DE SOUZA)
121 RUA DE S. JOSÉ 121
RIO DE JANEIRO



22500812699

LIVRA
CJLD
121 R
R

GF 81

DICIONARIO

DE

PLANTAS MEDICINAES BRASILEIRAS

CONTENDO

o nome da planta, seu genero, especie, familia e o botânico que a classificou ; o lugar onde é mais commum, as virtudes que se lhe attribue e as doses e formas de sua applicação

POR

Nicoláo Joaquim Morcira

DOUTOR EM MEDICINA, MEMBRO TITULAR DA ACADEMIA IMPERIAL DE MEDICINA, SOCIO DA IMPERIAL SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUÇÃO E MEMBRO DO CONSERVATORIO DRAMATICO.



RIO DE JANEIRO

Typ. do CORREIO MERCANTIL, rua da Quitanda n. 55.

1862.

5578 103

M15793

WELDON
1777
OV 766
1862
M 83d

Dando publicidade a este pequeno Diccionario feito para meu uso particular, não me passou pela imaginação o menor vislumbre de hombrrear com os Arrudas, os Vellosos, os Freires, e outros illustrados brasileiros que cultivarão ou cultivão ainda a Botanica, esse tão deleitoso, importante e util ramo das sciencias naturaes.

Seria pretenciosidade e até mesmo estravagancia de minha parte querer ostentar-me botanico, quando não tenho as habilitações, nem o cabedal intellectual necessario ao verdadeiro naturalista.

Meu fim foi tão sómente vulgarisar o mais estensamente pssivel o conhecimento das plantas medicinaes indigenas, mostrar a todas as classes da sociedade, bem que em pequeno quadro, quão grandiosa é a materia medica vegetal Brasileira, despertar o amor pelas cousas patrias e commemorar o nome de um brasileiro que mais trabalhou neste sentido o finado lente de pathologia interna o muito illustrado Dr. Silva.

Não acredito apresentar um trabalho de merito ; apenas publico este Diccionario como um eusaio em que devem abundar erros e faltas. Quem conhecer porém a difficuldade da materia e quem souber que uma planta tem differentes nomes em diversos logares, e que outras vezes um mesmo nome indica vegetaes de generos e familias differentes, hade por sem duvida alguma desculpar as incorrecções.

O que mais desejo finalmente como admirador que sou das riquezas do meu paiz é que alguem mais habilitado do que eu tomando por base este meu trabalho, ou mesmo lançando novos alicerces edifique uma obra mais correcta e de maior utilidade e importancia do que a que venho de apresentar-vos.

Dr. N. J. Moreira.



Digitized by the Internet Archive
in 2014

<https://archive.org/details/b20398876>

DICCCIONARIO

DE

PLANTAS MEDICINAES BRASILEIRAS.



A.

Abacateiro. *Persea gratissima*. Gaertner. LAURINEAS. Pará.

Usos. As folhas e os grelinhos são resolutivos, emmenagogos, estomachicos e carminativos, e empregados nas colicas hystericas. Os fructos (abacates) são uteis nas dysenterias, fluxos de sangue, e nas bobas. Tambem são comestiveis misturando-se a polpa, quer com limão ou assucar, quer com sal e pimenta. A nozⁱ do abacate dá uma boa tinta para marcar roupa.

Abacaxi de tingir. *Bilbergia tinctoria*. Martius. BRO-MELIACEAS.

Usos. Fornece uma tinta amarella boa para a tinturaria.

Abajeru'. Veja-se. GOAJURU'

Abaremo-temo. *Mimosa cochliacarpus*. Gomes. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. Suas propriedades são analogas as do *Barbatimão*, de quem parece ser uma especie. Sarmento a preconisava muito, e empregou-a no hospital de Londres. Doze. 2 oitavas para 1 lb. de agua fervendo.

Abati-timbahý. Veja-se JETAHY.

Abatu-y. Vinho preparado com milho.

Abi. Veja-se ABIU.

Ablegna. Licor oleoso que, segundo Pison, mana de uma *Cecropia*, pertencente á familia das *artocarpeas*, e que tem a propriedade de apressar a cicatrisação das feridas.

Abiu. *Lucuma caimito*. *Labatia reticulata*. Martius. SAPOTA-GEAS.

Usos. Os fructos assucarados e gommosos são empregados nas affecções pulmonares.

Abobreira. *Cucurbita potiro.* Personne. *Cucurbita maxima.* Decandole. CUCURBITACEAS.

Usos. As folhas frescas picadas e applicadas sobre as queimaduras são um excellente remedio. As flôres dão um succo considerado como vantajoso nas otites, sobretudo das crianças. O fructo (abobora) é comestivel, quer cosido com a carne, quer preparado em doce. As sementes de algumas especies de aboboras (sobretudo a jerimú) torradas são anthelminticas, efeitadas em emulsão são uteis contra a ischuria.

Abobreira Carneira. Veja-se CABACEIRO AMARGOSO.

Abobreira chila. Variedade da abobreira menina.

Abobreira jerimu'. *Cucurbita melopepo.* Linneu.

Abobreira do mato. Nome pelo qual são conhecidas muitas cucurbitaceas, taes como :

- A momordica purgans.* Martius.
- » *reticulata.* Velloso.
- » *Bryonia tojuzá.* Velloso.
- » *» pilosa.* Velloso.

Abobreira do mato. *Trianospermia ficifolia.* Martius. CUCURBITACEAS.

Usos. A raiz é um poderoso drastico empregado nas hydropesias e derramamentos. Dá-se em pó na dóse de 12 a 24 grãos, e em cozimento na de 1 oitava para 1 lb. de agua. Sendo a raiz fresca duplica-se a dóse.

Abobreira do mato de Goyaz. *Drupana-racemosa.* Manso. CUCURBITACEAS.

Usos. Esta planta pequena e rasteira tem as propriedades purgativas da *Trianosperma*.

Abobreira do mato de Minas. *Wilbrandia drastica.* Martius. CUCURBITACEAS.

Usos. Os mesmos da *Trianosperma*.

Abobreira menina. *Cucurbita pepo.* Linneo. CUCURBITACEAS.
Usos. Os mesmos da *Cucurbita maxima*.

Abobreira moganga. Variedade da abobreira menina.

Abobreira porqueira. Variedade da abobreira menina,

Abrioteiro. *Mammea americana.* Linneo. CLUSIACEAS. Pará.

Usos. O succo leitoso da arvore, e mesmo do fructo misturado com agua de cal é util nas mordeduras de insectos, e nas ulceras. Os fructos (abricots) bem maduros são comestiveis e agradaveis. As amendoas são anthelminticas.

Abutua. Veja-se BUTUA.

Açafrão da India. *Curcuma longa*. Linneo. ZOMOMACEAS.

Usos. O açafrão é empregado como antispasmodico e emmercagogo, tirando-se tambem muita vantagem nas epilepsias. A raiz é um excitante diuretico e digestivo. Em dóse clevada produz embriaguez, somnolencia e delirio. Da-se em infusão na dóse de 18 grãos para 1 libra d'agua. Em pó 18 a 36 grãos. Tintura : 1 escrupulo a 1 oitava. Xarope 1½ onça a 1 onça.

Açafrão indigena. E' o urucu' na Bahia.

Acajaiba. Veja-se CAJUEIRO.

Acaju-cica. Resina do *cajueiro*, muito empregado no Norte pelos encadernadores não só por causa da abundancia e barateza, como tambem por não ser tão atacavel pelo bicho, como são as outras gomas. Tambem é muito util nas henoptisias e em todas as affecções que reclamão os principios gommosos e ligeiramente adstringentes.

Acajurana. *Acajurana pulchra*. LEGUMINOSAS. Pará.

Usos. A casca é amarga e de cheiro nauseante.

Acaricoba. *Hydrocotyle umbellata*. Linneo. II. *bonasiensis*. Lamarck. OMBELLIFERAS.

Usos. O succo fresco da planta é emetico em dóse elevada; em pequena dóse é aperitivo e diuretico. O aroma da ACARICORA é agradável, e seu sabor um tanto acre. A raiz é um poderoso desobstruente das visceras abdominaes. A agua distillada desta planta é empregada contra as sardas.

Acataya. Veja-se HERVA DE BICHO.

Acaya. *Spondias venulosas*, Martius. BURSERACEAS.

Usos. A casca dos pequenos ramos é empregada contra as ulceras da garganta, e contra a diarrhéa, e blenorragia uretral e palpebral. Os caroços contusos e na dóse de 1 oitava para 1 libra d'agua em cosimento são uteis na leucorrhéa.

Achite. Veja-se CAA-TIGUA.

Açóita cavallo. *Luhea grandiflora*. Martius. FILICEAS. Minas Geraes. Rio de S. Francisco.

Usos. Fazem-se fomentações coutra os tumores arthriticos, clysters para as diarrhéas, e injecções contra as leucorrhéas.

Agoutiguepe. Veja-se ARARUTA.

Agrião. *Sisymbrium nasturtium*. CRUCIFERAS.

Usos. Estimulante; aconselhado nas molestias da pelle e no escorbuto. Prepara-se hoje com o agrião um xarope que é julgado de grande efficacia nas affecções broncho pulmonares. Infusão 1 e 1½ oitava para 16 onças d'agua. Succo espresto 2 a 4 onças. Xarope 1½ a 1 onça. Extracto 1 oitava.

Agrião do Pará. *Spilanthus oleracea*. Linneo. COMPOSTAS.

Usos. E' um excitante e antiscorbutico estimavel. Infusão 1 e 1½ oitava para 16 onças d'agua fervendo.

Aguai. Arvore da qual se acredita provir o balsamo chamado — CABUREIRA.

Aguapé. *Villarsia nympheoides*. NYPHACEAS.

Usos. As flôres desta planta brancas côr de lilio são aromaticas. Os fructos são comestiveis. Os banhos feitos com o cosimento desta planta são antihemorrhoidarios. Diminue o appetite venereo.

Aguapé. *Nympha nelumbo*. Pison. NYPHACEAS. Santa Cruz e seus arredores pantanosos

Usos. As folhas são mui empregadas nas erysipelas e nas ulceras vulgarmente chamadas — fornigueiros.

Aguaraciunha-açu. *Tiavidium medium* Pison. *Heliotropium indurum*. Vellozo. BORRAGINEAS.

Usos. E' um bom abstergente e mondificativo contra as ulceras, e empregado nas queimaduras.

Aguarapouda. Veja-se GERVÃO

Aguara-quia. *Solanum oleraceum*. Dunal. SOLANEAS.

Usos. E' calmante applicado sobre as feridas das pernas, e as rhagadas dos seios. As folhas preparadas são comestiveis.

Aguara-quia-açu. *Solanum pterocaulon* Dunal SOLANEAS.

Usos. E' um emolliente, anodino e diuretico, e applicado em cataplasma sobre a bexiga é de utilidade na retenção de urinas. Seus fructos são antidontalgicos.

Aguaxima. Veja-se PERIPAROA Pison.

Agutiguepo-obi. *Thalia geniculata* Linneo CANNEAS.

Usos. A raiz come-se assada, e emprega-se contundida topicamente como mondificativa das ulceras.

Ahouai. *Cerbera Ahouai*. Linneo APOCYNES.

Usos. O succo leitoso desta planta como da sua congenere CERBERA THEVETIA é um poderoso veneno. Em dose pequena produz vomito

tos. Lançando-se um pouco destas plantas no rio, os peixes se embebedão. As nozes desta planta servem para ornar os cinturões que os indígenas trazem, e que agitadas fazem grande bruido.

Ajubatipita. Arbusto. Veja-se Jabotapita

Albara. *Canna angustifolia*? Linneo Canneae.

Usos. As folhas são empregadas como vulnerarias, e d'ahi o nome de — herba dos feridos, pelo qual é conhecida vulgarmente esta planta. Os negros comem as raízes da Albara; e também se acredita serem maturativas.

Albara. Segundo Pison este nome pertence ao — IMBIRI.

Alcamphoreira. *Croton perdicipes*. S. Hilaire. *Croton antispyhiliticus*. Martius. EUPHORBIACEAS. Minas Geraes.

Usos. Empregada como diuretico, e contra a syphiles e mordeduras de cobras. As folhas frescas, piladas ou seccas e pulverisadas favorecem applicadas topicamente a cicatrisação das feridas. As cataplasmas feitas com as folhas frescas da alcamphoreira são mui proveitosas nos bubões e tumores brancos.

Alcassus bravo. Veja-se BOI GORDO.

Alcassus de S. Paulo e Minas. *Periandria dulcis*. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. Os do Alcassus vulgar.

Alcornoco. *Bowdichia major*. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. A casca é adstringente e um pouco amarga e empregada nos rheumatismos, syphiles e hydropesia.

Alcerim bravo. *Hypericum laxius culum*. S. Hilaire. HYPERICINEAS. Rio Grande do Sul.

Uso. A decocção desta planta é empregada contra a mordedura das cobras.

Alcerim do campo. *Lantana microphila*. Martius. VERBENACEAS. Bahia.

Usos. Empregado nos mesmos casos em que é util o Chá de Frade.

Alcerim do mato. *Boccharis sylvestris*. SYNANTHEREAS.

Usos. Esta planta aromática é empregada em banhos como excitante nos rheumatismos e em infusão nos catarrhos.

Alface de cordeiro. Veja-se Herva Benta.

Alfavaca brava. É o jaborandi no Pará.

Alfavaca de cobra. Veja-se JABORANDI.

Alfavaca do campo. *Occimum incanescens*. Martius. LABIADAS.

Usos. E' sudorifica, aromatica e empregada nos mesmos casos do *jaborandi*. Faz-se com ella um xarope bom para o tratamento da coqueluche na dose de 1 a 2 onças por dia. As folhas fritas em oleo e postas nas verilhas são uteis na ischuria.

Alfavaca silvestre. *Occimum silvestre*. LABIADAS. Minas.
Usos. Antispasmodico.

Algodoeiro. *Gossipium herbaceum*. Lamarck. MALVACEAS.
Usos. As flores são emollientes, as raizes diureticas. O cosimento das folhas é applicado contra as picadas dos insectos e das viboras: Das sementes do algodoeiro se tira um oleo doce e bom para luz. Tambem se preparão emulsões peitoraes, e febrifugas. Fazein-se fumigações, injeccões, e tizanas com esta planta para os doencas do systema lymphatico. As folhas maceradas em vinagre e postas sobre a fronte são anti-hemicranicas. Frescas e applicadas sobre os olhos são anti-ophtalmicas. O succo das flores e das folhas é vulnerario. O felpo do fructo (algodão) applicado sobre as queimaduras diminue o ardor e contribue para o curativo. Em Pernambuco, nos casos de menstruações difficeis, favorece-se o corrimento, fazendo-se as mulheres tomarem por seis dias antes do dia usual da menstruação uma chicara de infusão de caroços de algodoeiro. Esta bebida deve ser tomada em jejum.

Ha as seguintes especies que são as mais cultivadas gozando todavia ellas todas as mesmas virtudes medicinaes.

Gossipium arboreum.
" *barbadense*.
" *restifolium*.

Algodoeiro bravo. *Hibiscus bifurcatus*. Lacerda. MALVACEAS. Pará.

Usos. E' emolliente, e suas folhas se comem fazendo-as ferver primeiramente para largarem os espinhos.

Almecegão. E' a resina da *Icicariba*.

Almecegueira. *Bursera balsamifera*. Pers. *Hedivigea balsamifera* Swort. TEREBENTHINACEAS.

Usos. Da segunda casca da ALMECEGUEIRA exuda uma resina liquida espessa, de cor vermelha carregada, acre, amarga e de cheiro forte. E' empregada como estimulante nas affecções thoraxicas na dose de 10 a 15 grãos. No Pará a resina da almecegueira é em tão grande quantidade que os naturaes se utilisão della nos calafetos dos navios e barcos.

Almecegueira da beira do rio.

Usos. Anti-rheumatica e usada contra as ulceras.

Althea do brasil. Veja-se. MALVAISCO.

Amabapaia. Veja-se. MAMOEIRO.

Amapá. APOCYNÉAS. O succo leitoso é branco : a casca levemente amarga ; e as folhas causão prurido no corpo quando o toção.

Ambaia. Veja-se. AMBAIBA.

Ambaia-tinga. *Cecropia palmata.* Pison. URTICACEAS.
Usos. Os mesinos da AMBAIBA.

Ambaiba. *Cecropia peltata.* Linneo. URTICACEAS. Branca ou roxa.

Usos. O succo extrahido dos grelos da *ambaiba* e misturado com leite ou cozimento de cevada assucarado, é empregado ás colheres na leucorrhœa, gonorrhœa, e diarrhœa e menstruação copiosa. A massa do interior do tronco é util nos cancos e ulceras. O xarope preparado com leite da ambaiba branca é util na phtysica. E' nesta planta que vive a preguiça, alimentando-se dos grelos.

Ambauva mansa. *Pourouma cecropiaefolia.* Martius. URTICACEAS.

Usos. O fructo é acidulo doce e mucilaginoso, de grato sabor e apreciado.

Ha ainda 2 especies :

Pourouma acuminata. Martius.

« *bicolor.* Martius.

Ambauva de vinho. Veja-se AMBAUVA MANSÁ.

Ambê. Parasita do Pará.

Usos. Dá as cordas com que se amarrão os feixes de salsaparrilha e produzem suas folhas e cipó um prurido extraordinario nos labios quando estes os toção.

Ambira. Veja-se PINDAHIBA.

Ambu'. Veja-se IMBUZEIRO.

Ambuia-embo. *Aristolochia labiosa.* Martius. ANSTOLO-
CHEAS.

Usos. Os mesmos do *milhomens*. Ha ainda as especies :

Aristolochia rumecifolia. Martius.

» *theriaca.* Martius.

» *antihysterica* do Rio Grande. Martius.

Ameixeira da terra. *Ximenia Americana.* Linneo. OL-
CINEAS.

Usos. O fructo é acidulo adocicado, e tanto elle como a amendoa são comestiveis.

Ameixeira preta. *Prunus Paranaense.* AMYGDALÉAS.

Fructo preto acidulo e refrescante.

Aminuiiu. Veja-se ALGODOEIRO.

Amongeaba. *Panicum spicatum*. Linneo. GRAMINEAS.

Usos. E' empregada em banhos e fomentações como emolliente nas dores e nos tenesmos.

Amor crescido. *Portulaca pilosa*. Lacerda. PORTULACEAS. Pará.

Usos. O succo é empregado nas crysipelas.

Amoreira de silva. *Rubrus brasiliensis*. Martius. ROSACEAS.

Usos. Os fructos gosão das mesmas propriedades que têm as amoras ; tomadas em jejum são uteis na diarrhéa de sangue.

Anabi. *Potalea resinifera*. Martius. LOGANACEAS. Pará e Rio Negro.

Usos. O cozimento das folhas é um anti-opthalmico resolutivo excellente.

Ananaz. *Bromelia ananás*. Linneo. *Ananassa sativa*. Lindley. BROMELIACEAS.

Usos. O fructo maduro é de um aroma agradável, e de gosto acidulo adocicado. Antes de amadurecer é epispatico e póde produzir o aborto. Segundo Labat o succo do ananaz unido ao oleo de amendoas doees é um excellente emminativo. Do ananaz se póde extrahir um lieór vinhoso agradável exeitante e diuretico. O uso do ananaz é proveitoso aos calculosos e aos que soffrem da bexiga. Temos muitas variedades de ananaz e só no Ceará se conhecem 7, sendo a mais bella o Abacaxi do Pará, cujo fructo pyramidal é muito macio, esbranquiçado e de um sabor delicioso. Das folhas do ananaz se tirão filanças que podem servir para confecção de cordas.

Anani. *Leopoldina imperialis*. Cucurbitaceas. Pará.

Usos. O succo é applicado nas contusões.

Andaçu. *Anda brasiliensis*. *Joannesia princeps*. Velloso. *Aleurites brasiliensis*. EUPHORBEACEAS.

Usos. A casca do *Andaçu* é venenosa. As amendoas que o fructo contém são drasticas, e dellas se extrahе um oleo bom para luz. Tambem os indigenas as empregão para embebedar o peixe. Dá-se na dóse de 1 a 3 amendoas ou na de 6 a 8 gotas de oleo.

Andirababajari. Veja-se ANGELIM.

Andira-aibaiariba. Veja-se UMARI.

Andiroba. *Carapa gujanensis* Aubl. Martius. *xilocarpus carapa*. Sprengel. MELIACEAS. Provincias do Norte.

Usos. Seu fructo é julgado anthelmintico. Seu oleo expresso é empregado nas ulceras e empigens.

Angelica do mato. *Guettarda angelica*. Martius. RUBIACEAS.

Usos. A raiz desta planta amarga e um pouco aromatica serve para combatter a diarrrhéa dos bois e dos cavallos.

Angelica do mato. *Gentiana rubra*. GENCIANEAS. Minas Geraes.

Usos. A raiz muito amarga pôde ser um bom succedaneo da *gentiana*.

Angelim amargo. *Andira anthelmintica*. Martius. *Geofra vermifuga*. S. Hilaire. LEGUMINOSAS.

Usos. O pó do angelim é um poderoso e excellente vermifugo e se dá na dóse de 6 a 24 grãos em leite. Em maior dóse obra como drastico energico.

Ha ainda *Andira spinulosa*. Martius.

» *vermifuga*. Martius.

Angelim coco. Veja-se URAREMA.

Angico. *Acacia angico*. Martius. LEGUMINOSAS. Rio Grande do Sul.

Usos. A casca do Angico é amarga e adstringente e dá-se em cosimento na proporção de 2 libras d'agua ou 1 onça da casca contusa. A gomma que se obtem do tronco não cede a gomma arabia em utilidade.

Angico de Minas. *Pithecollobium gummiferum*. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do angico. Sua gomma é identica a senegalense e mui empregada nos sertões de Minas e da Bahia.

Angiroba. Veja-se ANDIROBA.

Anguay. *Mirospermum guaranicicum*. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos da CABUREIBA.

Anguria. Veja-se MELANCIA.

Angustura. E' a LARANGEIRA DO MATO na Bahia.

Anhangapa. Veja-se ANINGA PARI.

Anil trepador. *Cissus tinctoria*. Martius. AMPELIDEAS.

Usos. Tinturaria.

Anima meabecca. *Maranta aquatica*. MARANTACEAS. Pará.

Aninga. *Arum liniferum*. AROIDEAS.

Usos. O succo desta planta é acre e empregado como mondificativo das ulceras atonicas. Usa-se em cataplasmas machucando-se as folhas. O cosimento feito com uma onça de folhas para uma libra d'agua em banhos ou fomentações é util nas dores rheumaticas. 5 a 25 grãos de raiz de ANINGA secca tem dado bons resultados no hydro thorax.

Aninga d'agoa. *Caladium spinescens*. Lacerda. AROIDEAS. Pará.

Usos. As sementes cozidas ou assadas são comestíveis; as folhas applicadas utilmente nas ulceras gangrenosas.

Aninga-iba. Veja-se *Aninga*.

Aninga-pari. *Melastoma parviflora*. Lamarch. *Melastoma coccinea* MELASTOMACEAS.

Usos. As folhas seccas e pulverisadas são empregadas nas ulceras; também frescas e contusas são proveitosas nos mesmos casos.

Aninga-uva. *Philodendron arborescens*. AROINAEAS. Pará.

Usos. Tem as mesmas propriedades que a *Aninga*.

Anna Pinta. E' em Minas a purga de Carijó — *Cayaponia globosa*.

Aperta Ruão. *Piper aduncum*. Velloso. PIPERACEAS.

Usos. Adstringente muito empregado em banhos. Internamente obra também como descobstruente.

Apogya. E' a *Psychotria emetica* no Espírito Santo.

Apogitagoara. *Esenbeckia intermedia*. Martius. RUTACEAS. S. Paulo.

Usos. A casca desta planta é ante-febril.

Apuy. *Ficus*. Urticaceas. Lacerda. Pará.

Usos. O succo leitoso e as folhas são empregadas como calmantes.

Apostemeira. *Turnera fatida*. PORTULACEAS. Maranhão.

Usos. E' empregada para apressar a supuração.

Apotiacoraoa. Euphorbiacea. Pará.

Ha duas especies: a 1.^a é empregada em cosimento na tosse secca a 2.^a é anti-ophtalmica.

Araboutan. Veja-se IBIRAPITANGA. Lery.

Araça-guaçu. Veja-se GUAÍABA.

Araça-rana. Arvore que nasce pelas margens dos rios do Pará e cuja raiz serve de alimento as tartarugas.

Araçazeiro. Nome de diversas plantas pertencentes ao genero *Psidium* da familia das MYRTACEAS, gozando todas das propriedades da guaiabeira, sendo todavia os fructos menores, mucilaginosos, acidulos e refrescantes.

« Araçazeiro do campo. *Psidium mediterraneum*.

« Araçazeiro de pedra. *Psidium petrosum*.

« Araçazeiro de Pernambuco. *Psidium pubescens*.

« Araçazeiro da praia. *Psidium albotum*.

« Araçazeiro de S. Paulo. *Psidium incanescens*.

Aracui. Nome do Angelim amargoso em algumas provincias.

Arapabaca. *Spigelia anthelmintica*. Martius; SPIGELIACEAS.

Usos. E' uma planta que se acha collocada entre as plantas venenosas porém que com cuidado se pôde prescrever como anthelmintico.

Arara-canga. *Aspidos permum*. APOCYNÉAS. Maranhão.

Araroba. Pó grosso tirado de uma Leguminosa (Arariba?) servindo para a tinturaria e empregado nas molestias herpeticas.

Araruta. *Maranta arundinacea*. Linneo. CANNEAS. Marantaceas.

Usos. Os indigenas chamão esta planta Agoutiguepe; e acreditão que a secula applicada nas feridas feitas pela settas ervadas absorve o veneno.

Araticum. *Anona muricata*. Martius. ANONACEAS. Planta cultivada.

Usos. Suas folhas e fructos são bechicos. $\frac{1}{2}$ oitava do fructo fervido com $\frac{1}{2}$ libra d'agua tomado ás chicaras é um excellente remedio na diarrhea e dysenteria. Fazem-se tambem clysteres, e applicão-se as folhas sobre o ventre. As folhas pizadas e mixturadas com oleo são maturativas. Dos fructos se pôde extrahir vinho.

Araticum-apé. *Anonapisonis*. Martius. ANONACEAS.

Usos. Os mesmos do Araticum cultivado. Esta especie dá uma embira que preparada em corda é de uma duração admiravel, ainda mesmo exposta ao tempo.

Araticum-cagão. Veja-se Araticum-paná.

Araticum do mato. *Rollinia silvatica*. Martius. *Anona sylvestris*. Velloso. ANONACEAS. Rio Grande do Sul. S. Catharina.

Usos. Os mesmos do ARATICUM cultivado, menos o de ser comestivel.

Araticum-paná. *Anona palustris*. Linneo. Martius. ANONACEAS.

Usos. Além das propriedades geraes do araticum, este tem mais a anthelmintica.

Araticum-ponhé. *Anona marcgravii*. Martius. ANONACEAS.

Usos. Os mesmos do araticum cultivado.

Araticum do rio. *Anona spinescens*. Martius. ANONACEAS.

Usos. Tem as mesmas propriedades do araticum, porém é mais empregado o seu fruto em cataplasmas, ou para limpar as úlceras, ou amadurecer abcessos. As sementes pulverisadas servem para combater topicamente o phthiriasis infantilis.

Araticum de Santa Catharina. *Rollinia salicifolia*. ANONACEAS.

Usos. Os mesmos das outras especies.

Argemonia. *Argemonia mexicana*. PAPAYERACEAS.

Usos. Os nossos indigenas empregão as folhas da ARGEMONIA no curativo das úlceras sobre tudo syphiliticas. O oleo é considerado purgativo como o de ricino, bastando 30 gotas para o effeito cathartico que se manifesta 5 horas depois da ingestão do remedio. O succo é anti-herpético, e o cosimento das sementes é empregado contra aqueda dos cabellos.

Argueiro. Desconheço o genero, apenas julgo que é uma leguminosa. Arvore da altura de uma oliveira, e é uma das mais lindas do Brasil. Espinhosa, produz por fructo uma vagem contendo uns feijões escarlates, ou manchados empregados pelos indigenas na confecção de braceletes.

Aroeira. *Schinus areira*. Velloso. TEREBENTHINACEAS.

Usos. A casca desta arvore é adstringente e empregada pelos pescadores para fortalecer os fios das redes. O extracto póde supprir o cato. Dá-se o extrato em pillulas e a casca em cozimento 2 oitavas para 1 lb. de agua. De suas folhas frescas se póde preparar uma agua distillada propria para o toilette. Tambem é tida esta planta por anti-febril.

Aroeira do campo. *Astronium*. TEREBENTHINACEAS.

Usos. Os mesmos da aroeira ordinaria e fornece uma pesadissima e indistructivel madeira.

Aroeira de Minas. *Schinus mucronulatus*. Martius. ANACARDIACEAS.

Usos. Os mesmos das outras especies de aroeiras.

Arrebenta cavallo. *Solanum arrebenta*. Velloso. SOLANEAS.

Arringa-iba. *Caladium arborescens*. Linneo. AROIDEAS.

Usos. Arbusto muito acre. Suas folhas são empregadas em cataplasmas resolutivas. Sua raiz fornece uma fecula amilacea. O cozimento deste vegetal feito em urina é empregado nas dores articulares.

Arriozes. Nome portuguez dado ao *Juquirionano*.

Arroz. *Oryza sativa*. Linneo. GRAMINEAS. Por todo o Brasil.

Usos. E' um alimento de facil digestão, e proprio aos doentes e convalescentes das molestias inflammatorias. Cozinhando-se o arroz, e deixando de um dia para outro, e juntando-se um pouco de limão e assucar, forma-se o conhecido — *aloá* — bebida assaz refrigerante, e proprio dos paizes quentes. O arroz presta-se a milhares de confeções que seria ocioso lembrar.

Arroz do mato. *Oryza subulata*. Martius. Nees. GRAMINEAS.

Usos. Os mesmos do arroz cultivado, porém não é tão delicado.

Arroz silvestre. Veja-se *Arroz do mato*.

Arruda do mato. *Pelocarpus officinalis* Aubl. RUTACEAS. Maranhão.

Usos. Emprega-se como excitante em banhos.

Arvore do alho. *Cerdana alliodora*. Cordeá? BORRAGINEAS.

Usos. Sua madeira e folhas tem um cheiro eminentemente alliaceo, e são usadas em banhos como estimulantes.

Arvore da lâ. Veja-se BARRIGUDO.

Arvore do papel. Veja-se PÃO-PAPEL.

Arvore do pão. *Artocarpus incisa*. Linneo. *Artocarpeas*.

Usos. Seus fructos que são globulosos, esverdinados por fóra e do tamanho da cabeça de um homem, contém uma polpa branca que se torna amarellada quando madura. Este fructo encerra uma grande quantidade de amido. O fructo se come cosido ou assado, e isto antes de sua madureza completa. As sementes se comem do mesmo modo. A casca desta arvore batida e preparada, serve para fazer tecidos. Tres arvores do pão bastão para sustentar um homem. Tambem se faz das amendoas uma emulção que se assucára, e se emprega nas gonorrhéas.

Arvore triste. Veja-se AÇAFROEIRA.

Assacu'. *Hura brasiliensis*. EUPHORBIACEAS. Pará, Rio-Negro.

Usos. O succo leitoso é anthelmintico, embriaga os peixes, e foi julgado (e ainda é no Pará) como um poderoso remedio contra a elephantiasis dos gregos. A casca do tronco em banhos tambem goza da mesma virtude.

Assa Peixe. *Bohemeria caudata*. Sw. *Eupatorium altissimum*. URTICACEAS.

Usos. Empregada em banhos nos ataques hemorrhoidaes e como diuretico na dose de $\frac{1}{2}$ oitava para uma libra d'agua em cosimento.

Atcha. *Begonia*. Eynes. *Arum*. S. Hilaire. BEGONIACEAS. ARVIDEAS.

Usos. A raiz assada tem o gosto do aypins e é mui apreciada pelos Botocudos.

Avaramo. *Mimosa unguis cati*. Linneo. Pison. LEGUMINOSAS.

Usos. A casca é amarga e dessicativa e empregada contra as ulceras antigas, canchros e febres. Duas oitavas para uma libra d'agua fervendo.

Avaty. Veja-se Milho grosso.

Avenca Brasillense. *Adiantum risophyllum*. FOLIACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Succedanea da Capillaria.

Ha innumeraveis especies.

Na Bahia se empregão as especies do genero *Acrosticum*.

Acrosticum calometanum.

Acrosticum aureum.

Hoje chamadas pelos botanicos — *Gymnogramma calometanum* e *Gymnogramma sulfurea*.

Avenquinha. *Acrostichum calometanum*. FOLIACEAS.

Usos. Peitoral.

Ayapana. *Eupatorium ayapana*. Vent. COMPOSTAS. Provincias do Norte.

Usos. A infusão das folhas é sudorifica e um poderoso remedio contra as mordeduras de cobras. E' empregada na cholera. O succo misturado com leite de peito é bom para as belides, e dôres de ouvido.

Ayapana cotonosa. *Euphorbia corollifolia*. Linneo. EUPHORBIA-CEAS. Rio Negro.

Usos. E' usada em cataplasma contra os condylomas syphiliticos. O succo é um poderoso veneno no qual molhão as pontas das flechas os indigenas do Rio Negro. Tambem serve para embriagar os peixes.

Aypim. *Manihot aypim*. EUPHORBIA-CEAS. Especie de mandioca que não tem a qualidade venenosa desta.

Usos. Come-se a raiz assada ou cozida, não sendo sua farinha igual a de mandioca. Julga-se que é peitoral.

Azedinha do brejo. *Begonia acida*. Velloso. *B. ulmefolia*. Linneo. BEGONIA-CEAS.

Usos. O succo é acidulo refrigerante e anti-corbutico, e empregado nos catharros da bexiga e nas dysenterias.

Tambem a planta fresca cozida é comestivel.

Ha ainda as especies. *Begonia bidentata*. Raddi.

" *sanguinea*. Raddi.

" *cucullata*. Wild.

" *hirtella*. Link.

" *undulata*. Otto.

" *platanifolia*.

Azogue dos pobres. Veja-se. VELAME.

B.

Baba de boi. Veja-se COQUEIRO BABA DE BOI.

Babosa. *Aloes vulgaris*. Lamarck. *Aloes barbadensis*. A *perfoliata*. Velloso. LILIACEAS.

Usos. As folhas são emollientes e resolutivas topicamente applicadas. A polpa bem lavada passa por vulneraria e anti-ophtalmica. A folha da babosa despida da cuticula, lavada e partida em pedacinhos é um suppositorio calmante nas retites hemorrhoidarias. O succo tomado internamente é drastico. Na Bahia faz-se um extracto do succo da babosa, que é empregado como anthelmintico. O cozimento das folhas seccas é emolliente e refrigerante.

Bacamarte. Desconheço o genero e a familia.

Usos. E' aperitiva e desobstruente mesmo externamente applicada

Bacorão. Veja-se *Apotiacoraoa*.

Bacuri. *Platonia insignis*. Martius. *Moronobea esculenta*. Arruda. CANNELACEAS.

Usos. Fructos comestiveis.

Bacuri-membeca. Arvore que nasce pelas margens dos rios e nos lugares humidos. Seus fructos são azedos, porém os indigenas não os rejeitão.

Bacurupari. Veja-se BACURI.

Bafureira. Veja-se CARRAPATEIRO.

Baga da praia. *Coccoloba uvifera*. Linneo. POLIGONEAS.

Usos. O fructo fornece um extracto adstringente que póde ser empregado nas diarrheas e leuchorreas. O fructo é vermelho e carnoso; e come-se com assucar; delle se póde tambem preparar uma especie de vinho.

Ha ainda a especie —*Coccoloba crescentiaefolia*. Cham.

Bananeira Maça. Variedade da bananeira de S. Thomé. O fructo é pequeno, e tem o gosto da maça.

Bananeira do Maranhão. O fructo é grande e de casca roixa.

Bananeira do mato. *Canna brasiliensis*. MARANTACEAS.

Usos. As sementes são redondas, duras e pretas, e servem para contas de rozarios. A planta dá uma hoa tinta vermelha. A raiz é diuretica e anti-blenorrhagica. As folhas pisadas e depois cozidas constituem uma cataplasma emolliente.

Bananeira do Taiti. Tem o dorso da folha violeto, e a casca do fructo é quasi prela.

Bananeira da terra. *Musa sapientum.* MUSACEAS.

Usos. Seus fructos são comestiveis, e agradaveis cozidos ou assados e cobertos com manteiga, assucar o canella. Tambem se pôde utilizar a sua seiva e folha, como as da bananeira de S. Thomé. E' considerada como antidoto do veneno das cobras.

Bananeira de S. Thomé. *Musa paradisiaca.* MUSACEAS.

Usos. As folhas são empregadas em banhos na urticaria e nos engorgitamentos dos testiculos e inchações chronicas das pernas. A seiva dá-se em clysteres nas hemorragias anaes e no prolapso do anus; dissolvida na agua é util nas aphtas das creanças. O fruto (banana) é agradável, nutritivo e muito usado entre o povo como alimento da primeira infancia. As bananas verdes e pisadas são empregadas no curativo dos formigueiros; maduras, assadas e misturadas com azeite doce são maturativas. Cortado á noite o tronco da bananeira alguns palmos acima da superficie da terra, feita uma pequena cavidade na parte fixa, e enchendo-se aquella de assucar, encontra-se pela manhã uma especie de xarope formado pela união da seiva e do assucar. Este xarope que se dá na dose de 1 colher de sopa 3 vezes por dia, é considerado pelo povo um valente remedio contra as leucorreas. Finalmente os involucros interiores do tronco podem substituir o palmito (e o substituem); o regime serve para alimentação dos animaes e da filaça se pôde fazer corda, papel, etc.

Barauna. *Melanoxylon Brauna.* LEGUMINOSAS.

Usos. Grande arvore para construcção, e fornece uma tinta rubra fusca.

Barba de bode. *Chaetarea pallens.* GRAMINEAS.

Usos. Aperiente e diluente tanto internamente, como em cataplasmas sobre o figado

Barba de boi. *Remirea maritima.* Aublet. CYPERACEAS.

Usos. Sudorifico e diuretico.

Barba de velho. *Tillandsia usneoides.* Linneo. BROMELIACEAS.

Usos. Esta planta parasita e filamentosa pisada e misturada com um pouco de banha fresca constitue um bom unguento anti-hemorroidal topicamente applicado. Como adstringente o povo emprega a planta em saquinhos nas hernias, collocando-os e mantendo-os sobre o anel inguinal. E' mui aproveitavel para ninhos de aves, e pôde servir para a confecção de cordas.

Barbasco. *Buddleja brasiliensis.* B. australis. Velloso. SCROPHULARINEAS.

Usos Mucilaginosa e levemente amarga esta planta é empregada nas affecções peitoraes. Os clysteres de barbaço ou os banhos feitos de seu cosimento são antihemorrhidarios. Raiz ou folhas 1 oitava para 16 onças de infusão.

Barbatimão. *Stryphnodendron barbatimão*. Martius. *Acacia adstringens*. Reise. LEGUMINOSAS.

Usos A casca é amarga e adstringente, e empregada no cortimento de couros, nas hernias, hemorrhagias, diarrhéa, leucorrhéas, etc. As prostitutas se servem do cosimento desta planta para fortalecer e entesar as carnes. O pó modifica os cancos e ulceras de máo character. A infusão se faz com 2 oitavas para 1 libra d'agua.

Barriguda. *Chorisia ventricosa*. Martius.

Usos. Do tronco desta planta se fazem pirogas, e dellas se servem os Botocudos para preparar os tacos que introduzem nos beiços e nas orelhas. O fructo é uma especie de pepino que quando abre deixa ver uma bellissima lá de côr branca que se emprega em travesseiros e colchões.

Baru'. *Dipterix pteropus*. Martius. LEGUMINOSAS. Províncias centraes do Brasil.

Usos. As sementes são de um aroma agradável e applicadas nos mesmos casos do CUMARU'.

Basoura. *Buddleja connata*. Martius. Pison. SCROPHULARINEAS.

Usos. Os mesmos do Barbaço.

Batata doce. *Convolvulus edulis*. CONVULVULACEAS.

Usos. As folhas servem para alimento dos porcos e cabras. Os tuberculos que são brancos, amarelllos, roxos ou encarnados, são uma bella e agradável comida tendo o inconveniente de serem flatulentos. Tambem servem para doces.

Batata ingleza. *Solanum tuberosum*. Linneo. SOLANEAS.

Usos. As folhas, as flôres e as bagas são sedativas e narcoticas, e uteis nas nevralgias, rheumatismos e catarrhos chronicos. O tuberculo é emolliente e analeptico: Raspado e triturado serve para cataplasmas contra queimaduras. O pó bem secco applica-se nas ligeiras escoriações, e no intertrigo das creanças. A batata quer cosida quer crua (principalmente) é um poderoso antiscorbutico:

Batata do mar. Veja-se SALSA DA PRAIA.

Batata de purga. *Piptostegia Gomesii*. Martius. *Convolvulus operculatus*. Gomes. CONVULVULACEAS. Minas

Usos. Raiz tuberosa drastica. Dá-se na dóse de 1½ a 1 oitava da raiz e de 1 a 2 escrupulos da resina,

Batatinha. *Cypellac cathartica*. Iridias.

Usos. Os mesmos do Maririçô.

Baunilha: *Epidendron vanilla*. *Vanilla aromatica*. Linneo. ORCHIDEAS. Pará. Maranhão.

Usos. Emmenagoga e aphrodisiaca 2 a 6 grãos em infusão, 15 grãos até 1 oitava do fructo pulverisado. Tintura 1½ a 1 oitava. Xarope 1½ a 1 onça em poções.

Baunilha da Bahia. *Vanilla palmarum*. ORCHIDEAS.

Usos. Applicada nas febres adynamicas e nas nevroses.

Beijociro. Veja-se ESTORAQUE.

Beiju'. Bolos chatos ou laminas encanudadas que se fazem da massa da mandioca ralada e levada ao forno. Ha diversas especies.

BEIJU' MEMBECA. Quando tem a consistencia do pão de ló.

BEIJU' PUQUEQUA. Se leva sal, e vai ao forno estendido em folha de pacobeira.

BEIJU' CURUBA. Quando se mistura com castanha do Maranhão.

BEIJU' GUAÇU. Quando o torrão bastante afim de poder servir para a confecção de vinhos ou aguardente.

BEIJU' CICA. Quando a massa é de mandioca secca e muito pura.

BEIJU' TEYCA. Quando é feito de tapioca.

Beldroega. *Portulaca oleracca*. Linneo. PORTULACEAS.

Usos. A planta é comestivel. Suas folhas soccadas e postas sobre as ulceras são deterrentes; cosidas formão um apposito antihemorrhoidario; a agua de sua cocção é diuretica e lactifera, o sumo antiophthalmico, e as sementes preparadas em xarope são anthelminticas.

Ha ainda as duas especies. P. *radicans*. Martius.

« *patens*. Velloso.

Benção de Deos. *Abutilon esculentum*. S. Hilaire. *Sida ecornis*. Velloso. MALVACEAS.

Usos. As flores e os fructos ainda verdes e cosidos são agradaveis.

Beringela. *Solanum ovigerum*. Dunal. *S. macrocarpum*. Macgrave. SOLANEAS.

Usos. E' um fructo comestivel preparado de diversos modos pela cocção. Tambem acredita-se que a *Beringela* activa a secção urinaria e destroe as arêas da bexiga.

Beririco. Veja-se. MARIRICO.

Betre. Veja-se. BETYS

Betys. *Piper eucalyptifolium*. PIPERACEAS.

Usos. O cosimento das folhas ou da raiz é um bom calmante das colicas ventosas.

Bleuiba Redonda. *Myristica officinalis*. Martius. MYRISTICAEAS. Minas. Rio de Janeiro.

Usos. Se o fruto é aromático e ligeiramente amargo. Suas sementes fornecem o óleo de bicuiba, conhecido como eficaz nos reumatismos, nos tumores arthristicos Martius diz que a BICUIBA é proveitosa nas colicas e nas dyspepsias. O fructo da bicuiba em quantidade de 2 onças póde matar.

Bilimbi. *Averrhoa bilimbi*. Linneo. TEREBENTHINACEAS. OXALIDEAS ?

Usos. O fruto do bilimbi mais agreste do que o do caramboleiro, é comtudo empregado nos mesmos casos.

Boas Noites. Veja-se Maravilha.

Boi Gordo. *Cassia rugosa*. Vogel. *C. fruticosa*. Manso. LEGUMINOSAS. Minas.

Usos. Os mesmos do fedegoço. Segundo Manso purga na doze de ½ onça, e fornece um bella tinta amarella.

Ha ainda as especies :

Cassia splendida. Vogel :

« *laevigata*. Vogel.

Bolsa de Pastor. Veja-se Braço de Preguiça.

Bonina. Veja-se Maravilha.

Bordão de Velho. Não conheço o genero nêem mesmo a planta.

Usos. E' adstringente.

Borore. Veneno com que os indigenas hervão as flexas; é extraído de raizes de certas plantas que nascem em lagos e pantanos. Sua preparação é mui perigosa e por este motivo é sempre uma velha quem della se encarrega. Alguns authores acreditão ser o *borore* o *curare* hoje conhecido, e que Humboldt suppoz ser um strychnos. O sal e o assucar são tomados como unicos posto que fracos antidotos do *borore*.

Borracha. Esta resina leitosa póde ser fornecida por muitas plantas pertencentes as 4 familias seguintes .

Euphorbiaceas,

Artocarpeas.

Apocyneas.

Lobeliaceas.

Borracha. No Pará e em todo o extremo Norte do Brasil se extrahe o caoutchou da

Siphonia elastica. Originaria da Guayana.....

Siphonia brasiliensis Wild.

Hancornia speciosa Gomes.....

{ EUPHORBIACEAS.

Usos. E' empregado nas artes, e em medicina como antiphtysica. 2 a 6 e mais grãos em pilulas.

Borracha chimarona. *Echium plantagineum*. BORRAGINEAS. Rio Grande do Sul e Montevidéo.

Usos. Toda a planta. E' succedaneo da consolida $\frac{1}{2}$ oitava para libra e $\frac{1}{2}$ d'agua fervendo. Xarope 1 a 2 onças.

Boruleo. *Borulea campestris*. URTICACEAS.
O fructo é avermelhado.

Braço de preguiça. *solanum cernuum*. Velloso. SOLANEAS. Minas, Parahyba no Rio de Janeiro.

Usos. Empregado como sudorífico na sarnas e na syphilis, gonorrhéa etc. o cosimento das folhas e flores. Externamente em banhos nas ulceras. Ha mais a especie. *Solanum caavurana*.

Brazileto. *Cesalpina brasiliensis*. Linneo. LEGUMINOSAS.
Usos. Fornece o pão ohamado brazileto.

Brincos de Sahoim. *Phthecollobium avaremotemo*. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do angico.

Bucha. *Luffa purgans*. Martius. CUCURBITACEAS.

Usos. Seu extracto póde substituir o da COLOQUINTIDAS, e é empregado nas hydorpesias e opthalmias. A doze de 3 oitavas é cathartica; mais elevada torna-se emetica.

Ha ainda a *Momordica luffa*. Vellozo.

Bucha dos paulistas. *Momordica operculata*. Linneo. MINAS. CUCURBITACEAS.

Usos. E' empregado o fructo nas anasarcas, chloroses, amenorrhéas, e affecções herpeticas. Infunde-se o fructo por espaço de 12 horas agitando-se algumas vezes até escumar. A dose é de 1 colher de 1½ em 1½ hora até vomitar ou evacuar. O extracto é dado na dose de 3 grãos.

Buchinha. *Momordica purgans*. Martius. CUCURBITACEAS.

Usos. Os fructos são muito mais pequenos do que os da Bucha e tem mais acrimonia e actua em menor dose. 3 grãos de extracto é um forte purgante.

Buranhem. *Chrysophyllum buranhem*: Riedel. SAPOTACEAS.

Usos. A casca desta planta é doce e ligeiramente adstringente, e no estado fresco um pouco leitosa. E' empregada contra a leucorrhœa, a diarrheia e as hemoptisias. O cozimento é útil nas inchações que são a consequencia das erysipelas. 12 a 34 grãos de extracto. Xarope 1 a 2 onças Tintura 1 a 2 oitavas. Externamente 1 onça da casca para 1 lb. de agua em cozimento.

Butua. *Cocculus cinerascens*. Saint-Hilaire. MENISPERMEAS.

Usos. A raiz é amarga fondente tonica e empregada nas hepatites chronicas e dyapepsias. 2 oitavas para 1 lb. de agua fervendo.

Ha duas qualidades, uma tem a raiz grossa nodosa e dura, é a que acabamos de indicar, a outra é delgada, liza e branda, e conhecida em Minas e no Espirito-Santo por Ciparabo e Parreira braba.

Ha as seguintes especies :

Cocculus platyphylla. Saint-Hilaire.

» *martii*. Saint-Hilaire. Pará e Rio Negro.

» *rufescens*. Aubl.

» *imene*. Martius.

» *patini*. Martius.

Butua miuda. *Cocculus filipendula*. Martius **MENIS PERMEAS.** Minas.

Usos. Os mesmos da Butua ; e é empregada tambem a raiz contra a mordedura das cobras. 2 oitavas para 1 lb. de agua fervendo.

Butua do corvo. *Cochleospermum insigne*. Saint-Hilaire. *Maximiliana regia*. Martius.

Usos. Emprega-se contra as dores, as quedas e os abcessos. 2 oitavas para 1 lb. de agua fervendo.

Caa. Nome do *solanum tabaciforme* de Velloso.

Caa. Herva mate.

Caa-assu. *Malpighea rosea* Lacerda. **MALPIGHEACEAS.**

Usos Serve para tingir os fios para as redes dos pescadores.

Caa-ataya. *Vandellia diffusa*. Linneo. Pison. **SCROPHULARINEAS.**

Usos. Esta planta amarga e mucilaginosa é empregada como purgativa e diuretica, e util nas febres intermitentes e hepatites chronicas.

Caa-Cama. Veja YQUETAIA.

Caachira. *Indigofera domingensis* Ind. *brasiliensis*. Spreng. **LEGUMINOSA.** Pernambuco, Maranhão e Pará.

Usos. Fornece uma especie de tinta de cor cerulea.

Caacica. *Euphorbia capitata*. Lamarck. *E. pilulifera*. Linneo. **EUPHORBIACEAS.**

Usos. E' muito estimada como antidoto do veneno das cobras e das vitoras sobretudo. Socada e applicada fresca sobre a ferida não só calma as dores como neutralisa o veneno. Internamente se dá em pó suspenso em um liquido qualquer.

Caa-cua. Veja-se. YQUETAIA.

Caa-cuis. Folha do mate ainda em borbulha.

Caa-etimay. E' uma *singense* cujas folhas cosidas são empregadas contra as sarnas.

Caaguiguyo. Veja-se. *Aninga pari*.

Caa-jandiwap. Veja-se. *Loco*.

Caa-mena. Folha do *mate* desenvolvida.

Caamembeca. *Polygala Paraensis*. Castro. POLYGALEAS. Pará.

Usos. Refrigerante, ante-hemorroidal. Dá-se na dose de 1 onça para 1 libra d'água.

Caa-peba. *Cissampelos glaberrima*. S. Hilaire. MENISPERMEAS.

Usos. Sudorífico, aromático estomacal. A infusão da raiz bebida pela manhã é proveitosa na asthma.

Caa-pia. *Dorstenia brasiliensis*. Lamarch. URTICACEAS.

Usos. Os mesmos da contraerva.

Caaopía. *Vismia gujanensis*. Personne Hypericineas.

Usos. O succo gomme resinoso e vermelho alaranjado ó drástico na dose de 3 a 4 grãos, em uma emulsão de amendoas.

Ha ainda a *Vismia micrantha* Martius.

Vismia saccifera Martius.

Caa-pomonga. Veja-se *Loco*.

Caa-ponga. *Phloxerus vermiculatus*. AMARANTHACEAS.

Usos. Os mesmos do CARURU'.

Caataia. Veja-se. *Herva de Bicho*.

Caa-tigua. *Trichilia catigua*. S. Hilaire. MELIACEAS

Usos. Dá uma cor escarlate propria para tinturaria

Caavurana. *Solanum arborecens*. Vel. SOLANEAS. Cabo-Frio. Piahy.

Usos. Produz uma especie de anil de qualidade superior, e é empregada na morphea em banhos.

Cabaceiro. Nome dado a diversas variedades de cucurbitaceas, e que são umas doces e comestiveis, outras amargas e perigosas.

Cabaceiro amargoso. *Cucurbita leucantha*. Linneo. *La-genaria vulgaris*. *Serronia*. CUCURBITACEAS.

Usos. Costumão dar a polpa do cabaco fructo do cabaceiro em clysteres na dose de 2 oitavas na obstrucção das visceras, na melancolia, e na chlorose. Em dose elevada produz hemorragias mortaes. O cosimento da polpa é aconselhado nas inchações das pernas. Suas folhas applicadas sobre o ventre das parturientes apressão o parto.

Cabacinho. *Dermophylla pendallina*. Manso. CUCURBITACEAS. Minas e Pernambuco.

Usos. Depurativo empregado contra os dartros. A dose da raiz secca: é de 1 oitava 2 a 4 sementes, ou em infusão a polpa de meio fructo. Um escravo do senador Vergueiro curou-se de uma affecção leprosa fazendo continuo uso do cosimento das folhas do cabacinho.

Cabeça de frade. Fructo amylaceo comestivel da *Villarsia nymphovides*.

Cabello de negro. *Erytroxylon campestre*. S. Hilaire. ERYTHROXYLEAS. Minas.

Usos. O lenho ou casca da raiz fervida em agua forma uma bebida purgativa.

Cabelluda. *Eugenia tomentosa*. MYRTACEAS.

Usos. O fructo acido assucarado e refrigerante.

Caburaia. Veja-se Cabureiba. Pison.

Cabure-iba. *Myrocarpus fastigiatus*. LEGUMINOSAS Freire Al-lemão.

Usos. Além de ser uma madeira optima para construcções, destilla a *Cabure-iba* uma resina de aroma fragrantissimo mui empregada e couhecida pelo nome de *cabureicica*.

Cabureicica. Resina fornecida pela *cabureiba*.

Cachabu. Especie de cardo tomado por muitos como Jara-catia.

Cacaozeiro. *Theobroma cacao*. BUTHENERIACEAS.

Usos. E' um excellent nutritivo e analeptico empregado debaixo da fórma de chocolate na convalescença, marasmo e phthisica. A pom-mada preparada com o oleo do fructo é um optimo antihemorrhoidario O cosimento da casca é antidysenterico.

Cachibou. Resina fornecida pelo *Pão de porco*.

Cachim. *Sapiumilicifolium*. Wild. EUPHORBIACEAS.

Usos. 2 ou 3 amendoas são um poderoso purgante.

Cachim. Nome com que em alguns logares se designa a *bor-racha*.

Caculucage. Veja-se. Quitoco.

Cafezeiro. *Coffea arabica*. RUBIACEAS. Rio de Janeiro e Minas.

Usos. O cozimento das folhas do CAFEZEIRO é empregado com van-tagem nos engorgitamentos chronicos dos testiculos e dos membros. A infusão das sementes é julgada anti-arthritisica. O pó das sementes não

torradas é anti-febril. O café torrado é de um uso quotidiano, e considerado estimulante e estomachico. É de grande soccorro nos envenenamentos pelos narcoticos, útil nos casos de somnolencia e embriaguez, e é empregado muitas vezes na asthma, coqueluche e enxaqueca. Infusão; 1 onça para 1 libra d'agoa. Café não torrado em pó 24 grãos de hora em hora na apyrexia; em cozimento 1 onça para 1 ½ libra d' agoa reduzida a 1 libra.

Caferana. *Tachia gujanensis*. Aublet. GENTIANEAS. Rio Negro.
Usos. Raiz amarga e tónica; planta trepadeira.

Cagaiteira. *Eugenia dysentherica*. MYRTACEAS.
Usos. Os fructos são assucarados, adstringentes e anti-dysentericos.

Caha-xio. *Laurus*. LAURINEAS. Norte.
Usos. Aromatico e empregado como excitante.

Caiacia. Veja-se CAACICA.

Cainana. Minas Veja-se CAINCA. Rio de Janeiro.

Cainca do Brasil. *Chiococca racemosa*. Jacq. RUBIACEAS.
Usos. A casca é amarga e um pouco adstringente. A infusão da raiz tem um cheiro nauseante e diuretica e purgativa e se dá em dose pequena: em dose elevada promove vomitos ameadados. É empregada nas hydropesias, apoplexias, demencias, rheumatismo e syphilis. O Sr. Dr. Meirelles a supõe optima contra a pica que soffrem os pretos e contra a amenorrhéa. Langsdorff a considera como sialagogica e desobstruente e a applicava em pó nas ulceras de máo character. A dose é de 20 grãos em pó; 2 oitavas em decocção; 15 grãos em extracto; 36 gotas em tinctura.

Agua de parietaria 4 onças.

Extracto de cainca 20 grãos.

Xarope aperitivo. 1 onça.

1 colher todas as horas nas hydropesias.

Cairussu. *Hydrocotele triflora*. OMBELLIFERAS.
Usos. Aperitiva.

Caité. *Canna aurantiaca*. Rosc. MARANTACEAS.
Usos. O cosimento da raiz é calmante e empregado nas gonorrhéas. Socada a raiz constitue uma util cataplasma para os abcessos. Existem as especies *Canna edulis*, vel *indica* de Velloso.
" *stotonifera*, vel *angusti folia* "

Cajamuru. *Solanum saponaceum*. Dun. SOLANEAS.
Usos. Desobstruente e depurativo.

Cajaty. Arbusto cuja casca é grossa e as folhas semelhantes

as do Louro ; dá um fructo amarellado, de sabor e perfume agradável e preso á extremidade do ramo por um pedunculo conprido.

Cajazeiro. *Spondeas luctea*. TEREBENTHINACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. A casca desta grande arvore é adstringente ; e seus fructos acidulos refrigerantes e muito empregados nas hypertrophias do coração.

Cajueiro. *Anocardium occidentale*. Linneó. *Cassuvium pomiferum*. Lamarck. TEREBENTHINACEAS.

Usos. A casca da castanha do cajú contem um succo caustico que serve para tirar as verrugas, calos nos pés e produz na pelle uma escoriação erysipelatosa. A amendoa é doce, agradável assada e descascada; é julgada aphrodisiaca. O cajú é comestivel quando maduro; refrescante e ligeiramente adstringente. O tronco do cajueiro, sobretudo a casca, é adstringente e usado em banhos nas molestias que reclamão o emprego desta especie de medicamento. O sumo dos grelos é util nas aphtas. Por meio de incisões feitas na arvore obtem-se uma gomma resina analoga a gomma arabica, porém que se dissolve mais promptamente, e que não pôde servir de verniz. Conta-se tambem, (Labat) que um copo friccionado internamente com uma folha de cajueiro torna o liquido que nelle se puzer embriagador.

Ha mais 2 especies:

Anacardium mediterraneum. Velloso.

" *humile*. Martius.

Calamo aromatico, E' em S. Paulo o *Junco de cobra*.

Calças de velha. Veja-se Verbasco.

Calumba brasileira. *Simaba columba*. Riedel. RUTACEAS.

Usos. Tonico e anti-febril. Raiz e tronco.

Ha mais a especie :

S. humilis. Riedel.

Calumbi. Arvore armada de espinhos e que tanto o macho como a femea servem sómente para marcenaria.

Calumi. Veja-se *Sensitiva*. Em Pernambuco.

Calunga. *Simaba ferruginea*. Saint-Hilaire. RUTACEAS. Minas, Bahia e Pernambuco.

Usos. A casca e a raiz desta planta contêm um principio extractivo amargo. Se a prescreve em pó ou em cozimento nas dyspepsias, febres tersãs e hydropesias. Em clysteres é empregada contra os relaxamentos do recto.

Camacari. MARCGRAVE.

Usos. Dá pela incisão um succo glutinoso, ao principio incoloro e que depois se torna roxo, serve para untar os pés afim de livral-os dos bichos.

Camapu' *Physalis angulata*. Linneo. SOLANEAS.

Usos. Diuretico e calmante empregada na dysuria. Seu cozi-mento é util nos catarrhos. Seus caules são depurativos, os fructos des-obstruentes. O cozimento concentrado é util nos rheumatismos chro-nicos e nas affecções herpeticas. O succo dá-se na dose de 2 a 3 onças. O extracto de 10 a 16 grãos. Pó na dose de 1 oitava.

Ha ainda as especies :

Physalis brasiliensis.

» *pubescens*

» *heterophylla*.

Camara Veja-se CAMARAJUBA.

Camara apeba. Veja-se MENTRASTO.

Camará de Bilro. Veja-se PA' O PEREIRA.

Camara-juba. *Lantana camara*. *L. aculeata* Linneo.
VERBENACEAS

Usos. Os banhos feitos com esta planta são bons para as sarnas e o rheumatismo.

Camara do mato. Veja-se PA' O PEREIRA.

Camará-japo. MARIA PRETA.

Camara do Rio Grande do Sul. *Lantana sellowiana*.
Link. VERBENACEAS.

Usos. Os mesmos do CAMARA-TINGA.

Camaranbaia. *Jussieua scabra*. Wild. ONAGRAREAS.

Usos. Tinturaria.

Camara-tinga. *Lantana involucrata* Linneo. *L. brasiliensis*.
Link. VERBENACEAS.

Usos. Sua infusão é util nas affecções catarrhaes. O succo das folhas misturado com assucar branco ó mui empregado em Permam-buco nas affecções pulmonares.

Camarinhas *Eupatorium album*. *Synanthereas*.

Usos. Sementes febrifugas.

Camboim. *Eugenia crenata*. *E. sylvestris*. Pison. MYR-TACEAS.

Usos. Os fructos são ligeiramente acidos e adocicados, e co-mestiveis; as folhas aromaticas e adstringentes.

Cambucá. *Eugenia cduilis cambucá.* MYRTACEAS.

Usos. Os fructos são compostos por uma polpa amarella-avermelhada eminentemente saborosa e refrigerante.

Cambuê. *Schinus rhoifolius.* Martius. ANACARDEACEAS.

Usos. Os mesmos das outras especies de *Aroeiras*.

Canambaya. *Cactus phillanthus.* Velloso. RHIPSALIS PACHYPHTERA. NOPALEAS.

Usos. O succo do fructo é doce mucilaginoso, e refrigerante nas febres gastricas e biliosas.

Canapomba. Veja-se MANGUE BRANCO.

Candêa. *Lychnophora.* Martius. COMPOSTAS.

Usos. Arbusto tortuoso cujo lenho quando secco da uma luz sem fumaça ; poupa o azeite no sertão porque um tição acceso fincado na parede allumia como um archote.

Canduá. *Cladonia sanguinea.* Martius. LICHENEAS. Minas.

Usos. Triturada com agua e assucar é um bom remedio topico contra as aphtas das creanças, em S. Paulo e Minas tingem os cestos e as esteiras com o succo desta planta.

Ha ainda outras especies entre as quaes figurão a :

Cladonia neglecta.

» *pixidata.*

» *pityrea.*

Nos lugares arenosos e nas restingas do Rio de Janeiro se encontrão as *Cladonias pixidata e perfoliata.*

Caneleira. LAURUS CINNAMOMUM. Velloso. LAURINEAS.

Usos. A casca é aromatica e empregada como excitante.

Caneleira branca. *Winthcriana canella.* MELIACEAS.

Usos. Madeira de construcção e de qualidade inferior. Póde ser applicada como tonica e anti-febriil.

Caneleira de cheiro. *Oreodaphne lopifera.* Martius. LAURINEAS. Rio Negro.

Usos. O oleo que se distilla desta arvore é aromatico e applicado nas contracturas dos membros, nos rheumatismos, etc., em fricções ou em fórma de unguentos.

Caneleira d'Ema. *Vellosiamaritima.* LAURINEAS. Minas.

Usos. Serve para tapamento das paredes das casas nos lugares onde não se encontra barro para tijollos, para combustivel em consequencia de ser muitos resinosa.

Caneleira d'Ema. Rio de Janeiro. *Barbacenia.*

Usos. Os mesmos de *Vellosia.*

Caneleira do mato. *Linaria aromatica*. Arruda. LAURINEAS. Pernambuco.

Usos. Aromatica e boa madeira.

Caneleira preta. *Nectandra molles*. Nees. *Laurus atra*. Velloso. LAURINEAS.

Usos. As folhas são diureticas carminativas e emenagogas.

Caneleira preta. *Agathophyllum aromaticum*. Linneo. LAURINEAS.

Usos. Madeira para construcção de casas.

Canelilha. Veja-se CASCA PRECIOSA.

Cangamba. Veja-se MANACA'.

Cangica. Milho branco quebrado, e sem casca.

Usos. Cozido e juntando-se leite, assucar, agua de flôr, torna-se um bom e nutritivo alimento.

Canlana. *Chiococca densifolia*. Martius. RUBIACEAS. Minas Geraes.

Usos. A raiz desta trepadeira é drastica e diuretica e empregada nas hydropesias e opilações. Da-se na dose de 1 a 2 escropulos do extracto, de 1 oitava em pó; e a infusão é feita na proporção de 4 a 5 oitavas para 8 onças d'agua.

Canjerana. *Cabralia canjerana*. Martius. *Trichilia canjerana*. Velloso. MELIACEAS.

Usos. Bella madeira de construcção. A casca da raiz é anti febril, adstringente e um pouco emetica.

Canna de assucar. *Saccharum officinarum*. Linneo. *Arundo saccharifera*. Pison. GRAMINEAS. Norte e Sul do Imperio.

Usos. A utilidade e emprego desta planta não necessitam de indicação. Ha diversas variedades; creola, cayenna, violeta, etc.

Canna do brejo. *Alpinia spicata*. AMOMACEAS.

Usos. A raiz é empregada em cosimento nas gonorrhéas e leucorrhéas. Mascando-se é um bom anti syphilitico 1 a 2 colheres do succo por dia ou o cosimento das folhas.

Canna do brejo roíxa. *Alpinia* ou *costus spiralis*.

Canna fistula. *Cassia fistula*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. A polpa do fructo é empregada como laxativa. Ha ainda a *Cassia medica*. Velloso.

Canna fistula dos grandes. Veja-se MARI-MARI.

Canna de maeaeo. *Costus pisonis*. Lynd. AMOMACEAS.

Usos. O succo desta canna é mucilaginoso, acidulo e refrigerante e empregado nas dores nephriticas, e nas gonorrhœas. Os indigenas comem as folhas novas para se desalterarem, em suas excursões atravez das florestas.

Canna marona. *Caladium seguinem.* Linneo. *Arum Aninga* 2ª de Pison ? AROIDEAS.

Usos. O succo desta planta é tão caustico que bastão 2 oitavas para envenenar ; forma sobre a roupa manchas indeleveis.

Canna do mato. Veja-se PACO-CAA-TINGA.

Canna do rio. Veja-se PACO CAA-TINGA.

Cansanção. EUPHORBIACEAS.

Usos. Applicada sobre a pelle é irritante. Os indigenas esfregão com ella o corpo quando tem de atravessar os rios a nado.

Canopy Tree. *Melicocca bijuga.* Jacq. SAPINDACEAS.

Usos. O fructo desta arvore se recommenda pelo sabor aciduloinhos o e pela amendoa agradável que encerra.

Canudo. *Calonietion.* LECUMINOSA. Ceará.

Usos. Planta aquatica e excessivamente venenosa para o gado.

Canudo amargoso. Veja PÃO PEREIRA.

Canudo de pita. *Mabea fistuligera.* Martius. EUPHORBIACEAS. Minas.

Usos. Casca amarga e pouco adstringente applicada como antifebril e tonico.

Canudo de purga. *Rauwolfia canescens.* APOCYNÆAS. Bahia.

Usos. Emetico, purgativo e epispatico.

Cany-caracu. Vinho preparado com aypim.*

Caopunga. E' a Coerana na Bahia.

Caouin. Bebida formada com o milho cosido, posto n'agua e deixado a fermentar por 3 ou mais dias.

Caparosa. *Jussieua caparosa.* Camb. ONAGRAREAS.

Uso. Tinturaria.

Capichingui. *Croton.* EUPHORBIACEA. S. Paulo.

Uso. Cathartico.

Capim d'Angola. *Panicum guineense.* *Panicum spectabile.* Martius. GRAMINEAS.

Capim catinga. *Gramen odoratum.* CYPERACEAS. Rio de S. Francisco.

Usos. Diuretico.

Capim de cheiro. Veja-se. CAPIM CHEIROZO.

Capim cheirozo. *Killinga odorata*. Martius. CYPERACEAS
Usos. Empregado como aromatico e diaphoretico.

Capim de Frei Luiz. Minas. Veja-se. *Capim melado*.

Capim gordura. Veja-se. *Capim melado*. Minas.

Capim melado. *Tristegis glutinosa* Nees. GRAMINEAS.

Usos. E' empregado na alimentação dos animaes, porém engordando os tem o inconveniente de enfraquecel-os.

Capim péba. Sapê segundo alguns botanicos, e segundo outros é um genero diverso. ANDROPOGON.

Capim puba. Veja-se Pé de galinha.

Capim rei. Veja-se. Maririçô.

Capocira branca. Veja-se BRAÇO DE PREGUIÇA.

Capreuva. Veja-se. CABUREIBA.

Capoeira branca. Veja-se *Braço de Preguiça*.

Cappitão do mato. ANNA PINTA em Minas. PURGA DE CAYAPO em S. Paulo. CAYAPONIA GLOBOSA.

Capreuva. Veja-se *Cabureiba*.

Cara. *Dioscorea bulbifera*. *Dioscorea sativa* Linneo. DIOSCOREAS.

Usos. O tuberculo radical esbranquiçado é comestivel, saudavel e muito apreciado.

Ha diversas especies *Dioscorea dodecaneura*. Velloso. *Dioscorea hyperifolia*. Velloso. *Dioscorea triboba*. Velloso. etc., etc.

Carachichu. Veja-se HERVA MOIRA.

Caraguata. Veja-se *Baboza*.

Caraiba. *Simaruba versicolor*. S. Hilari. RUTACEAS.

Usos. A casca é mui amargosa e considerada tonica e como tal empregada. Os veados gostão muito das folhas, que são amarellas semelhantes ás do pão d'arco.

Carajuru. *Bignônia chica*. Humboldt. BIGNONIACEAS

Usos. As folhas deste cipó fornece uma bella côr escarlata propria para a tinturaria. E' com esta planta e com o oleo da CARAPA que os Indigenas pintão os corpos e os tecidos de que usão.

Caramboleiro. *Averrhoa carambola*. Linneo. TEREBENTHINACEAS. Pará e Rio de Janeiro.

Usos. O fructo é acido agradável refrigerante e usado em limonadas.

Carana. *Amyris carana*. Humboldt. TEREBENTHINACEAS.

Usos. A resina é negra, leve e lúscida empregada nos catarrhos pulmonares. Substitue perfeitamente a *elemi*.

Carapa *Xilocarpus carapa*. Schreber. MELIACEAS. Amazonas.

Usos. As sementes dão 5% de óleo.

Carapeirana. Veja-se *Turiuva* do Pará.

Carapeirana. *Licania tunisia*. CHRYSOBALANEAS.

Usos. Os do *Gouju'u*.

Carapia. *Dorstenia orilifolia* Lamarck. URTICACEAS.

Usos. Os mesmos da CONTRA HERVA.

Carapitaia. *Carlota formosissima*. AMARYLLIDEAS.

Usos. O bulbo radical é comestível.

Carauba. Veja-se CARAIBA.

Cardamomo Silvestre. *Amomum sylvestre*. Martius. AMOMACEAS.

Usos. Sementes aromaticas e picantes e succedaneas do verdadeiro cardamomo.

Cardo. *Cactus phillantus*. CACTEAS.

Usos. O fructo é mucilaginoso e refrigerante.

Ha entre outras especies as seguintes ;

Cactus tuna. *Cactus teres.*

Cactus opuntia. *Cactus muralis*, etc.

Caribé. Beiju desfeito n'agua fria.

Carimã. Faz-se embrandecendo a mandioca n'agua, depois coa-se comprimindo-a em uma urupema fina.

Caroa. *Bromelia variegata*. BROMELIACEAS.

Usos. Empregão os indigenas do Rio de S. Francisco os filamentos desta planta na confecção de redes.

Caroba. Nome de muitas Bignoniaceas, muito estimadas por suas virtudes syphiliticas. Taes são a

Bignonia.

Jacarandá.

Cybastax.

Sparrattosperma.

Caroba. *Jacarandá Proeera* Sprengel. *Bignonia copaia* Aublet. BIGNONIACEAS.

Usos. Suas folhas são empregadas contra as bobas e syphilis em cozimento internamente, em banhos externamente, e em pó para pulverisar as ulceras.

Caroba branca. *Sparattosperma lithontripticum*. Martius.
Bignonia leucanta. Velloso. BIGNONIACEAS.
Usos. Além das propriedades depurativas é sobretudo diuretica e lithontriptica.

Caroba de flôr verde. *Cybistox antisymphilitica* Martius.
Bignonia quinquefolia. Velloso. BIGNONIACEAS.
Usos. É um excellente antisymphilitico. Prescreve-se nas dysurias e nas hydropesias.

Fazem-se loções nas ulceras syphiliticas com o cozimento de suas folhas.

Em infusão se dá na dose de 2 oitavas. Tambem se preparão umas pilulas de muito proveito nas hepatites chronicas, e que são compostas de caroba, senné, aloes, manná e mercurio.

Caroba guyra. *Bignonia purgans*. BIGNONIACEAS. Amazonas.

Usos. Segundo Riedel a raiz desta Bygnonia é purgativa e com a empregada no Alto Amazonas.

Caroba paulistana. *Jacarandá oxyphylla*. BIGNONIACEAS.

Usos. Os mesmos do Jacarandá procera.

Carabinha. Veja-se CAROBA.

Carolina. *Adenantha pavonia*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. Suas folhas são anti-rheumaticas em banhos. Suas sementes escarlates meias chatas são comestiveis.

Carqueja amargosa. *Baccharis triptera* D. C. *Cacalia amarga, decurrens*. Velloso. COMPOSTAS. Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Sul e Minas.

Usos. É um tónico e anti-febril muito empregado. Dá-se nas dyspepsias e diarrhéas, adocado com xarope de cascas de laranjas. Infusão 3 oitavas para 1 lb. de agua. O extracto na dose de 1/2 oitava é util nas obstrucções do figado.

Carqueja doce. *Baccharis Gaudichaudiana* D. C. *Cacalia sessilis*. Velloso. COMPOSTAS.

Usos. Os mesmos da Carqueja amargosa.

Ha ainda outra especie :

Baccharis articulata. Pers.

Carrapateiro. *Ricinus communis*. Linneo. EUPHORBACEAS.

Usos. As folhas são consideradas como emollientes e empregadas em banhos nos tumores. O oleo que se extrahé das sementes do carrapateiro é um excellente e doce purgante milharcs de vezes utilizado pelos medicos e pelo povo sobretudo o inglez.

Ha ainda o *Ricinus viridis*. Wild.
" *inermis*. Jacq.

Carrapicho. *Urena sinuata*. Linneo. MALVACEAS. Pernambuco.

Usos. Empregado como emolliente. Suas flores são bechicas.

Carrapicho do sertão. *Balliera* romboide. CORYMBIFERAS. Pará Maranhão.

Usos. Diuretico e purgativo e util nas hydropesias.

Carrapicho da calçada. *Triumfetta semitriloba*. Lamarck. TILIACEAS.

Usos. O cosimento desta planta é empregado em injeções contra a gonorrhéa. Tira-se dos ramos uma filaça, e serve tambem para a confecção de cestinhos.

Ha ainda. *Triumfetta eriocarpa* de S. Hilaire.

" *lappula*. Velloso.

Triumfetta sepium. S. Hilaire.

" *heterophylla*. Lamarck.

Carrapichinho. Pernambuco. Veja-se *Carrapicho*.

Caruru'. *Amaranthus viridis*. Velloso. AMARANTHACEAS.

Usos. É uma planta comestivel e de que se fazem certas comidas mui apreciadas sobretudo no norte.

A cataplasma feita com suas folhas é abstergente.

Caruru' Azedo. *Hibiscus sabdarifera*. MALVACEAS.

Usos. Comestivel.

Caruru' vermelho. *Amaranthus melancholicus*. Linneo. AMARANTHACEAS.

Usos. Os mesmos do CARURU'.

Casca amargosa do Maranhão. Veja-se *Guereroba de remo*.

Casca d'anta. *Drimys granatensis*. S. Hilaire. MAGNOLIACEAS. Rio de Janeiro, Minas, Goyaz e Bahia.

Usos. A casca em infusão é um optimo tonico e empregada nas dyspepsias e leucorrhéas.

Casca doce. *Andradea dulcis*. Pará.

Casca de Lorangeira da Terra. *Evodia febrifuga*. S. Hilaire. RUTACEAS.

Usos. Esta casca é tirada de uma arvore conhecida em Minas

com o nome de Quina, e é de sabor adstringente e amargo. Aconselha-se como succedaneo da Quina.

Casca para tudo. *Cinamodendron oxillare*. Martius. CA-NELEIRAS.

Usos. Sua casca amarga e aromatica é antiscorbutica e tonica e empregada em infusão nas febres de prostração e no relaxamento das toussillas.

Casca preciosa. *Mespilodaphne pretiosa*. Martius *Cryptocarea pretiosa*. LAURINEAS. E' abundantissima no Rio Negro.

Usos. A casca é aromatica excitante e empregada na asthenia nervosa por abuso dos prazeres venereos, nas arthrites syphiliacae e nos catarrhos chronicos. Infusão, cozimento e banhos.

Cascarilha falsa. Veja-se. Quina do Rio de Janeiro.

Casco de cavallo. *Barbarier ondullatus*. Pernambuco.

Usos. Como anti-bobatico.

Castanha de Bugre. Veja-se. Jatobá.

Castanheiro do Maranhão. *Bertholletia excelsa* Humboldt. LECYTHIDEAS.

Usos. Os seus frutos são do tamanho da cabeça de um homem e contem perto de 40 amendoas chamadas castanhas do Maranhão, comestiveis sendo frescas. Dão tambem um oleo bom para a comida e que é muito empregado. 1 Libra de amendoa dá 40 onças de oleo. São emollientes e acredita-se que gozão da acção benéfica nos catarrhos e na dysuria.

Cataia. Veja-se. *Herva de Bicho*.

Catinga de mulata. *Leucos martinicensis*. Benth. *Stachys fluminensis*. Velloso. *Stachys recta*. LABIADAS.

Usos. Empregada como anthisterica, e nas dores articulares. O cosimento da planta em banhos é antierheumatico. As flores em infusão são carminativas.

Catingueira. *Oiticica* em Pernambuco.

Catingueira. *Cesalpinia*. Planta do Brasil da qual se extrahе uma bella cor amarella.

Catingueira brava. *Croton*. Dá uma cor amarella propria a tinturaria.

Catota. *Solanum* - SOLANEAS. Alagoas. E' uma jubeba.

Caxaporra do gentio. *Terminalia argentea*. Martius. COM-BRETAGEAS. Minas Geraes.

Usos. Esta arvore dá uma gomma resina semelhante a gomma gutta e é purgativa na dose de 14 escropulo em emulsão ou pillulas.

Caxim. *Sapium ilicifolium*. EUPORBIACEAS.

Usos. As sementes são purgativas na dose de 2 a 3.

Cayaponia. Veja-se *Purga do gentio*.

Cebola brava. *Clusia rosea*. GUTIFERAS.

Usos. O suco resinoso amarello é resolutivo.

Cedro. *Cedrela brasiliensis*. MELIACEAS.

Usos. Casca adstringente e emetica ; madeira de marcenaria.

Centaurea brasileira. *Callopisma perfoliatum*. Martius. GENCIANEAS. Minas Geraes.

Usos. A raiz é amarga e empregada como tónica e estomachica. A especie AMPLEXIFOLIUM tem as mesmas propriedades.

Centeio. *Secale cereale*. Linneo. Martius. GRANINEAS.

Usos. A farinha de centeio é nutritiva porém um pouco pesada e só propria para estômagos robustos. A cataplasma de farinha de centeio é emolliente e resolutiva.

Centeio esporado. Chama-se deste modo o centeio atacado de cravagem, substancia que se desenvolve entre as valvulas e no logar da semente. E' comprida arqueada, cylindrica, bojudá, violacea de sabor mordicante e cheiro desagradavel.

Usos. E' um poderoso agente de contracções uterinas, e seu principio immediato é considerado hoje como o mais poderoso hemostatico vegetal que se conhece, tomado interna ou externamente.

Cereiba. Veja-se MANGUE BRANCO. Pison.

Cereibuna. Veja-se MANGUE AMARELLO.

Cereitinga. Veja-se MANGUE AMARELLO.

Cerejeira do Brasil. Veja-se GINGEIRA BRAVA.

Cerejeira de purga. *Melothria pendula*. Linneo. CUCURBITACEAS.

Usos. Os fructos desta trepadeira são purgativos. A dose é a metade de um fructo para um adulto. Aos cavallos se dá 3 ou 4.

Ceri. *Avicennia sericia*. VERBENACEAS.

Usos. Folhas adstringentes, e empregadas para curtir couros.

Cevada. *Hordeum hexastichon*. Nees. GRAMINEAS.

Usos. A farinha de cevada é nutritiva. O cosimento dos grãos é refrigerante e agradável, e forma a base da cerveja.

Cevada santa. *Hordeum distichou.* Nees. GRAMINEAS.

Usos. Os mesmos da outra especie.

Chá de frade. *Lantana pseudothea.* Saint-Hilaire. VERBACEAS. Minas Geraes.

Usos. E' empregado como excitante nas affecções catarrhaes e nos reumatismos.

Chá mate. *Ilex thezana.* Martius. ILICINEAS.

Usos. As folhas em infusão são usadas como o chá da India. Ligeiramente excitante e diaphoretico.

Chá de pedestre. Veja-se CHÁ DE FRADE. Minas.

Chá da terra. *Turnera frutescens.* Aubl. PORTULACEAS. Maranhão.

Usos. Empregado nas molestias nervosas, debilidades de estomago e dysmenorrhea.

Chagas miudas. *Tropeolum pentaphillum.* Lamarck. TROPEOLEACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. Esta curiosa planta trepadeiraagosa de virtudes antiscorbuticas.

Chagueira. *Ponciana pulcherrima.* LEGUMINOSAS.

Usos. O cozimento das folhas é anti-odontalgico.

Chamburu'. *Carica digitata.* Aubl. PAPAYACEAS. Bordas do Amazonas.

Usos. Conta-se que suas emanacões são tão mortaes como as da Mancenilha Javanense.

Chica. Nome da tinta extrahida da PIRANGA.

Chichá. *Sterculia chichá.* Saint-Hilaire. *Manetia curiosa.* Velloso. STERCULIACEAS. Goyaz, Rio de Janeiro.

Usos. As folhas são repercurativas. A amendoa do fructo é apreciada pelos negros.

Chichá. *Sterculia lasiantha.* Martius. STERCULIACEAS. Piauhy, Maranhão.

Chicla. Bebida extrahida de mandioca pelos indigenas do Amazonas.

Cicantaa-ihua. Esta arvore fornece uma resina de que os indigenas lanção mão para fazer archotes. Esta mesma resina applicada topicamente a boca do estomago é tida como corroborante. Tambem se

utilização della nas feridas como cicatrizante. Purifica-se e reduz-se a resina a fôrma de pães para guardar, e quando se quer empregal-a derrete-se ao fogo com um pouco de azeite. No Norte é muito empregada no calafeto dos barcos.

Cidreira. *Citrus medica.* AURANTIACEAS.

Usos. Prepara-se com os fructos doces agradaveis.

Cinamomo. *Melia azedarach.* Linneo. MELIACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. E' empregada para apressar o amadurecimento dos bubões. Internamente é um estimulante aperitivo e anthelmintico, em doze elevada é abortivo nas mulheres peçadas.

Cinco Folhas. *Bignonia depauperata. Hedera quinque folia.* Vellozo. RIGNONIACEAS.

Cinco Folhas. Da-se tambem este nome ao TARUMAN.

Usos. As folhas são diureticas e empregadas em infusão ou cozi-mento, em banhos nas dores rheumaticas ou venereas.

Ciparabo. E' uma especie de *Butua* cuja raiz delgada, liza e branda é encontrada no Espirito Santo e Minas.

Cipó d'Alho. *Seguiera alliacea.* Martius. PHYTOLACEAS.

Usos. Os mesmos da Ibirarema.

Cipó de Caboclo. *Tetracera volubilis.* Martius. DELLINEACEAS. Rio de Janeiro; Minas.

Usos. Suas folhas são purgativas tomadas em infusão, e resolutivas empregadas em banhos.

Cipó de Carijó. *Davilla tetracera* Martius. *Tetracera oblongata.* S. Hilairé. *Davilla brasiliانا.* D. C. DELLINEACEAS. Rio de Janeiro. Minas.

Usos. As folhas são aconselhadas nas orchites produzidas quer pelo virus venereo quer por outra qualquer causa. Fomentações e fumigações. Purga na doze de $\frac{1}{2}$ oitava da raiz pulverisada.

Cipó Carneiro. *Echites suberosa.* Apocynceas.

Usos. Hemostatico nas hemoptisias e sobretudo nas hemorragias uterinas.

Cipó Chumbo. *Cuscuta umbellata* Humboldt. *C. racemosa.* Martius. CUSCUTACEAS.

Usos. Esta parasita é applicada em pó sobre as feridas para apressar a cura. O succo é considerado como anticatarrhal e antihemoptico. Tambem se emprega em gargarejos nas anginas.

Cipó de cobra. Pison. Veja-se. CAA-PEBA.

Cipó cruz. *Chiococca anguicida*. Martius. RUBIACEAS. São Paulo.

Usos. Esta trepadeira tem as mesmas propriedades da Raiz Preta. Macera-se dous pugillos em uma medida de aguardente e adoçada com assucar, se dá uma chicara 3 vezes por dia.

Cipó de eunaman. *Euphorbia phosphorea*. Martius. EUPHORBIACEAS. Bahia.

Usos. Seus raminhos novos são uteis nas ulceras e carbunculos. Estapla espinhosa serve para cercas por causa do entrelaçamento dos seus ramos e dos espinhos que possui. Cortando-se um galho na obscuridade o succo branco que mana é luminoso, esacodindo-se parece ver-se rastilhos de fogo. Este succo causa um prurido insupportavel sobre a pelle e os espinhos produzem botões vesiculosos nos animaes que os tocam.

Cipó cururu. *Echites*. Martius. APOCYNÉAS. Pará.
Usos. Excellente aperitivo nas obstruções das visceras abdominaes. O succo leitoso é empregado contra os tumores topicamente.

Cipó em. *Smilax papyracea*. Poir. SMILACEAS.

Usos. Os da Salsaparrilha.

Cipó de escada. *Caulotretus macrostachyus*. Raddi. *Bauhinia radiata*. Velloso. LEGUMINOSAS.

Usos. Mucilaginoso e adstringente.

Ha ainda a especie :

Microstachyus. Raddi. *Bauhinia tomentosa*. Velloso.

Cipó de gota. *Cissus pulcherrima* Velloso. Rio de Janeiro.

Usos. Anti-rheumatico.

Cipó guyra. *Bignonia guyra*. Riedel. BIGNONIACEAS. Alto Amazonas.

Usos. Suas raizes são drasticas efrequentemente applicadas.

Cipó de imbê. *Philodendron Imbê*. Martius. AROIDEAS.

Usos. Suas folhas frescas pisadas são empregadas nas ulceras. O cozimento do caule e folhas é applicado nos rheumatismos e nas orchites em banhos. O cozimento fraco é util nas hydropesias. O succo em Mato Grosso é applicado como vesicatorio. O pó da raiz na dose de 5 a 10 grãos é drastico.

Ha ainda 3 especies :

Philodendron grandifolium. Kunt.

» *hederaceum*. Kunt.

» *oblongum*. Kunt.

Da raiz se tirão fios com que se fabricão tecidos, e de casca cordas.

Cipó leica. *Cacalia quadriflora*. Velloso. Rio de Janeiro.
Usos. Aromatico.

Cipó de Jabotá. E' no Pará a FAVEIRA DE S. IGNACIO na Bahia.

Cipó mainbu. Esta planta rasteira que nasce nas praias tem as mesmas virtudes da *Caroba*.

Cipó mororó. Veja-se *Cipó de escada*.

Cipó rego. *Bignonia rego*. Velloso. BIGNONIACEAS. Rio de Janeiro.
Usos. Os da *Caroba*.

Cipó sumá. *Anchietea salutaris*. S. Hilaire. JONIDEAS Minas e S. Paulo.

Usos. A raiz é emetica e purgativa e applicada nas molestias exanthematicas.

Tambem é util em doses pequenas nas tosses convulsivas dos meninos. A raiz se dá na dose de 1 a 2 oitavas.

Cipreste americano. *Pinus abies*. CONIFERAS.

Esta planta estupenda e cujo tronco chega a medir 33 e 1/2 varas de circumferencia, é pouco empregada em medicina.

Coajinguva. *Ficus anthelmintica*. Martius. ARTOCARPEAS. Amazonas e Rio Negro.

Usos. Esta grande arvore dá um succo leitoso, poderoso remedio contra a tenia na dose de 1 a 2 escropulos e continuada por alguns dias. A amendoa é branca, doce e comestivel assada e despojada da casca. Gosa da virtude aphrodiziaca, e julga-se que activa a memoria.

Cob'ó do Pará. *Solanum sessileflorum*. SOLANEAS.
Usos. As bagas polposas servem para doces e conservas.

Coca. Veja-se *Ipadú*.

Cocallera. Veja-se *Alcamphora*.

Cocco de purga. Veja-se *Andaúçú*.

Cocococa. *Aulomyrcia lauruetanea*. MYRCINEAS.
Usos. Aromatico.

Cocombro. Veja-se *Cabaceiro amargoso*.

Coahy. Bebida feita com o fructo da *Euterpe edulis*.

Coentrilho. *Xanthoxylum hiemale*. S. Hilaire. RUTACEAS. XANTHONILACEAS? Rio Grande do Sul.

Usos. Reduzida a pó é empregada segundo Humboldt nas dores de ouvido.

Coentro da colonia. *Eryngium foetidum*. OMBELLIFERA.

Usos. Sedativo febrifugo, e anti-hystérico. E' tambem util nas mordeduras de cobras.

Coerana do Rio, S. Paulo e Bahia *Cestrum laevigatum*. Schlecht. SOLANEAS.

Coerana de S. Paulo e Minas. *Cestrum euanthes* Schlecht. SOLANEAS.

Coerana de Minas e do Rio de Janeiro *Cestrum corymborum*. Schlecht. SOLANEAS.

Coerana do Rio Grande do Sul. *Cestrum parqui*. SOLANEAS.

Ha ainda o *Cestrum bracteatum*. Link. SOLANEAS.

Usos. Todas estas especies de coerana são emollientes, anodinas e diureticas. Em banhos são um optimo remedio anti-hemorrhoidal. Suas folhas servem para tirar o sujo da roupa. Os fructos dão uma materia colorante roixa azulada.

Cotté. Veja-se CAITE.

Comandalyba. *Sophora occidentalis*. LEGUMINOSAS.

Usos. E' um veneno para os cães; todavia póde ser empregada com criterio contra as febres intermitentes.

Conabi *Phyllanthus brasiliensis*. Lamarck. *P. conami* Sw. *Conami brasiliensis*. Aubl. EUPHORBIACEAS. Rio Negro.

Usos. Os indigenas entorpecem o peixe lançando no rio esta planta. E' no Parí e Rio Negro considerada diuretica.

Conawi. Veja-se CONABI.

Condoé. E' no Maranhão a planta conhecida em Pernambuco pelo nome de Guardião.

Congonha. *Ilex congonha*. Lambert. ILICINEAS. Minas.

Usos. Os mesmos do mate do qual é uma especie,

Conyza. *Conyza alopecuroides*. Lamarck. COMPOSTAS.

Usos. Sua raiz é diuretica e lithontriptica.

Contraerva. *Dorstenia cordifolia*. Swartz. URTICACEAS.

Usos. E' empregada a raiz como drastica e adstringente nas mordeduras de cobras. Tambem se tira algum resultado na chlorose e leucorrhœa. Em pó se dá de 1 escropulo a 1 oitava: em infusão 4 oitavas para 2 libras d'agua.

Dorstenia bryonifolia.

Dorstenia opifera. Martius.

Segundo Arruda. A *dorstenia Pernambucana* e a *Rotundifolia*.

são só proprias de Pernambuco. E' (segundo Serpa) esta planta que o lagarto (Tijuassu) come quando é mordido pelas cobras.

Na Bahia se conhece a *contraierva* pelo nome de Tiu (derivado de Tijuassu).

Copahiba. *Copahifera officinalis*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. E' empregado o balsamo que esta planta fornece nos corrimientos mucosos e purulentos do canal da uretra. E' applicado tambem nos catarrhos chronicos. A dose é de $\frac{1}{2}$ escropulo e progressivamente augmentando. Externamente usa-se em fomentações nas dores uterinas, e como deterrentivo nas ulceras. No Brasil contão-se 10 especies.

Copahiba. Rio Negro. Pará. *Copaifera gujanensis*. DC.

Copahiba. Minas e Cuiabá. *Copaifera nitida*. Martius.

Copahiba. Pará, Maranhão. *Copaifera Martii*. Hayne.

Copahiba. S. Paulo e Minas. *Copaifera Langidorsii*. Hayne e *Copaifera coriacea*. Martius.

Copahiba. Rio de Janeiro *Copaifera beyrichii* ou *officinalis*. Velloso.

Copa-uva. Veja-se COPAHIBA.

Copalehi. *Croton suberosum*. Humbold. Runth. EUPHORBIACEAS.

Usos. Os da cascarilha.

Copiiba. Veja-se *Turumá*. Marcgrave.

Coqueiro. De 65 generos e 273 especies de coqueiros até hoje conhecidos, apresenta o Brasil 24 generos e 112 especies. Apontaremos aquelles de que temos conhecimento fazendo sentir desde já que todos elles gozão de propriedades mais ou menos uteis.

Coqueiro Acuna. *Iriartea orbigiana*. PALMEIRAS.

Esta palmeira é mui interessante por ter quasi todas as raizes adventicias.

Coqueiro Alicui. Veja-se Ariri.

Coqueiro Araui. Veja-se Ariri.

Coqueiro Aricuri. Veja-se Ariri.

Coqueiro Anayá. *Maximiliana regia*. PALMEIRAS. Norte.

Usos. Frutos comestiveis.

Coqueiro Aricuri da Bahia. *Cocos coronata*. Martius. Palmeiras.

Coqueiro Ariranga.

Usos. As folhas servem para os indigenas cobrirem o tecto de suas palhoças.

Coqueiro Ariri. *Cocos schizophylla*. Martius. PALMEIRAS. Bahia.

Usos. O coco ainda verde dá um succo antiophthalmico.

Coqueiro Assahy. *Euterpe edulis*. Martius. PALMEIRAS. Pará Maranhão.

Usos. O coco amassado com agua e coado dá um liquido côr de vinho que temperado com assucar, é um bello refrigerante. Azeda no fim de 24 horas.

Coqueiro de Ayri. *Astrocarium ayri*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. Os indigenas fazem seus arcos desta palmeira. Tambem della tiramos ripas.

Coqueiro Baba de Boi. *Cocos gommosa*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. O fruto é amarello, agradável e muito mucilaginoso e gommoso.

Coqueiro Babuinha. *Guilielma insignis*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. O fruto desta palmeira espinhoza é o mais agradável dos que se conhecem. Sua polpa espessa e assucarada se come fresca ou secca.

Coqueiro Bacaba. *Oenocarpus bacaba*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. O fruto é muito mucilaginoso, e os indigenas fazem delle, quando maduro, seu unico alimento. Quando se cozinha a bacaba depõe-se um sedimento que secco ao sol torna-se duro como pedra. Este sedimento serve de recurso para o tempo da fome, pois que amolecido com agua constitue um alimento nutritivo. Ha 2 especies — *Distichus* e *Batana*.

Coqueiro da bahia. *Cocos nucifera*. PALMEIRAS.

Usos. O coco tem o tamanho da cabeça de uma creança e contém um leite agradável e que se torna menos abundante á medida que o coco amadurece, poisque vai-se solidificando em uma massa carnosa que tambem é comestível e serve para a preparação de diversos doces. Do envoltorio exterior do fruto se faz estopa e da parte coriacea diversos utensilios vasos etc. Destillando-se este envoltorio obtem-se um oleo empi-reumatico antidontalgico. O leite do coco é refrigerante diuretico e muito empregado nas gastro enterites. A amendoa fornece um oleo bom para luz.

Coqueiro batuã. Veja-se Coqueiro *Bacaba*.

Coqueiro baxiuba. *Iriartea ventricosa*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. O fruto é comestível. Ha mais tres especies *Iriartea exerhiza*, *Iriartea deltoidea*, *Iriartea seligera*.

Coqueiro brijauva. E' o Coqueiro de Ayri na Bahia.

Coqueiro buriti. *Mauritia vinifera*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. As folhas são utilizadas em muitos misteres, o fruto é comestível, o tronco fornece pela incisão um succo vinhoso excellente.

Coqueiro buriti bravo. *Mauritia armata*.

Coqueiro cabeçudo. *Cocos capitata*. PALMEIRAS. Minas.

Coqueiro caiaué. *Elaeis melanococca*. Gaertn. PALMEIRAS. Pará e Rio Negro.

Usos. Fornece um bom oleo.

Coqueiro Carandahy. *Copernica cerifera*, Martius. PALMEIRAS.

Usos. E' um pão duro e que sómente cresce nos logares pantanosos.

Coqueiro carnauba. *Corypha cerifera*. PALMEIRAS.

Usos. Os indigenas tirão desta arvore o alimento seguinte : Abatem a arvore, tirão as folhas e a casca tomão a parte enxuta e a socão em pilões, passando a massa em uma urupemba, e lavando-a para tirar o amargor (jussara) e seccão para fazerem angú quando precisão.

A carnauba nutre os animaes cavallares e vacuns. O tronco quando de vez (100 annos) serve para vigas, esteios, etc. e é incorruptível pondo-se sal no alicerce.

As folhas servem para cobrir casas, fazer chapeos, esteiras etc. e quando amassadas dão um bom fio para cordas.

Extrahe-se das folhas e mesmo da planta uma cera amarellada de que se fazem velas.

A raiz da carnauba é antiarthritica.

Coqueiro de catarrho. *Acrocomia sclerocarpa*. Martius. PALMEIRAS. Rio de Janeiro e provincias do Norte.

Usos. Comestível o fruto, a amendoa dá um oleo que pode ser aproveitado. Do tronco se extrahe uma fecula nutritiva.

Coqueiro caxuté. PALMEIRAS. Ceará.

Usos. Das folhas é que são formados os tectos das casas dos indigenas do Norte. O gado procura avidamente os frutos desta palmeira, elles são mui nutrientes e augmentão a secreção leitosa. Da amendoa se faz um bello azeite para temperar a comida, e o envoltorio do fruto serve de combustivel.

Coqueiro chilense. *Jubea spectabilis*. PALMEIRAS. Pará e Amazonas.

Usos. Faz-se aguardente.

Coqueiro coquim amargoso. Veja-se GUARIROBA.

Coqueiro curua. Veja-se OUAOUASSU.

Coqueiro dendé. *Elaeis guinensis*. PALMEIRAS.

Usos. O fruto fornece um óleo amarelado próprio para certas comidas brasileiras, para luz, e é empregado no reumatismo por meio de fricções.

Coqueiro guaguaçu. *Attalea speciosa*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. Suas folhas de 3 a 6 metros de comprimento servem para cobrir casas.

Coqueiro guariroba. *Cocos oleracea*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. Os grelos são amargos como a chicória e constitue um bom palmito.

Coqueiro guriry. *Cocos arenarius*. Martius. PALMEIRAS. Logares arenosos do Rio de Janeiro.

Usos. Os caixos contem um amontoado de frutos, amarello alaranjados agradaveis. Dentro do fruto existe uma amendoa doce e de gosto delicioso. As folhas desta palmeira servem para a confecção de balaões, cestinhas etc.

Coqueiro gury. Veja-se *Coqueiro Guriry*.

Coqueiro imburi. *Cocos caudescens*. PALMEIRAS.

Usos. Os frutos são comestiveis.

Coqueiro inajaguaçu-iba. Veja-se *Coqueiro da Bahia*.

Coqueiro indaya-assu. *Attalea compacta*. PALMEIRAS.

Usos. Os frutos são escuros, corneos, e a amendoa oleosa e dura porem comestivel.

Coqueiro iry. Veja-se *Coqueiro Ayri*.

Coqueiro jaraiuva. *Leopoldina pulchra*. PALMEIRAS.

Coqueiro jatitara. *Desmoncus jatitara*. PALMEIRAS.

Coqueiro jatauva. *Syagres cocoides*. PALMEIRAS.

Coqueiro jauari. *Astrocaryum Jauari*. Martius. PALMEIRAS. Pará e Rio Negro.

Usos. Todos estees generos de palmeiras são mais ou menos utilizados pelos indigenas.

Coqueiro jissara. *Eulerpe oleracea*. Martius. PALMEIRAS. Em todo o Brasil.

Usos. Os fructos não se comem. As folhas novas ainda não abertas constituem o chamado *palmito*.

Coqueiro macajuba. Veja-se Coqueiro de catarrho.

Coqueiro maraja. *Bactris marajá.* PALMEIRAS. Pará.
Norte.

Usos. Os fructos são comestíveis.

Coqueiro miriti. *Mauritia flexuosa.* PALMEIRAS. Pará e
Rio Negro.

Coqueiro morphis. Veja-se *Marfim vegetal.*

Coqueiro murumuru'. *Astrocaryum murumuri.* Martius.
PALMEIRAS. Pará e Norte.

Coqueiro oauassu'. *Attalea spectabilis.* Martius. Norte.
PALMEIRAS.

Coqueiro patioba. *Cocos botryophora.* Martius. PAL-
MEIRAS. Costas austraes do Brazil.

Usos. As folhas servem para a confecção de balaaios, cestos, etc.

Coqueiro piassaba. *Attalea funifera.* PALMEIRAS.

Usos. As spathas das folhas fornecem filamentos pretos, grossos e dobraveis que servem para cordas e vassouras.

Coqueiro pinda'. Veja-se PINDOBA.

Coqueiro pindayua. PINDOBA DO PARÁ.

Coqueiro pindoba. *Cocos australis.* PALMEIRAS.

Usos. Os fructos são comestíveis e dão um oleo bom para a comida e iluminação. E' adoçante e emolliente. O miolo desta palmeira é um optimo palmito.

Coqueiro pissando'. Veja-se COQUEIRO DA PRAIA.

Coqueiro popunheiro.

Os fructos, desta palmeira se comem cozidos. Esta palmeira é no Norte um indicio de povoação poisque nas fazendas é a primeira que se planta.

Coqueiro da praia. *Diplolhemium maritimum.* Martius.
PALMEIRAS.

Coqueiro da quaresma. *Cocos flexuosa.* Martius. PAL-
MEIRAS. Rio de Janeiro.

Usos. O seu fruto secco tem uma amendoa mui agradável. O pericarpo é oleoso e mucilaginozo.

Coqueiro tacumba-iva. *Bactris inundata.* PALMEIRAS.

Usos. Seus pecioles dão fibras mui fortes que podem substituir o linho.

Coqueiro tarampabo. *Oenocarpus tarampabo*. PALMEIRAS.
Usos. Este coqueiro tem suas folhas dispostas em leque.

Coqueiro tucum. *Astrocaryum vulgare*. Martius. PALMEIRAS.

Usos. De suas folhas pela maceração se tirão filamentos para a confecção de cordas.

Tucum bravo. *Bactris setosa*.

» manso » marajá.

Coqueiro tucumay. *Astrocaryum Tucumá*. Martius. PALMEIRAS. Pará e Rio Negro.

Usos. Os frutos se comem crus; do succo mixturado com alguma agua se faz o vinho conhecido por Tucumá.

Coqueiro umbamba. *Desmonieies nidentum* PALMEIRAS. Planices inundadas.

Usos. Suas fibras são solidas e servem em lugar do junco.

Coqueiro urucana Brava. *Bactris tomentosa*.

Coqueiro urucuri-iba. Veja-se *Aricuri*.

Coqueiro urucuri, *Attalea excelsa*. Martius. PALMEIRAS. Norte.

Coqueiro vina. *Iriartea phacocarpa*. PALMEIRAS.

Usos. As folhas servem para cobrir casas, e sua madeira fluctua ainda mesmo verde.

Coqueiro uvaçã. *Manicaria saccifera*. Martius. PALMEIRAS. Bordas do Amazonas. As folhas parecem de bananeira.

Usos. Os indigenas aproveitam para barretes o tecido fino que envolve os cachos dos cocos do uvaçã.

Coqueiro yatay.

Usos. Vive nos lugares arenosos; seus fructos fornecem aguar-dente. Suas folhas seivem para chapéos, e do tronco se faz farinha.

Coração de Jesu. *Mikania officinalis*. Martius. COMPOSTAS. Minas e S. Paulo.

Usos. Seus principios amargos e aromaticos a tornão succedanea da quina e é empregada nas febres intermitentes e dyspepsias.

Coral. *Jatropha multifida*. Linneo. EUPHORBIAEAS.

Usos. Cathartico.

Cordão de frade. *Phlomis nepetifolia*. Linneo. *Leonotis nepetifolia* Bentham. LABIADAS.

Usos. Empregado em banhos nas crianças debeis, como tonico e excitante. Tambem se applica contra a dysuria e o rheumatismo.

Cordão de S. Francisco. Veja-se *Cordão de frade*.

Corneiba. Veja-se AROEIRA.

Corôa de frade. *Nigritia*. Humboldt.

Usos. Desconheço.

Corrente. *Achyranthes*. AMARANTACEAS. Norte.

Usos. Diuretica.

Cortixa brasileira. *Bignonia uliginosa* de Gomes. BIGNONIACEAS.

Usos. Os da cortixa verdadeira.

Cotó-cotó. *Palicourea densifolia*. Martius. RUBIACEAS. Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas.

Usos. As folhas deste arbusto são empregadas contra as dores rheumaticas.

Sua infusão em dose pequena e adoçada com um xarope aromatico é de vantagem nas dyspepsias e asthenia geral. Em dose elevada é vomitiva e cathartica. Emprega-se tambem na tincturaria.

Couguerecou. Veja-se IBIRA.

Coumarourana. *Dipterix appositifolia*. D. C. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do CUMARU'.

Craveiro do campo. *Calyptanthes variabilis*. MYRTACEAS.

Usos. Aromatico excitante.

Craveiro de defunto. *Tajetes glandulifera*. COMPOSTAS. RADIADAS ?

Usos. E' aromatico, estimulante e sudorifico e empregado no hysteria e em algumas affecções uterinas e verminosas.

Ha duas especies cultivadas nos jardins :

Tajetes patula.

» *erecta*.

Craveiro do Maranhão. *Laurus borbonia*. Linneo. Persea. *Cariophyllata*. Martius. LAURINEAS.

Usos. O calix de suas flores é avermelhado, a raiz de uma côr violeta muito bella, e a casca fina, lisa offerece um aroma agradável e um sabor quente. Extrahese um oleo essencial.

Craveiro da terra. *Calyptantes aromatica*. Saint-Hilaire. MYRTACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Os mesmos que os do cravo da India, Aromatico, excitante antispasmodico.

Craveiro da terra. Minas. *Eugenia pseudocaryophyllus*. MYRTACEAS.

Craveiro da terra. S. Paulo. Rio de Janeiro. *Myrtus pseudocaryophyllus*. Gomes. MYRTACEAS.

Os mesmos usos.

Cravinho do mato. E' no Maranhão a *Herva de Santa Maria*.

Crista de gallo, *Tiaridium elongatum*. Lehm. *Heliotropium curassavium*. Martius. BORRAGINEAS.

Usos. E' empregado em Pernambuco como detergente.

Cruã, *Cucurbita ceratocreas*. *Cucurbita odorata*. Velloso. CURBITACEAS.

Usos. O fructo é odorifero, sua polpa refrigerante e os iudigenas o considerão anti-febril.

Cruciana. Espeeie de bambú não fistuloso.

Cruzeirinha. Veja-se CAINGA.

Quambu'. *Bidens adherescens*. Velloso. COMPOSTAS.

Usos. Os mesmos do carrapicho.

Quaruru guassu. Veja-se *Tintureira vulgar*.

Cuca. Veja-se YPADU'.

Cuchery. Veja-se CUMUMARI. Condamine.

Cucuru'. *Echites cucurú*. Martius.

Usos. Raiz emetica.

Cuguaçuremiu. Veja-se AYPIM.

Cuhuraquam. Veja-se PAO BRASIL.

Cuietè. *Crescentia cujete*. Linneo. CRESCENCIACEAS.

Usos. A polpa do cabaço não maduro, preparada com assuear é empregada contra as febres. A polpa do fructo é um bom maturativo e applica-se na testa nas encephalites. A casca do fructo serve para a confecção de vasilhas que os indigenas adornão com esculpturas *sui generis* (Cuias). O fructo assado e expremido dado na dóse de 2 colheres é reputado anti-tetanico em Pernambuco. Tambem os curandeiros applicão o fructo assado contraas ephantiasis dos Arabes, e nas hernias escrotaes mettem o eseroto entre as duas metades do cabaço partido e assado, e dizem que as hernias desappareem.

Cuietezeira. E' o *Cabaciro amargoso*.

Cuipana. *Myrcia tingens*. MYRTACEAS. Serra da Estrella.

Usos. Adstringente.

Cuité-açu'. *Alpinia aromatica*. Jacq. Velloso. ANOMACEAS. *Alpinia racemosa*.

Usos. Raiz aromatica empregada como carminativa na dóse de 10 a 20 grãos. E' um succedaneo do cardamomo. Tambem se tira vantagem contra as uleeras.

Cuipouna. Arvore cujo succo misturado com agua é empregado para lavar ulceras. Serve tambem para tinturaria.

Cujamarioba. Veja-se FEDEGOSO.

Cujumary. *Aydeendron kujumary*. Nees. *Ocotea kujumary*. Martius. LAURINEAS. Rio Negro.

Usos. Os cotyledones oleosos das sementes não são menos estimados que os da fava *pichurim* contra a atonia digestiva e molestias intestinaes proprias das regiões calidas.

Cujumary guaianense. *Ocotea gujanensis*. Aublet. LAURINEAS.

Usos. As folhas deste vegetal, que são de uma brancura extraordinaria na sua pagina inferior são empregadas em cataplasmas para apressar a maduresa dos bubões.

Cumamery. Veja-se SORVEIRA.

Cumandatia. *Lablab vulgaris*. Pison. LEGUMINOSAS.

Usos. Os fructos são comestiveis, promovem os menstrosos, a diurese, e applicão-se tambem nas affecções bronchico pulmonares.

Cumandauassu. O fructo desta arvore é empregado contra as empingens, e tido por efficaz. O cosimento do fructo para as modernas e a infusão das sementes raladas para as antigas. Será esta planta a Cumandatia?

Cumaru. *Dipteris odorata*. D. C. LEGUMINOSAS. Rio Negro. Pará.

Usos. As sementes são de um aroma delicioso e conhecidas pelo nome de favas de Tonca. Ellas são oleosas, e empregadas como aromaticas, cardiacas, diaphoreticas e emmenagogas. O epicarpo é doce e os sertanejos o comem.

Cumbara. *Dipterix pterocarpus*. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. Diaphoretico. O Barú, Cumurú e Cumbarú são em nossa opinião uma unica especie do genero — *dipterix*.

Cumbeba. *Cereus variabilis*. CACTEAS. NOPALEACEAS.

Usos. O fruto é comestivel, acidulo adocicado e mucilaginoso, e empregado como refrigerante nas febres inflammatorias. Tinge a urina de vermelho. O fruto verde contundido é applicado nas ulceras sordidas.

Cupay. Veja-se Copahiba.

Cupu-assu. *Deltonia lutea*. MALVACEAS. Norte.

Usos. Os frutos são refrigerantes e agradaveis.

Curadeira. Veja-se *Velame* em S. Paulo.

Curare. Veneno poderoso preparado pelos indigenas e que se suppõe extrahido de uma planta do genero —*Strychnos*— da familia das Longaniaceas.

Usos. Empregado pelos indigenas em maior quantidade ou menor conforme o desejo de matar ou de entorpecer o animal. Uma flexa empregnada deste veneno depois de 15 annos ainda mata. O effeito nocivo só tem logar quando introduzido o veneno na circulação, pois que pôde se ingerir o curare sem inconveniente e segundo Humboldt os selvagens o tem por um bom estomachico.

O curare obra tão sómente sobre o systema nervosomotor, e sobre os nervos sensitivos e sobre os musculos independentes da vontade, elle não actua; nos casos de envenenamento pelo curare as tunicas intestinaes e o coração continuão a mover-se. Basta uma quantidade equivalente a 3 cabeças de alfinete para matar um homem. Acaba de tentar se sua applicação nos casos de tetano, no tratamento da epilepsia e como antidoto da strychnina.

Curri-uva. Veja-se PINHEIRO DO BRASIL.

Curri-y. Veja-se PINHEIRO DO BRASIL.

Curralleira. E' a *Alcamphora* em S. Paulo.

Carubai-mirim. Veja-se SEMIPIRA,

Curucu. E' uma pequena arvore cujo suco é ante hemoptoico.

Cururiri. Arvore cujo fruto é uma baga umbilicada e amarella contendo uma ou duas sementes de sabor adstringente porém agradaveis ao paladar — Marcgrave. Julgo ser a *Pitombeira* da Bahia e Pernambuco

Cururu. *Paullinia cururú.* SAPINDACEAS.

Usos. Venenosa.

Cururu-ape. Veja-se Timbó.

Cutubeca. *Coutubea densiflora.* Martius. Gencianeas.

Usos. Os da Genciana.

D.

Dom Bernardo. *Palicourea tetraphylla.* Martius. RUBIACEAS. Minas.

Usos. Os mesmos da *Douradinha do campo.*

Douradinha. *Waltheria douradinha.* S. Hilaire. BUTTERFLYACEAS. S. Paulo e Minas.

Usos. O cozimento desta planta é util nas affecções catarrhaes.

Douradinha do Campo. *Palicourea aurata*. RUBIACEAS. Minas.

Usos. Os mesmos da *Douradinha*.

Douradinha do Campo. *Palicourea rigida*. Martius. RUBIACEAS. S. Paulo, Minas, Goyaz e Matto-Grosso.

Usos. Diuretica diaphoretica, e apresentando a acção primitiva da *digitalis*. É empregada na discrasia syphilitica, nas erupções cutâneas, nos tumores articulares e nas tumefacções da prostata. 1 escropulo a 1/2 oitava em infusão em 6 onças d'agua, e adoçada com xarope aromatico.

Dragão Fedorento. *Monstera adansonii*. Schott. AROIDEAS.

Usos. Esta trepadeira contusa applicada nas regiões mastoideanas é util nas otites. As folhas applicadas sobre o ventre debella a ascite. Sua raiz acre é empregada como cauterizante nas feridas produzidas por mordeduras de cobras.

E.

Elemi. Resina que escorre da *Amyris heterophylla*. Planta que cresce nos lugares mais seccos e approximados da linha equinocial.

Embeguaca. Planta do Brazil de raizes numerosas, longas, casca dura servindo para cordas. A fumaça produzida por esta planta quando queimada é boa para fazer parar os fluxos de sangue, sobretudo os das mulheres.

Embira. Veja-se PINDAHIBA.

Embira branca. *Tunifera utilis*.

Embira branca. *Apeiba cimbalea*. TILIACEAS. Pernambuco.

Usos. Madeira cujo peso especifico é menor do que o d'agua. Faz-se com ella jangadas e da casca se tirão boas cordas.

Embira jangar. Veja-se *Apeiba*.

Embira vermelha. Veja-se *Pindahiba*.

Embiratanha. Veja-se *Pindahiba*.

Emburarembo. *Convolvulus foetida*. CONVULVULACEAS. Pará.

Usos. É empregada contra as mordeduras de cobras.

Embyayembo. Veja-se *Pipi*.

Encacia. Arvore cuja casca muito grossa e ligeiramente amarga e adstringente é empregada como emeto cathartica. E' olhada como antidoto dos venenos vegetaes e ophidianos.

Ecarate-seu.

Usos. A raiz desta planta fervida em vinagre serve em fricções nos lombos e nas extremidades contra as febres intermittentes. A raiz raspada e coada por expressão dá um succo que misturado com vinho branco é tambem anti-febril.

Ervilha d'Angola. Veja-se *Guando*.

Espavto da terra. *Pharus brasiliensis*

Espelina. *Perianthopodus tomba*. CUCURBITACEAS. S. Paulo.

Usos. Empregada como drastica na dóse de 1 oitava para 1 lb. d'agua dada as chicharas. Tambem se emprega em clysteres nos casos de virus venereo.

Segundo Manso é um efficacissimo contra-veneno de qualquer natureza.

Espigelia. *Spigelia glabrata*. Martius. SPIGELIACEAS. LONGANIACEAS.

Usos. E' um especifico contra os vermes intestinaes. Emprega-se a planta toda ; porém de preferencia as folhas. Administra-se em pó, em cozimento, em xarope e em geléa. E' necessario cautela em sua administração.

Espinha de carneiro. *Xanthium macrocarpum*. D. C. *X. brasiliicum*. Velloso. COMPOSTAS.

Usos. Planta usada em banhos contra os tumores e as sarnas. Fornece uma tinta amarella.

Ha ainda o :

X. brachyacanthum. D. C. *Xanthium spinosum*. Velloso.

Espinheiro de ameixa. Veja-se *Ameixeira da terra*.

Esponjeira. *Mimosa pharnesiana*. LEGUMINOSAS.

Usos. As flores são antispasmodicas e excitantes. O cozimento da casca é anti-arthritico empregado em banhos ; o das folhas é anti-odontalgico.

Estaca cavallos. *Gratiola*. SCROPHULARINEAS.

Usos. Purgativo.

Estoraque. *Styrax ferrugineum*. Martius. STYRACEAS.

2ª especie.—*Styrax articulatum*.

3ª especie.—*Pamphilia acurata*.

Usos. E' um estimulante aromatico o balsamo que desta planta se extrahе. Emprega-se no curativo das ulceras chronicas e internamente nas leucorrhéas e gonorrhéas em pilulas na dose de 4j2 a 4 oitava.

F.

Farinha d'agoa. Põe-se de molho a *mandioca* por 3 dias em agoa estagnada e por 4 em agoa corrente. Tira-se depois a casca, passa-se em um raló, vai ao tipety, donde passa por uma urepema fina, indo finalmente ao forno a torrar a vontade. E' amarella e não é tão nutritiva como a farinha secca.

Farinha secca. Descasca-se a *mandioca*, lava-se, rela-se e vai ao tipety donde passando por uma urupema é depois levada ao forno. Esta farinha parece favorecer a digestão da comida usada entre os brasileiros — feijão com carne secca.

Fava de empigem. *Cumandauassu*'.

Fava de S. Ignacio. Bahia e Rio de Janeiro. Veja-se NHANDIROBA.

Fava de S. Ignacio. Minas Geraes. Veja-se GUAPEVA.

Fava de toneco. Veja-se FRUCTO DO CUMARY.

Faz-chorar, Veja-se CAHAXIO.

Fedegoso. *Cassia sericea*. SW. LEGUMINOSAS.

Usos. Eminentemente diaphoretico. Suas sementes torradas são tonicas. O succo das folhas anti-dartroso; a raiz em cozimento desobstruente. Ha ainda a especie *Cassia alata* Linneo, ou *C. herpetica* Jacq. com a mesma virtude da *C. sericea*.

Fedegoso do Pará *Hiliotropium indicum*. Borrageneas. Não será o Aquaracinha-açú?

Usos. Os mesmos do *fedegoso*.

Fedorenta. Veja-se CIPÓ CRUZ.

Feijão. *Phaseolus vulgaris*. LEGUMINOSAS.

Usos. As sementes são alimenticias porém indigestas e proprias de estomagos fortes. Ha inumeraveis especies de feijões: *fidalgo*, *mulatinho*, *roxo*, *encarnado*, *corado*, etc.

Feijão carrapato. *Phaseolus tumidus et sphaericus*. LEGUMINOSAS.

Feijão coco. Veja-se Barú.

Feijão fradinho. *Dolichos monachalis*. Brotero. LEGUMINOSAS.

Feijão da India. *Dolichos Sinensis*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Feijão da praia. Veja-se Comandabyba. *Sophora littoralis*.

Feijão preto. *Derasus Phaseolus*. Schrank. LEGUMINOSAS.

Feto grande. *Pteryx caudata*. Filiceas.

Feto macho. *Aspidium lepidopteryx*. Filiceas.

Feto macho. Indigena. *Polypodium instans*. Filiceas.

Usos. Sua raiz é um poderoso teniacida. Há ainda no Brasil a especie *Polypodium scabrum*.

Figueira da barbaria. *Cactus opuntia*. NOPALEAS.
CACTEAS.

Usos. O fruto é anti-scorbutico, e tinge de vermelho as ourinas. Emprega-se como refrigerante nas febres gastricas biliosas. Verde e pisado é util nas ulceras sordidas.

Figueira do inferno. *Datura stramonium*. SOLANEAS.

Usos. Empregada nas molestias mentaes. Na provincia de Minas usão o seu cozimento como gargarejos nas odontalgias nervozas acompanhadas de gengivite. Suas folhas que tem um cheiro nauseante quando verdes, o perdem quando seccas, e são gabadas na coqueluche, asthma, rheumatismo e nevralgias. Da-se em cigarros, em pó, em succo, em infusão e em extracto.

Flôr d'agoa. *Pistia occidentalis*. AROIDEAS.

Usos. Esta planta contusa é um bom maturativo. Internamente é empregada contra a estranguria, affecções herpeticas, arthriticas. Em dóse elevada é venenosa.

Flôr de babeiro. *Echitis longiflora* Desf. APOCYNÉAS.
S. Paulo, Rio, Minas.

Usos. A raiz fornece um succo que é drastico. Os veterinarios o empregão contra as febres putridas dos animaes.

Flôr de casamento. *Echites*. APOCYNÉAS.

Usos. O succo lacteo é resolutivo. Com esta flor se adornão os indigenas do Norte.

Flôr do paraíso. Veja-se. Flor de Pavão.

Flôr de pavão. É a *Poinciana pulcherrima* de Velloso conhecida no Rio de Janeiro com o nome de *chagas*.

Usos. No Norte se faz uso do cosimento desta planta nas anginas tonsillares, e nas dores de dentes A infusão das flôres é purgativa. A raiz é um antefebriil mui empregada nas febres terçasas.

Flôr da quaresma. *Lasiandra maximiliana*. D C. M.
LASTOMACEAS.

Usos. Tinturaria.

Ainda ha mais 3 especies.

Lasiandra langsdorffiana. D C.

» *proteaeformis*. D C.

» *argentea*. D C.

Flôr de S. Miguel. *Petrea*. Verbenaceas. Rio de Janeiro. e Minas.

Usos. Os de Verbenaceas em geral.

Folha grossa. Veja-se *Sayão*.

Folha Santa. Veja-se *Malva do Campo*.

Fruteira de arara. Veja-se *Andaagû*.

Fruteira de burro. *Uvaria febrifugo*. ANONACEAS.

Usos. Ante-febril.

Fruteira de conde. *Anona escamosa*. Linneo ANONACEAS.

Usos. Fruto mucilaginoso doce e agradável proprio para os convalescentes. Foi importada na Bahia em 1626 pelo conde Diogo Luiz de Oliveira.

Fruteira de lobo. *Solanum lycocarpum* vel *auriculatum*. SOLANEAS. Rio de Janeiro. Parahiba. Ouro Preto.

Fruteira de paraô. *Schmidelia edulis*. SAPINDACEAS. Minas S. Paulo.

Usos. Sabor doce e agradável.

Fruteira de pomba. *Erythroxilon anguifugum*. Martius. ERYTHROXILEAS. Cuiabá.

Usos. Efficaz nas mordeduras de cobras e empregada na tinturaria pela bella côr preta que fornece.

Fruteira de perdix. Veja-se *Mureci*.

Fumo. *Nicotiana tabacum*. Linneo. Solaneas.

Usos. As folhas verdes aquecidas e postas sobre o ventre são uteis nas colicas. Seccas e fumadas como charuto servem na asthma. Em cozimento e dado em clysteres são antitetanicas e vantajosas nos volvulos. O succo da folha verde topicamente applicado é antiscrophuloso. O pó do tabaco é hemostatico.

O Fumo em doze elevada é veneno narcotico acre. Todos sabem o grande emprego do fumo em charutos cigros &c. A doze é de 36 grãos para 8 onças de infusão.

Fumo bravo. *Achyrothera corimbosa*.

Usos. O cosimento da planta temperado com sal é empregado quer internamente quer em clysteres nas sezões.

Fumo bravo de Mina. E' *Herva Collegio* no Rio de Janeiro.

Fumo bravo. Nome dado por Velloso ao — *Solanum tabaciforme*.

G.

Gafanhoto no Maranhão. *E' a rã de cobra no Pará.*

Galhinha chôca. *Erythroxylon suberosum.* S. Hilairc.
ERYTHROXILEAS. Minas.

Usos. Serve em fomentações como adstringente e corroborante, e fornece uma materia corante vermelha fusca.

Gamelleira. *Ficus doliaria.* Martius. ARTOCARPEAS. Rio de Janeiro S. Paulo e Minas.

Usos. O succo é acre e julgado anthelmintico, e usado contra as hydropesias. Lino Coitinho o applicava nas opilações. E' um bom remedio para as boubas dos pés, vulgarmente chamadas cravos. Sua madeira serve para gamellas.

Garfuana. Veja-se *Cilorus tinctoria.*

Genciana brasileira. *Lisianthus pendulus.* Martius. GENCIANEAS. Minas Geraes.

Usos. Raiz amarga, tonica e estomachica. Ha mais a especie *amplissimus* que têm as mesmas propriçdades.

Genipapeiro. *Genipa americana.* Linneo. Velloso. *Genipa brasiliensis.* Martius. RUBIACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Os frutos são as vezes do tamanho de uma laranja. Os caçadores os comem para se desalterarem. Elles contém um succo violto que pôde servir de tinta, porem que desbota em poucos dias. Sua raiz é purgativa. A planta é empregada nas diarrricas, e em loções nas ulceras syphiliticas, e escorbuticas. Os grcos pisados com azeite são desobstruentes (fomentação.)

Geratacaca. Veja-se MANACÁ.

Gerema. Veja-se JUREMA.

Gergelim. *Sesamum orientale.* Linneo. BIGNONIACEAS.

Usos. O oleo das seimenes desta planta é empregado na confecção do sabão. E' fino mas não tanto como o de amendoas, e serve tanto para luz como para a comida. Tambem se utiliza como cosmetico, e nas ophtalmias.

Gervão. *Verbena jamaicensis.* Linneo. VERBENACEAS.

Usos. A infusão das folhas é sudorifica, febrifuga e vulneraria. E' empregada como chá no almoço em casos de hepatite chronica. Sua applicação externa nas ulceras é proveitosa. Entra na composição do unguento de sumos, ou desobstruente do Dr. Silva.

Gervão de folha grande. *Verbena pseudo gervão.* *Bouchea.* Cham. VERBENACEAS. Minas e S. Paulo.

Usos. Os mesmos do gervão.

Gigoga. *Nymphaea alba.* NYMPHOACEAS.

Usos. Calmante. O cozimento interna ou externamente é usado nas elephantiasis dos Gregos.

Gilbarreira. *Ruscus aculeatus.* SMILACEAS. ASPARAGINEAS.

Usos. Diuretico empregado nas hydropesias e molestias das vias urinarias.

Giló. *Solanum giló.* SOLANEAS.

» *racemiflorum.* Dunal.

Usos. Amargo, tonico e empregado o fructo como condimento.

Gingeira brava. *Prunus brasiliensis.* Cham. AMYGDALINEAS. Minas, S. Paulo e Mato Grosso.

Usos. Tem as mesmas propriedades do louro-cereja europeu. Ha mais outra especie. *Prunus sphaerocarpa.* Sw.

Gingeira da Jamaica. *Malpigea glabra.* MALPIGEACEAS. Pará.

Usos. Os fructos são comestiveis.

Gingibre. *Zingiber officinalis.* Linneo. AMOMACEAS.

Usos. Excitante, administrado nas dyspepsias, colicas flatulentas e no cholera.

Ginsão. *Panax quinquefolium.* Linneo. *Aureliana canadensis.* ASPARALIAS.

Usos. Aphrodisiaco.

Giqui. *Spondias tuberosa.* BURSERACEAS.

Usos. Os do Imbuzeiro.

Giquiriti.

Usos. As sementes pulverisadas e postas em infusão n'agua fria são usadas em banhos quotidianamente até arder os olhos nas ophthalmias.

Girinato. *Vitex gardneriana.* VERBENACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Desobstruente e aperitivo excitante.

Goajuru. *Chrysobalanus icaco.* Linneo. CHRYSOBALANEAS.

Usos. As folhas e a raiz são adstringentes e empregadas em banhos para entesar as carnes. Tira se tambem vantagem nas leucorrhœas e blenorrhœas. Habita as bordas do mar. A dose das folhas é de 3 a 5 oitavas, a da raiz de 1 a 2 onças. A amendoa do fructo serve para emulsão anti-dysenterica.

Gonu. E' o Tajuá de Quiabo em Minas.

Grama. *Triticum repens.* Linneo. GRAMINEAS.

Usos. Seu cosimento é diuretico e refrigerante e usado como bebida nas molestias inflammatorias.

Grama do Maranhão. Veja-se *Tabuquinha.*

Grama da praia. *Stenotaphium glabrum.* GRAMINEAS.

Bahia.

Usos. A raiz é emolliente e refrigerante.

Grãos de gallo. *Rhamnus iguineus.* Velloso. RHAMNEAS.

Usos. Os fructos são umas bagas pequenas assucaradas e comestiveis.

Grãos de gallo. *Cinchona caprifolia.* Lacerda. RUBIACEAS.

Pará.

Usos. Tonica.

Grauna. Veja-se *Brauna.*

Gravata. *Bromelia medicalis.* Lamarck. *Bromelia karaté.* BROMELIACEAS.

Usos. E' uma planta filamentosa cujos fios servem para cordas e pôdem ser tecidos. Na reunião de suas folhas radicaes junta-se uma grande porção d'água que serve para desalterar os viajores. Ha muitas especies deste genero.

Gravata de agulha. *Bromelia muricata.* BROMELIACEAS. Pernambuco.

Gravata guassu. Veja-se *PITEIRA.*

Gravata de rede. *Bromelia sagenaria.* BROMELIACEAS.

Pará.

Usos. Os mesmos do gravata. E' desta especie que os indigenas tirão o fio com que preparão suas redes.

Gritadeira. *Palicourea sonans.* Martius. S. Hilaire. RUBIACEAS. Minas Geraes.

Usos. Os mesmos da *herva de rato.* Parece ser a *Palicourea strepens* de S. Hilaire.

Gritadeira do campo. *Palicourea strepens.* S. Hilaire. Martius. RUBIACEAS. Minas Geraes.

Usos. Os mesmos da *herva de rato*, porém mais applicada nos homens.

Gritadeira de S. Paulo. Veja-se *Douradinha do campo.*

Grumixameira. *Eugenia brasiliensis.* Martius. MYRTACEAS.

Usos. Os fructos arroixados tem um sabor fresco e a gradavel. São acidulos e ligeiramente adstringentes.

Guabiju. Veja-se *Guabira guaçu.*

Guabiraba. *Cordia rotundi folia.* Ruiz. BORRAGENEAS.

Usos. Suas flores destiladas são optimas nas ophtalmias. Seus fructos, cuja substancia é doce se come com prazer. Suas folhas que são aromaticas servem para banhos, e o pó do carvão de sua madeira gira as belides.

Guabira-guaçu. *Eugenia Guabijú.* Martius. Myrtaceas.

Usos. Adstringente. Os seus fructos são doces.

Guabiroba. *Eugenia de pauperata.* Camb. MYRTACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. As folhas desta planta são empregadas contra a diarrhea mucosa catarrho vesical, e leucorrhea. Internamente toma-se a infusão; externamente clysteres, loções e fomentações.

Ha ainda duas especies.

Eugenia variabilis. Martius. Rio Grande do Sul.

» *xanthocarpus.* Martius.

Guaco. *Mikania guaco.* COMPOSTAS.

Usos. Sodorifico poderoso; anti-syphilitico, anti-rheumatico, e util nas mordeduras das cobras.

Guaibabe ambe. *Psidium aromaticum.* MYRTACEAS. Pará.

Usos. Adstringente.

Guaibabeira. *Psidium pommiferum.* Linneo. MYRTACEAS.

Usos. E' empregada como adstringente nas leucorrheas, diarrheas, e no cholera. Seus fructos amarellados (quando maduros) externamente e avermelhados no interior são agradaveis ao palladar, e servem para a confecção do doce goiabada. Existem 64 especies de goiabadeiras.

Guaibabeira do matto. *Myrtus sylvestris.* MYRTACEAS.

Usos. Adstringente.

Guaibabeira de S. Paulo. *Psidium incanescens.*

Guaibabeira de Pernambuco. *Psidium pubescens.*

Guaibabeirana. *Psidium acutangulum.* Rio Negro. MYRTACEAS.

Usos. Todas são mais ou menos adstringentes e como taes empregadas.

Guaibipocaiba. *Mimosa vaga* Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. A infusão da casca desta arvore serve nas molestias das vias urinaarias.

Guaimbê. *Caladium lacerum*.

Manso admittia duas especies : *lacerum* e *pendulum*.

Usos. A raiz se dá na dose de 5 a 20 grãos nas hydropesias, e externamente as folhas em banhos nas affecções rheumaticas. O Guaimbê de Manso é sem duvida alguma o cipó Imbê ou então alguma especie deste vegetal.

Guajará. *Vicentia acuminata*. Allemão. COMBRETACEAS.

Usos. Madeira de lei.

Guajará timbo. *Indigofera tinctoria*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. Fornece uma bella côr azul propria para a tinturaria. E' a *Caachira* do Norte.

Guajeru'. Veja-se *Goajurá*.

Guanandy. E' no Maranhão a planta conhecida no Pará pelo nome de ANANI.

Guando. *Cajanus flavus*. D. C. *Cytisus Cajanus*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. As folhas e pontas dos galhos são peitoraes e anti-odontalgicas. As folhas fervidas curão as chagas, e o succo é anti-ble-norrhagico.

Guaparaiba. Veja-se *Mangue vermelho*.

Guapebeira. *Guapeba laurifolia*. Gomes.

Usos. Seus fructos, *drupas*, são comestiveis, e tem a fórma e o sabor da maçã.

Guapeva de S. Paulo. *Hypanthera guapeva*. Manso. NHANDIROBACEAS.

Usos. Empregão de 4 a 2 sementes na ictericia. Em doze elevada é drastico.

Guapicobaiba. *Cassia brasiliensis*. Lamarck. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos da *Cassia ordinaria*. Acredito ser esta planta a mesma que Linneo classificou com o nome de *Cassia mollis*.

Guaporanga. Veja-se *Guapurongo*.

Guapuronga. *Marliera tomentosa*. S. Paulo.

Usos. Os fructos são doces e comestiveis.

Guapuy. *Gaupuy longisilicula*. Bignoneaceas.

Usos. E' empregado em banhos em diversas molestias syphiliticas. A raiz desfeita n-agua é um bom antiophthalmico.

Guarabu'. *Astronium concinium*. Martius. ANACARDIACEAS.

Usos. Nos mesmos casos em que é util a resina de Terebenthina é empregada a do Guarabu.

Guarahem Veja-se *Buranhem*.

Guaraná. *Paullinia sorbilis*. Martius. SAPINDACEAS. Pará.

Rio Negro, Amazonas. Cipó que exposto ao sol transforma-se em arbusto.

Usos. Os indigenas nascão os grãos do guaraná para se livrarem das febres intermitentes que assolão o paiz. O arilo vermelho das sementes serve para tingir os dentes, cousa tida por bonita pelos selvagens. O guaraná preparado como se acha no commercio, é empregado depois de pulverisado e mixturado com agua assucarada, como estomachico, antifebril, e antiaphrodisiaco nas affecções nervozas do estomago e do tronco celiaco. Elle calma os movimentos do coração e das arterias, e augmenta o suor. Tambem se julga proveitoso, na tympanite, anorexia, hemicranea, e secura da pelle. E' contra indicado nas congestões cerebraes, na repleção das visceras abdominaes. O guaraná excita o appetite venereo, porém diminue a quantidade do licor espermatico. Os pães de guaraná do commercio são compostos das sementes privadas do arilo, e seccas e pulverisadas, mixturadas com amendoa de cacao e fariuha de mandioca. São tão duros estes pães ou celindros, que só a grosa, ou a lingua do pirarucú (peixe do Pará) os póde pulverisar.

Guarana-uva. Veja-se *Guarana*.

Guaraquim Veja-se *HERVA MOIRA*.

Guaraquymia. Arbusto do Brasil, vermifugo, e semelhante ao myrto.

Guararema. Veja-se *Ibirarema*.

Guardião. *Melothria officinalis*. CUCURBITACEAS. Pernambuco.

Usos. Emeto-cathartico.

Guaré. *Guarea trichilioides*. Linneo. MELIACEAS.

Usos. O succo leitoso é emeto-cathartico poderoso. A infusão da planta é menos forte.

Guaviroba do Pará. *Eugenia myrobalans*. D. C. MYRTACEAS.

Guaxima. *Urena lobata*. Canavilles. Linneo. MALVACEAS.

Usos. Emolliente e succedaneo da malva, empregada nas colicas e nos catarrhos e defluxos.

A especie : *Sinuata* é textil.

Guaxima branca. *Helicteres pernambucensis*. MALVACEAS.
Usos. Os mesmos da *Urena lobata*.

Guaxima da mata. Veja-se *Guaxima branca*. Pernambuco.

Guaxima do mangue *Hibiscus pernambucensis*. Arruda. MALVACEAS. Pernambuco.
Usos. Os mesmos das outras guaximas.

Guaxinduba preta. *Ficus radile*. URTICACEAS. Pará.
Usos. O succo leitoso é anthelmintico na dose de 2 a 4 colheres, para as creanças até 12 annos, e de 4 a 8 para os adultos. Julga-se ser seu antidoto a cachaça.

Guazuma. *Guazuma ulmifolia*. BUTINERACEAS.
Usos. Os fructos tem uma substancia muciliginosa doce e agradavel que se come com muito prazer.

Guéreroba de remo. *Aspidospermum muricatum*. APOCYNEAS. Maranhão.

Gulabara. Veja-se Baga da Praia.

Gulna. *Portlandia hexandra*?
Usos. Casca de um sabor desagradavel, amargo, e um pouco adstringente.

Guira. *Struthanthus citricola*. Martius. LORANTHACEAS.
Usos. E' uma planta adstringente mucilaginosa e contundida com oleo e indoaço fogo, constitue um bom unguento. E' uma especie de *Herva de passarinho*.

Guiti. Veja-se OITI.

Guiti-guaçu. Veja-se OITI.

Guiti-mirim. Veja-se OITI DA PRAIA.

Guity. *Sapindus saponaria*. Linneo. SAPINDACEAS.
Usos. Seus fructos acres e verdes antes da maduresa e depois de maduros rubros e transparentes, contem uma massa viscosa amarga com os caracteres do sabão, e servindo para lavar a roupa. A casca do fructo é empregada contra a chlorose.

Guitytoroba. *Lucumariivicoa*. Pison. SAPOTACEAS.
Usos. Seus fructos são gommosos saccarinos e empregados nos fluxos do ventre e catarrhos pulmonares. E' uma especie de *Abiu*.

H.

Herva de amor. Veja-se TREVO.

Herva de anil. Veja-se CAACHIRA. MARCGRAVE.

Herva andurinha. *Euphorbia coccorum*. Martius. *E. linearis* Retz. EUPHORBIACEAS.

Usos. Esta herva contundida é applicada com vantagem nas ulceras syphiliticas inveteradas. Em Pernambuco o cozimento desta planta bebido e applicado em clysteres é util nas diarrhéas, dysenterias, hemorrhoides e pleurizes.

Herva das Barbonos. Veja-se *Barba de velho*.

Herva benta. *Geum urbanum*. ROSACEAS.

Usos. As folhas frescas podem ser comidas como salada. A planta é considerada anti-febril. 1/2 oitava a 1 oitava é a dose.

Herva de bicho. *Polygonum anti-hemorrhoidale*. Martius. POLYGOACEAS.

Usos. É diuretica e temperante quer interna quer externamente em banhos, clysteres ou cosimentos e empregada nas gonorrhéas, retenções de urinas, e hemorrhoidas. Emprega-se tambem na gotta. Seu succo serve para clarificar os xaropes na fabricação do assucar.

Ha ainda duas especies.

Polygonum acre. Kunth.

“ *stipticum*. Cham.

Empregadas nos mesmos casos.

Herva do bicho. Nome dado em alguns logares a herva Moira.

Herva dos cachos. Veja-se *Tintureira vulgar*.

Herva canudo. Veja-se *Alfavaca sylvestre*.

Herva do capitão. Veja-se *Acaricoba*.

Herva de cardo amarello. *Argemona mexicana*. Linneo. PAPAVERACEAS.

Usos. Seu succo é empregado como narcotico sobre os bubões e ulceras syphiliticas. É tambem sedativo e util nas obstrucções, hy-pecondrias, etc. Suas flores são somniferas.

Herva do carpinteiro. Veja-se MIL EM RAMA.

Herva cidreira. *Arrellaria officinalis*.

Usos. Os da herva cidreira usual.

Herva das cobras. CAACICA.

Herva de cobra. *Mikania opifera*. Martius. *Eupatorium crenatum*. Gomcs. *compositas*. S. Paulo e Minas. Rio de Janeiro Santa Cruz.

Usos. E' diuretica e applicada nos mesmos casos em que se emprega a Ayapana. Póde ser util nas febres adynamicas e substituir a *serpentaria*.

Herva chumbo. *Aricenia alveolata*. Lacerda. *LEGUMINOSAS*. Pará.

Usos. A casca é de sabor salgado e empregada nas dores de dentes.

Herva collegio. *Elephantopus tomentosus*. Martius. Graham. *COMPOSITAS*.

Usos. Empregada como tónico em catarrhos pulmonares. O succo fresco desta planta, e sobretudo o do Fumo bravo é lithon-
triptico.

Herva do diabo. Veja-se Loco.

Herva d'empigem. Veja-se *Cumandatiá*.

Herva dos feridos. Veja-se ALBARA.

Herva feiticieira. Veja-se ICICARIBA.

Herva do figado. Veja-se LINGUA DE VACA.

Herva grossa. Veja-se HERVA COLLEGIO.

Herva de S. João. *Glecoena hederacea*. LABIADAS.

Usos. Aromatica e excitante.

Herva minuana. *Oenothera affinis*. S. Hilaire. Martius.
ONAGRARIAS.

Usos. E' vulneraria.

Herva dos muros. Veja-se *Puçá*.

Herva moira. *Solanum nigrum*. Linneo. *SOLANEAS*.

Usos. Esta planta é alimenticia uma vez cozida, pois que a cocção tira-lhe suas propriedades venenosas. Suas folhas frescas se applicão sobre as ulceras dolorozas, fistulas &c. O sumo é util nas feridas da garganta. O cozimento serve para banhar as partes inflammadas e dolorozas, e rheumaticas. A cataplasma feita com as folhas contundidas no estado fresco, e applicadas sobre o hypogastro são de grande proveito nas retenções de urinas espasmodicas. Os fructos, bagas, desta planta são venenosas.

Herva moira do sertão. Veja-se Casca de Para tudo.

Herva mular. Veja-se. ALCAMPHOR. S. Paulo.

Herva dos namorados. Veja-se Puçã.

Herva de Nossa Senhora. Veja-se. CAAPÉBA.

Herva do pai Caetano. *Verbena littoralis*. VERBENACEAS.

Usos. Excitante empregado em banhos e em cozimento das affecções eatarraes.

Herva do pantano. *Sagittaria brasiliensis*. Martius. S. *sagittifolia*. Velloso. ALISMACEAS.

Usos. O rhizoma desta planta preparado em cataplasma com outros medicamentos adstringentes e aromaticos é empregado contra as hernias. Este rhizoma fornece uma especie de farinha que imita a de araruta.

Ha mais as especies.

Sagittaria palaefolia Nees Martius.

» *rhombifolia* Cham.

Herva de passarinho. *Loranthus*. Loranthaceas.

Usos. Consolidante. Empregado tambem nas uleeras, e em clysteres nas diarrheas.

Herva de palo. Veja-se. Mate.

Herva pombinha. *Phyllanthus myerophyllus*. Martius. *P. niruri* Linneo. *P. parvifolius*. Stend. EUPHORBIACEAS.

Usos. O cozimento das folhas e das sementes adoçado com um xarope tonico (caseas de laranjas) é empregado na diabetes saccharina. Os indigenas a tem como desobstruente e anti-icterica e anti-dysenterica.

Herva preiã. *Chrysocoma repanda*. Velloso. SYMANTHEREAS. Rio de Janeiro.

Usos. Empregada em banhos nas erysipelas brancas,

Herva de rato. *Palicourea Marcgravii*. S. Hilaire. RUBIACEAS. Rio de Janeiro e S. Paulo.

Usos. Seus fructos mixturados com toucinho servem para matar ratos, donde lhe vem o nome. As folhas em pequena doze (1 cseropulo para 6 onças d'agua em infusão) são mui diureticas sobretudo nos animaes cavallares. Convem tambem nas affecções da pelle.

Herva de rato. Minas. *Palicourea nicotianaeifolia*. Cham. RUBIACEAS.

Usos. Os mesmos da herva de rato do Rio de Janeiro.

Herva de rato de Goyaz. *Rubia noxia*. RUBIACEAS.

Usos. Planta venenosa e produzindo uma bella tinta vermelha.

Herva Santa. *Baccharis ochracea*. Martius. COMPOSTAS. Rio Grande do Sul.

Usos. É uma optima vulneraria amargosa ; emprega-se nos mesmos cazos da *Carqueja*.

Herva. Santa Da-se este nome ao *Fumo* em muitos logares do Brasil.

Herva de Santa Anna. *Kuhnia arguta*.

Usos. Muito empregada nas mordeduras de cobras.

Herva de S. Cactao. *Momordica charantea*. Linneo. CUCURBITACEAS.

Usos. Empregada nas colicas verminosas, nas leucorrhœas, nas menstruações tardias, e nas dores rheumaticas. Nesta ultimo caso aquecem-se as folhas e enrolão-se com ellas as partes rheumaticas. Succedaneo do sabão na lavagem da roupa. Friccionando-se o corpo com esta planta os morpheticos obtem melhoras.

Herva de Santa Helena.

Usos. Em banhos nos resfriamentos.

Herva de Santa Luzia. *Euphorbia brasiliensis*. Lamarch. *E. hypericifolia*. Linneo. *E. linearis*. Retz. EUPHORBACEAS. Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas e Bahia.

Usos. Emprega-se em fórma de cataplasma nas ulceras chronicas e syphiliticas e passa por optimo remedio contra as belhdes. Esta applicação precisa ser feita com criterio, visto ser o succo desta planta caustico. A herva de Santa Luzia do Rio de Janeiro que parece ser a *Euphorbia ophthalmica* de Commerson é a mais applicada por ser menos caustica.

Herva de Santa Maria. *Chenopodium ambrosioides*. Linneo. CHENOPODIACEAS.

Usos. A planta eminentemente aromatica é um poderoso antelmintico. Suas sementes se dão em oleo na doze de 12 a 24 grãos e infusão de 2 a 4 oitavas para 2 libras d'agua. 1 colher do succo da planta e 2 de oleo de ricino é um bello vermifugo sobretudo applicando-se sobre o ventre uma cataplasma feita das folhas socadas e vinagre.

Herva de S. Pedro. *Hiptis melepaefolia*. Labiadas Pará.

Usos. Aromatica.

Herva de sapo. Veja-se. *Azedinha do brejo*.

Herva tostão. *Boerhavia hirsuta*. Martius. Linneo. NYCTAGINEAS.

Usos. A raiz que é da grossura de um dedo, roixa por fóra e branca por dentro é empregada como um poderoso desobstruente das visceras abdominaes. Infusão: 3 oitavas para 12 onças d'agua fervendo. Decocção em cataplasma com farinha de linhaça.

Herva venenosa. *Echites venenosa*. Martius. APOCYNACEAS.

Usos. O seu nome indigena e botanico indica suas qualidades.

Herva de vintem. Planta do Maranhão, de sabor amargo e applicado como tonico e nos catharrhos.

Hervinha de parida. *Declieuxia aristolochia*. Martius. *Asperula cyanea*. Velloso. RUBIACEAS.

Usos. A raiz é acre amargosa e empregada na amonorrhea e supressão de locchios.

Hervinha secca. *Parmelia rocella*. LICHNEACEAS

Usos. Tinturaria.

Hiva-hai. Grande arvore indeterminada que cresce nas bordas do Paraná.

Usos. os frutos são amarelllos de 1 e $\frac{1}{2}$ a 2 pollegadas de diametro, esponjosos, acerbos, e purgativos. Entre tanto os Guaranis usão como desalterantes.

Humiri. *Humrium floribundum*. Martius. MELIACEAS.

Usos. A casca é adstringente.

1.

Iarumá. Veja-se *Ambaitinga*.

Ibabiraba. *Myrtus arborescens*. Britoa *trifolia*. Marcgrave. MYRTACEAS. Pará.

Usos. As folhas e as flores fervidas com o *Camará* constituem um bom revulsivo applicado em banho aos pés. Os fructos são comestiveis.

Ibacurupari. Veja-se BACURY.

Ibaiariba. *Andira rosea*. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do *Angelim*.

Ibametara. *Imbuzeiro*. Velloso.

Iba-purunga. Marcgrave. RHAMNEAS.

Usos. O fructo contém 3 amendoas brancas comestiveis.

Ibipitanga. Veja-se *Pitangueira*.

Ibira. *Xilopia frutescens*. Pison. Aublet. ANONACEAS.

Usos. Seus fructos aromaticos são estomachicos e digestivos e segundo Pison se applicão contra as mordeduras de cobras.

Ibiracem. *Liquirites sylvestris*. Solaneas?

Arbusto empregado pelos indigenas nos mesmos casos em que usamos do *alcaussus*.

Ibiraem. Veja-se *Ibiracem*.

Ibira-obi.

Nome de uma das especies de Páo-ferro. Marcgrave.

Ibira-pitanga. *Cesalpina echinata*. Lamarch. LEGU-
MINOSAS.

Usos. Este genero é que fornece o verdadeiro páo brasil, e dá a melhor tinta.

E' adstringente e anti-escorbutico.

Ibirapitanguassu Veja-se *Ibirapitanga*.

Ibirarema. *Seguiera americana*. Velloso. *S. floribunda*.
Cerdonia. Ildesonso. PHYTOACEAS.

Usos. E' empregado nas molestias rheumaticas herpeticas e nas hydropesias. A sua lexivia serve para a purificação do assucar e fabrico do sabão.

Ibirubá. Veja-se *Pitangueira do mato*.

Ibirube. Veja-se *Jaracatia*.

Ibixuna. Pison. Veja-se *Mutambo*.

Icicariba. *Amyris clemifera*. Linneo. *Icica icicariba*. D. C.
TEREBENTHINACEAS.

Usos. E' a planta que fornece quasi toda a resina elemi, que existe no commercio. Esta resina entra na composição de muitos emplastros.

Ha ainda a:

Icica heptaphylla. Aubl.

» *gujanensis*. Aublet.

» *altissima*. Aublet.

Encontradas na região do Amazonas, e conhecidas pelo nome generico de *Almcegueira*.

Icipó. Segundo Marcgrave é a *Tetracera oblongata*. DILLI-
NEACEAS.

Ighucani.

Nome de um vegetal ainda não classificado, e cujo fructo semelhante ao marmello é um poderoso remedio contra a dysenteria.

Imbè Veja-se *Cypó de Imbè*.

Imbira. Veja-se *Pindahyba*.

Imbiri. *Canna glauca*. Linneo. MARANTACEAS.

Usos. Sua raiz é diuretica e aromatica. Em banhos a planta é anti-rheumatica. O succo da planta se emprega nas otites e no mercurialismo.

Imbirussu'. *Bombax hexaphyllum*. Velloso. Rio de Janeiro.

Imbu'. Veja-se. *Imbuzeiro*.

Imburana. *Bursera leptophlocos*. Martius. TEREBENTHINACEAS. Bahia. Rio de Janeiro.

Usos. Da casca da imburana se extrahe por meio de incisões uma rezina liquida analoga a da *terebenthina* e que se emprega em lugar desta ou da *copahiba*.

Imbuzada. O succo do fructo do *imbuzeiro* mixturado com leite coalhado e adoçado com assucar ou mel.

Imbuzeiro. *Spondeas venulosa*. Arruda. BURSERACEAS. TEREBENTHINACEAS. Bahia.

Usos. O fructo que contem uma substancia amarellada acida e doce é mui agradavel, e a amendoa deliciosa. O succo do fructo com leite e assucar fórma a *imbuzada* tão conhecida e apreciada nos sertões da Bahia e Pernambuco. Tanto o fructo como as tuberas que se achão na raiz do *imbuzeiro* são dadas aos febricitantes como um agradável refrigerante. Marcgrave diz haver uma especie de *imbuzeiro* cujas raizes aquozas contem a mais bella agua para beber, de grande recurso ao viajante. Do *imbuzeiro* se extrae tambem uma tinta roixa.

Índigo do Brazil. *Solanum indigoferum* S. Hilaire. SOLANEAS.

Usos. E' cultivada para della extrahir-se o *índigo*

Ingá. *Ingá edulis*.

Ingá cabelludo. *Ingá vellutosa*. Pará.

Ingá opeapiiba. *Ingá dulcis*.

Ingá mimoso. *Ingá tetraphylla*. LEGUMINOSAS.

Usos. Os fructos são comestiveis, sendo o mais saboroso o *cabelludo*.

Inhame. *Arum colocasia*. Linneo. AROIDEAS.

Usos. A raiz é nutritiva e muito uzada em algumas Provincias. Come-se cozida ou assada.

Inhame de S. Thomé. Veja-se. *Cará*.

Enimboja. *Guilandina*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. Arbusto espinhozo cuja raiz branca delgada e de um sabor amargo excita o vomito. E' empregado contra agororrhica e as convulsões. Confunde-se com o *Juquirirana* que é tambem uma *guilandina*.

Inquiri. Veja-se. Malicia das mulheres.

Ipê. *Bignonia longiflora* Velloso. *Bignonia chrysanta*. DC. *Tecoma ipê*. Martius. BIGNONIACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. O cosimento da casca do ipê é empregado nas anginas syphiliticas e nos dartros. O cosimento das folhas é util nas blenor-rhagias oculares, e o succo expresso das folhas é applicado na paralyisia palpebral. Acredita o vulgo que o ipê é lithontriptico.

Ipê Branco. *Patagonula vulneraria*. Rio Grande do Sul. CARDUACEAS.

Usos. E' vulnerario. Muito empregado contra os engorgitamentos inguinaes ;

Ipê-eaa-goene. Veja-se. *Ipecacuanha*.

Ipê mirim. é Sudorifico.

Ipê roxo. *Bignonia curialis*. Velloso. BIGNONIACEAS.

Usos. Os mesmo do ipê.

Ipê contra sarnas. *Tecoma impetiginosa*. Martius. BIGNONIACEAS. Piahy.

Usos. Seu cosimento é empregado em loções, banhos, injeções contra os dartros, as leucorrheas e os catarrhos vesicaes.

Ipecacuanha. Nome de muitas raizes pertencentes a vegetaes de generos e até mesmo de familias differentes. Marcgrave e Pison forão os primeiros que fallarão das virtudes da ipecacuanha. Distingue-se geralmente 3 especies.

A ipecacuanha anelada. *Cephaelis ipecacuanha*.

A ipecacuanha estriada. *Ptychotria emetica*

A ipecacuanha ondulada. *Richardsonia scabra*.

Estas especies, e suas diversas variedades são todas officinaes e dotadas em maior ou menor gráo de acção vomito cathartica.

Ipecacuanhas falsas. Raizes de diversas plantas pertencentes as Rubiaceas, Violaceas, Asclepiadeas, e Euphorbiaceas e que possuindo virtudes emeto catharticas não gozão contudo da importancia das que vimos de descrever. A maior parte destas raizes é conhecida com o nome de Poaya.

Ipecacuanha. *Cephaelis ipecacuanha*. Richard. RUBIACEAS

Usos. Emetica em alta dóse a raiz desta planta é tambem expectorante em pequena dóse, e empregada com vantagem nas dysenterias, garrolho, coqueluche, e catarrhos pulmonares etc.

Ipecacuanha branca. *Jonidium ipecacuanha*. Vent. JONIDEAS. VIOLAREAS?

Usos. Ha as especies seguintes.

Jonidium poaya. S. Hilaire. Minas.

Jonidium brevicaulis. Martius. Minas.

Jonidium urticaefolium. Martius. Bahia.

Jonidium parviflorum. S. Hilaire. S. Paulo.

Ipê-uva. Veja-se. Cinco folhas.

Ipu'. E' a jalapa em Minas.

Itoubu. *Jonidium ipecacuanha*. *Jonidium Itubu*. Kunth. VIO-
NAREAS.

Usos. Esta planta que frequenta os logares arenosos e de beira mar é emética.

Iva-umbu. *Marcgrave*.

Usos. O fructo é comestivel, e contem uma amendoa analoga a amendoa doce. Suas raizes dão agua boa para beber.

J.

Jaborandi. *Menieria trifolia*. Linneo. **RUTACEAS.**

Usos. Diuretica e sudorifica. Sua decocção (sementes) é anti-ophthalmica. Empregado em Pernambuco, onde é conhecido por *Alfavaca*, nas erysipelas, e inchações.

Jabotá. *Anisosperma passiflora*. Manso. *Feuillea passiflora*. Velloso. **NIANDIROBEAS.** Cucurbitaceas?

Usos. A semente ou castanha de Jabotá dá um oleo amargo sebaceo ou resinoso julgado util como estomachico. Dose 3 a 4 castanhas.

Ha ainda a:

Feuillea monosperma. Velloso. Com a mesma propriedade.

Jabotapita. *Gomphia parviflora*. **OCHNACEAS.** Velloso.

Usos. O oleo que se extrahê do fructo é util aos preparadores de conservas.

Jabotapita de Minas. *Gomphia hexasperma*. Saint-Hilaire. **OCHNACEAS.**

Usos. Emprega-se o cozimento da casca no curativo de feridas produzidas por mordeduras de insectos.

Jaboticabeira. *Myrtus cauliflora*. Martius. **MYRTACEAS.**

Usos. A polpa do fructo (jaboticaba) é acidula e agradável, a casca adstringente. E' empregada em gargarejos nas anginas. Ha diversas especies.

Jabotimata. *Dellilea grandiflora*. **LEGUMINOSAS.** Norte.

Usos. As folhas cozidas são uteis nas queimaduras. A planta é adstringente.

Jabotimembecca, Veja-se *Jabotimembeu*.

Jabotimembei. *Piperina pellucida*. PIPERINEAS.
Usos. Excitante aromatico.

Jacamineaa. *Commelinea serrata*. COMMELINEAS. Pará, Amazonas.
Usos. Anthelmintico.

Jacapé. Veja-se *Sapé*.

Jaçapé. Veja-se *Capim cheiroso*.

Jacarandá Cabiuna. Veja-se *Cabureiba*.

Jacarearu. Veja-se *Caferana*.

Jacare-uva. Veja-se *Lantim*.

Jacarey-atana. *Gouania apendiculata*.
Usos. O cozimento é empregado em banhos contra a caspa do cavallo (dartros perfuraceo).

Jacatupé. Veja-se *Mendobi*.

Jacé. Veja-se *Melancia*.

Jalapa de S. Paulo. *Piptostegia Pisonis*. Martius. CONVULVACEAS. S. Paulo.

Usos. Os mesmos da *Batata de purga*. As doses as mesmas.

Ha ainda outra especie :

Convolvulus paulistanus. Manso.

Jalapão. Veja-se *Tiu*.

Jalapá de Mato Grosso.

Convolvulus punicus...
Convolvulus polyrrhizus } Manso.
Convolvulus giganteus... }

CONVOLVULACEAS.

Usos. Os mesmos da *Batata de purga*.

Jalapinha. *Convolvulus pendulus*. Manso. CONVULVULACEAS. S. Paulo.

Usos. Os mesmos da *Batata de purga*.

Jamacaru. *Cereus geometricans*. Martius. CACTEAS. NO-PALEACEAS.

Usos. Os mesmos da *Jumbaba*.

Ha ainda trez especies com as mesmas propriedades do *Jamacarú*.

Cereus triangularis. D. C. Velloso.

" *pentagonus*. Linneo.

" *variabilis*. Pison.

Jambeiro. *Eugenia jambosa*. *E. vulgaris*. MYRTACEAS.

Usos. Seus fructos são rosaceos aromaticos, e agradaveis, porém quentes. As folhas da arvore envenenão, porém a raiz é o antidoto desse envenenamento. Das flores se faz um xarope ligeiramente laxativo.

Janapuça. Veja-se *Puçã*.

Jandiparana. Veja-se *Janiparandiba*.

Jangadeira. Veja-se *Embira branca*.

Janiparandiba. *Gustavia brasiliensis*. D. C. *Pirigara tropetala*. Aubl. MYRTACEAS. D. C. LECYTHIDEAS. Aubl. Pará, Maranhão e Pernambuco.

Usos. A raiz é um excellento resolutivo das glandulas mesentericas, e do figado. Sua cataplasma é util nas splenites. O fruto embebeda e produz vomitos. O succo do fructo tinga a pelle de preto.

Japecanga. *Smilax glauca*. Martius. *Herreria salsaparrilha*. SMILACEAS. Minas e Rio de Janeiro.

Usos. Os mesmos da *salsaparrilha*. Existem diversas especies.

Japoarandiba. Veja-se *Janiparandiba*.

Jaqueira. *Artocarpus brasiliensis*. Gomes. *A integrifolia*. ARTOCARPEAS.

Usos. Suas sementes cozidas e comidas como amendoas são de agradável sabor e aphrodisiacas. Seu fructo enorme e pesando as vezes mais de meia arroba é apreciado pelos indigenas e mesmo pela raça européa.

Jaracatiá. *Carica doddecaphylla*. Velloso. PAPAYACEAS. Itamaracá e Provincias do Norte.

Usos. Os mesmos do Mamoeiro. Ha ainda uma outra especie *Carica digitata* Aublet.

Jaracatiá. Este nome tambem se dá a uma especie de *cacteo*, cujos fructos segundo Pison são comestiveis e mui empregados nas febres inflammatorias.

Jararaca. *Dracontium polyphyllum* Aroidcas. Pará.

Usos. A raiz farinacea contundida modifica as ulceras. Internamente é empregada contra a asthma, a chlorose, amenorrhea e a mordedura de cobras.

Jararaca. *Dracunculum pedatum* Linneo. AROIDEAS. Bahia.

Usos. Por ter a cõr da jararaca (cobra) é assim denominada e julga-se naquella provincia ser esta planta um antidoto contra o veneno da cobra. Julgo ser a mesma que existe no Pará descripta por Lacerda. *Dracontium polyphyllum*.

Ha outro genero *Arisema pythonium*.

Jarere. Leguminosa. Marcgrave. Especie da *mandobi*

Jaroba. *Tanaecium jaroba*. Marcgrave. SOLANEAS.

Usos. Os fructos desta trepadeira são adoçantes e peitoracs.

Jarrinha. *Aristolochia macroura*. Gomes. *Aristolochias*.

Usos. Nos mesmos casos em que se emprega o Mil homens.

Ha ainda as seguintes especies *Aristolochia brasiliensis* Martius
" *galeata* Martius.

Jaruma. Veja-se *Ambaiatinga*.

Jasmim Mangueira. *Cerbera mangas*. APOCYNES.

Jasmim do Mato. *Tabernaemontana citrifolia*. APOCYNES.

Pará.

Usos. Excitante. O succo leitoso é empregado topicamente para acalmar as dores de estomago.

Jatahy. Veja-se *Jetahy*.

Jatobá *Hymenoxa stilbocarpa*. Hayne. Martius. LEGUMINOSAS.

Usos. E' uma das plantas que fornece a gomma *copal* applicada nas artes na confecção dos vernizes e em medicina na phytica pulmonar sobretudo a pituitosa. Em Minas dissolve-se a gomma *copal* em agua alcoolizada, e triturando-se com assucar, constitue-se uma emulsão de grande utilidade nas tosses chronicas.

Jauna. *Solanum jauna*. SOLANEAS. Pará.

Usos. Diuretica e anti escorbutica.

Jerataca. Veja-se *Manaca*.

Jerxelim. Veja-se *Gergelim*.

Jetahy. *Hymenoxa courbaril*. LEGUMINOSAS. Minas, Bahia e Pernambuco.

Usos. Fornece tambem a gomma *copal*. Esta e a *jatoba* são entre todas as *hymenoxas* as que fornecem melhor gomma. Da casca fazem os indigenas canoas, e com a resina se alumião.

Jetahy. *Hymenoxa martiana*. Hayne. Minas, Bahia e Pernambuco.

Jetahy. *Hymenoxa olfersiana*. Hayne. Minas, Bahia e Pernambuco.

Jetahy. *Hymenoxa stigonocarpa*. Martius. Piahy.

Jetahy. *Hymenoxa Sellowiana*. Martius. Piahy.

Jetahy. *Trachylobium martianum* Hayne. Rio Negro.

Jetai. Veja-se *Jetahy*.

Jetaiba. Veja-se Jetahy.

Jetaicica. Marcgrave. E' a resina fornecida pelas diversas especies de *hymenaras*, e conhecida no commercio com o nome indigeno de Copal. E' com esta resina que os indigenas vidrão a louça.

Jetai uva. Veja-se Jetahy.

Jetica. Veja-se *Batata doce*.

Jetivy. Vinho preparado com batata.

Jeticucu. *Convolvulus mechoacan.* Arruda. Pernambuco.
CONVOLVULACEAS.

Usos. Seu succo gommo resinoso é um drastico poderoso.

Jetuca. Veja-se *Batata doce*.

Jiquirioba. *Solanum jiquirioba.* SOLANEAS.

Usos. Um excellente remedio contra as anginas. Empregado pelo Dr. Silva na morphea. Acredita-se que é o *Aguaragua*.

Jiquitaia. E' a massa de pimentas pisadas e temperadas com sal e que os indigenas conservão para seu uso envolta em folhas de bananeira.

Jiquitiba. *Pyxidaria macrocarpa.* Schott.

Usos. A casca é empregada nas hemorragias, leucorrhéas e lymphatites.

A madeira é utilizada em artefactos.

Jiticucu. *Convolvulus hederacei.* Godoy. *Operculina turpethum.* Manso. CONVOLVULACEAS. Minas.

Usos. Raiz tuberosa applicada nos mesmos casos, e nas mesmas doses da *Batata de purga*. Julgo ser a *convolvulus mechoacan* de Arruda.

Jito. *Guarea purgans.* Saint-Hilaire. MELIACEAL.

Usos. Casca amarga, acre, adstringente, purgativa e anthelmintica. E' empregada em banhos nas arthrites chronicas. Em dose elevada o extracto promove o aborto purgando violentamente. Tambem se prepara clysteres mucilaginosos em que entra esta planta e que são utilizados nos casos de ascarides rectaes.

Joá. *Solanum paniculatum.* SOLANEAS.

Usos. Usado nas obstrucções do figado e no catarrho vesical.

Joá Amarello. *Solanum ambrosiacum.* SOLANEAS S. Cruz.

Usos. Os mesmos do Joá.

João Gomes. *Talinum.* PORTULACEAS.

Usos. Mucilaginoso e comestível.

Joapitanga. Planta rasteira estendendo-se em vergonteas e muito empregada em cosimento como sudorifica e anti venerea.

Joazeiro. *Zisypbus Joazeiro* Martius. *Rhamnaceas.*

Usos. O fructo é empregado como a *jubaba*. As cinzas do lenho desta arvore servem para confecção do sabão.

Jua-açu. Veja-se *Gingeira brava*.

Jua Mirim. *Celtis*.

Jua do Norte. Veja-se *Melancia da praia*.

Juapóca. Veja-se *Camapú*.

Jua do Sul. *Fructo do joazeiro*.

Jua-uva. Veja-se *Gingeira brava*.

Jubai. Veja-se *Tamarindeiro*. *Pison*

Jubeba. Veja-se *Juripeba*.

Juca. Pernambuco. *Páo Ferro*.

Jucapê. Veja-se *Sapê*.

Jumbaba. *Cactus opuntia brasiliensis*. Linneo. *CACTEAS.*

Usos. Calma as dores schiaticas, applicada em cataplasma. Esta, mixturada com extracto de saturno é util na Elephantiasis dos Arabes. O xarope dos fructos e folhas é empregado na phlyssica. Julga-se mui proveitoso na lepra; seu succo mixturado com leite é vantajoso nas ophthalmias simples. O fructo da *jumbaba* dá a côr vermelha á urina.

Junça. *Cyperus esculentus*. Linneo. *GRAMINEAS.* *Cyperaceas*

Usos. Suas raizes tuberculosas e feculentas servem de alimento em alguns paizes e passão por adoçantes tonicas ou dureticas.

Junco de cobra. *Hypopurum nutans*. Nces. *PYPERACEAS.*
S. Paulo.

Usos. A infusão feita com a raiz é diaphoretica e diuretica, segundo Martius.

Jupicai. Veja-se *jupiedi*.

Jupiedi. *Xiris indica*. Linneo. *RESTIACEAS.*

Usos. Seu succo é applicado para adoçar os dartros e outras molestias de pelle.

Suas folhas e a raiz servidas em olio e unidas ao cozimento do *Phaseolus Mungo*. (Linneo) são empregadas contra a elephantiasis dos Gregos.

Juqueria-assu. *Adenanthera thyrsosa*. *LEGUMINOSAS.* Pará.

Usos. Empregada nos corrimentos.

Juquiri. *Mimosa brasiliensis*. LEGUMINOSAS. Especie de Sensitiva.

Usos. Arbusto semelhante a esponjeira e de folhas miudas, nascendo junto aos rios e logares alagadiços. As folhas pisadas e fritas com azeite se empregão nas escrophulas. As folhas sómente pisadas applicadas sobre as hernias as resolvem.

Juquirionano. *Guillandina bouduc*. Leguminosas. Provincias maritimas.

Usos. As sementes (conhecidas na India por *Olhos de gato*) são empregadas como tónicas e febrifugas.

As cataplasmas feitas com as folhas frescas e contuzas, são usadas nas orchites. O cosimento da raiz é antidoto do veneno das cobras.

Jurema. *Acacia jurema*. Martius LEGUMINOSAS. Minas, Bahia e Pernambuco.

Usos. Os mesmos do *Angico*.

Jurema Marginada. *Mimosa Burgeni*. Aublet. LEGUMINOSAS.

Usos. A casca é acre e adstringente. Emprega-se o seu succo mixturado com a fuligem da chaminé para marcar roupa e tingir a madeira.

Jurieuara. Planta cujas folhas machucadas e postas sobre as ulceras malignas ou venereas são de grande proveito. Suas raizes seccas, contusas e infundidas no succo da *Juripeba* (solanum) e o licor de cocco curão a blenorragia. (Pison.)

Juripeba. *Solanum paniculatum*. Linneo. SOLANEAS. SOLANUM JUBEBA Velloso. SOLANUM INSIDIOSUM Martius.

Usos. O succo dos fructos da *Juripeba* e mesmo o das folhas é empregado como fondente nas obstruções do figado e no catarrho vesical. As folhas frescas são utilizadas nas feridas. Martins acredita mais no cozimento da raiz do que no succo dos fructos e folhas. A dóse é de meia oitava de raiz para uma libra d'agua.

Jurumbeba. Veja-se. *Jumbeba*.

Jutay. Veja-se Tamariadeiro.

Jutua-uba. *Guarea pendula*. Meliaceas

Usos. Purgativa.

K.

Kuaruba-uva. *Vochisia acida*. VOCHISLACEAS.

Usos. A casca dos ramos novos é acida e adstringente. A seiva branca torna-se escarlata em contacto do ar.

L.

Lagrimas de N. Senhora. *Coccus lacrima*. GRAMINEAS.
Usos. Excitante em banhos.

Lanceeta. *Solidago vulneraria*. Martius. COMPOSTAS. Rio Grande do Sul.

Usos. E' vulneraria.

Landy. Veja-se *Lantim*.

Lantana.

Genero da familia das VERBENACEAS apresentando no Brasil segundo Martius 7 especies :

Lantana Camará. Linneo.

» *aculeata*. Linneo.

» *involuta*. Linneo.

» *brasiliensis*. Link.

» *sellowiana*. Link.

» *pseudouhea*. Saint-Hilaire.

» *microphylla*. Martius.

Todas empregadas em banhos como aromaticas contra as dores rheumaticas ; e as folhas e flores em infusão nos catarrhos.

Lantim. *Calophyllum brasiliensis*. Camb. Saint-Hilaire. Martius. CLUSIACEAS. Manãos.

Usos. E' empregada a sua resina em emplastos abstergentes, e tira-se della muita vantagem nas molestias da raça cavallar.

Laranjeira. *Citrus aurantium*. Ris. AURANTIACEAS.

Usos. As folhas da *laranjeira* são estomachicas, antispasmodicas e diaphoreticas e sua infusão é muito empregada no uso domestico. Van Swieten a applicava na epilepsia. As flores são eminentemente antispasmodicas e calmantes. Ninguem ignora o uso da *agua de flor de laranjeira*. A raiz da laranjeira é febrifuga.

Ofructo—*laranja*—é apreciado geralmente de um uso commum nas mesas. A casca é estomachica, vermifuga, anti-febril, tonica e anticorbutica e contém um oleo aromatico excitante. O succo é acidulo, assucarado, refrigerante. A laranjada (succo da laranja puro ou com agua e assucar) é util nas febres biliosas e inflammatorias como desalterante.

Laranjeira do mato. *Evodia febrifuga*. Saint-Hilaire. RUTACEAS. S. Paulo e Rio de Janeiro.

Usos. A casca desta planta é um succedaneo da quina, da cascarrilha e da angustura; e emprega-se nas dyspepsias e nas febres intermittentes. E' conhecida tambem por *Laranjeira da terra*.

Laranjeira da terra. *Citrus vulgaris.* AURANTIACEAS.

Usos. A casca do fructo é empregada em doce. O succo forma uma bella laranjada adoçada com assucar e empregada nas affecções do coração e nas febres inflammatorias. As folhas são aconselhadas em infusão contra as indigestões e nevroses.

Ha 3 variedades, doce, aere doce, e acerba.

Laranjeira turanja. *Citrus decumana.* L. AURANTIACEAS.

Usos. O fructo é do tamanho da cabeça de um menino, casca espessa, o miolo branco ou vermelho; não é comestivel senão preparado em doce. O succo é refrigerante e acidulo.

Larangitas de Quito. *Solanum quitoense* Lamarek. SOLANEAS. Alto Amazonas.

Usos. Comestiveis.

Larangitas do sul. *Solanum nemurense,* DUB. SOLANEAS.

Usos. Comestiveis.

Lava pratos. Veja-se *Mamanga*.

Lechetrez. Veja-se *Maleiteira*.

Leecythis.

Genero da familia das myrtaceas e cujas espceies fornecem um oleo aphrodisiaco. Emprega-se em emulsão nos catarrhos.

Leitariga. Veja-se *Maleiteira*.

Leiteira. Veja-se *Maleiteira*.

Licopodio indigena. *Lycopodium cernuum.* FETOS. Rio de Janeiro.

Usos. Pó identido ao do *Licopodio europen*. Nas Antilhas onde existe este genero se o emprega como diuretico e nos tumores arthriticos em fomentação.

Ligadeira. Minas.

Usos. Goza de propriedades maravilhosas no curativo das feridas recentes.

Limeira de embigo. *Citrus limetta minor.* AURANTIACEAS.

Usos. E' um optimo refrigerante acidulo e assucarado. Fornece um oleo muito estimado pelos perfumistas e que se diz util contra a lenia na dose de 1 a 2 oitavas.

Limeira da Persia. *Citrus limetta major.* AURANTIACEAS.

Usos. Os mesmos da *Lima de embigo*. Os fructos são maiores, menos acidos, mais aquosos e almiscarados.

Limoeiro azedo. *Citrus limonum*. D. C. AURANTIACEAS.

Usos. As folhas e a casca do limoeiro são diaphoreticas, porém pouco empregadas em medicina; as folhas queimadas afugentão os mosquitos. O fructo —limão— é que gosa de muitas applicações. A casca contém um oleo essencial que lhe dá a propriedade diaphoretica; este oleo é muito procurado pelos perfumistas. Alguns praticos o aconselham contra a tenia na dose de 1 a 2 oitavas. O succo é refrigerante acidulo, antiseptico, vermifugo e adstringente. As anginas, gangrenas, dysenterias e hemorrhagias uterinas cedem quasi sempre ao seu emprego local ou geral. A *limonada* (limão, agua e assucar) é um desallerante impagavel nos paizes intertropicaes. Um limão cortado em talhadas e posto em infusão em uma garrafa de vinho branco até fermentar, e depois coado por expressão, é um optimo anti-febril dado todas as manhãs na dóse de 1 calix. As sementes do limão são acres, amargas, anthelminticas e alexipharmacas.

Limoeiro doce. *Citrus limonum edulis*. AURANTIACEAS.

Usos. Os fructos são acidulós, assucarados e refrigerantes, e muito apreciados nos tempos de calor e nas febres inflammatorias.

Limoeiro do mato. *Citrus medica efferata vel spinosissima*. AURANTIACEAS. Minas S. Paulo.

Usos. Os mesmos do limão azedo.

Lingua de boi. Veja-se Cipó de escada.

Lingua de tucano. *Eryngium lingua tucani*. Martius. OMBELLIFERAS.

Usos. Planta mucilaginosa ligeiramente amarga aconselhada como diuretica, e empregada tambem em cozimento nas ulceras da garganta.

Lingua de vacca. *Tusillago nutans*. Linneo. *T. vaccina*. Velloso. SYNANTHEREAS.

Usos. A raiz e a planta toda é muito amarga e empregada como tonica e desobstruente. Tira-se vantagem de seu cozimento nos catarros, e o succo applicado nos tumores lymphaticos e inflammatorios é um bom resolutivo. As folhas passadas pelo fogo e postas sobre a fonte alivião as dores de cabeça e trazem o somno.

Lirio. *Amoryllis*. AMARYLLIDEAS.

” *Anaryllis belladonna*.

” ” *reginae*.

Usos. Os bulbos são acres, drásticos e diureticos e em dose elevada venenosos.

Lirio roxo. *Morea nortiana*? *Morea spicata*. Ker. IRIDEAS.

Usos. Purgativo.

Lirio amarelo do campo. *Morea.* IRIDEAS. Goyaz
Mato Grosso, Minas.

Lobelobo. *Conohoria loboba.* S. Hilaire. BERBERIDEAS.

Usos. Suas folhas são comestíveis.

Loco. *Plumbago scandens.* Linneo. PLUMBAGINEAS.

Usos. Raiz acre e epispatica; applicada recentemente contundida na região mastoidea, cura as dores de ouvido. Internamente o succo desta planta na dose de um a dous escropulos é aperitivo e desobstruente. Em banhos é empregado nas dores venereas. Em clysteres provoca a catharze.

Loubrigueira. Pernambuco. Veja-se *Spigelia anthelmintica.*

Losna do Maranhão. *Artemisia ambrosiaca.* CORYMBIFERAS.

Usos. Excitante e tónico.

Luzetro. Veja-se *Maleiteira.*

M.

Matouia *Morisonia americana.* CAPPARIDEAS.

Usos. Os da *parreira brava.*

Macajera. Norte. Raiz de Aypim.

Macaxera. Veja-se Raiz de Aypim.

Macuen'. *Ilex macoucoua.* Ilicineas. Pará. Rio Negro.

Usos. O fructo dá uma bella cor negra com a qual os indigenas tingem o algodão. O lenho serve para archotes (Macé de fogo). Osucco que é cor de vinho é adstringente e assucarado.

Madre-Silva. *Alstroemeria pelegrina.* CAPRIFOLIACEAS.

Usos. Levemente aromatica.

Mafahu. Especie de *Cajueiro* do Norte.

Mainibu' Herva rasteira que nasce nas bordas do mar e gozando das propriedades da — CAROBA.

Maiorano. Veja-se *Algodão bravo.*

Malalenuca. *Malaleuca leucodenaron.* MYRTACEAS.

Usos. Adstringente.

Makambo. Veja-se *Melambo.*

Maleiteira. *Euphorbia papillosa.* Saint-Hilaire. EUPHORBIAEAS.

Usos. O succo leitoso das folhas dado na dose de 2 colheres de sopa mixturadas com mel é muito util nas dores osteocopas. A raiz é purgativa.

Malicia das mulheres. *Mimosapudica.* LEGUMINOSAS.

Usos. Um pugillo de folhas (4 onça) ou 1 oitava da raiz é um pur-

gativo. Em banhos é applicada nos tumores rheumaticos articulares. Alguns medicos a julgão util no croup. Segundo Serpa o suino na dôse de 1 chicara é um veneno violento, e cujo antidoto se acha na raiz. O Dr. Luiz Carlos a emprega interna ou externamente na elephantiasis dos Arabes. O emplastro feito com as folhas é anti scrophuloso.

Malva. *Malva rutundifolia.* MALVACEAS.

Usos. As folhas são emollientes, adoçantes, calmantes e mucilaginosas; as flores peitoraes.

Malva diuretica. *Pavonia diuretica.* Saint-Hilaire. MALVACEAS.

Usos. O cosimento adoçado com mel é muito empregado contra a dysuria. Suas folhas cozidas são utilizadas como emollientes.

Malva do campo. *Kielmeyera speciosa.* Saint-Hilaire STERCULIACEAS.

Usos. Emolliente em gargarejos e banhos.

Malvalisco. *Spæhralcea cisplatina.* Saint-Hilaire. MALVACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. E' empregado no Rio Grande do Sul como succedaneo da malva.

Mamangá. *Cassia medica.* Velloso. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do Fedegoso. Em alguns lugares applicão as folhas desta planta sobre as ulceras para cicatrizar-as, e das vagens se espreme um oleo que posto sobre os tumores appressa a suppuração.

Mamma de cachorra. *Eugenia forqosa.* Phillocalia formosum. MYRTACEAS. Minas.

Usos. Adstringente.

Mamoeiro. *Caryca papaya.* Linneo. PAPAYACEAS.

Usos. Os fructos verdes servem para doces e preparados culinarios; maduros tem uma substancia comestivel mui agradável. As sementes passion por anthelminticas. As folhas servem para tirar o sujo da roupa. Tambem se emprega o fructo em cataplasmas nas ulceras.

Mamono branco. Veja-se Carrapateiro.

Manaca' *Francisca uniflora.* Pohl. Martius. SCROPHULARINEAS. RUBIACEAS? Pará.

Usos. A raiz da manacá é um poderoso excitante do systema lymphatico. E' diaphoretica, diuretica, e empregada entre os indigenas como anti-syphilitica e entre os quaes é conhecida com o nome de *mercurio vegetal*. A casca e as partes herbaceas são nauseantes. Em pequena dôse é resolutiva, e em dose mais elevada vomitiva e cathartica. Provoca o aborto, e é util nas mordeduras de cohras. Em dôse grande é venenosa, e alguns indigenas extrahem desta planta um succo em que molhão as pontas de suas settas. Dose. 6 a 18 grãos do pó da raiz.

Mancinilha. *Hippomea mancinella.* Martius. *Mancinellavernala.*

Usos. Com o succo desta planta hervão os indigenas suas settas. Serve muito entre elles para o curativo dos cancrios. Lavão a ferida com agua fria, cobrem a circumferencia com urucú e barro e deitão algumas gotas do succo desta planta no centro da ferida ; esta fica negra e deslaca-se das partes sãs.

Mandacuru'. CACTUS. CACTEAS.

Fructo grande, oval, amarello e saboroso.

Mandapuça. Arvore cujo fructo pegado ao tronco tem o gosto adstringente e amargo. Especie de *jaboticabeira*.

Mandiba. } *Mandioca.*
Mandiiba. }

Mandioca. *Jatropha manihot.* EUPHORBIACEAS.

Usos. O succo da mandioca é venenoso porém o seu principio de-leterio é tão volatil que se desprende pela torrefacção. A raiz da mandioca privada desta propriedade perniciosa é um dos mais preciosos alimentos do Brasil. Mostrar sua utilidade e as diversas confeccões a que se presta seria ocioso. Conhecemos 35 especies.

Mandiocaba.

Mandioca doce que serve para o fabrico do caouin.

Mapieninga.

Arvore do mato virgem que dá um fructo semelhante em tudo á pimenta de cheiro.

Mandobi. *Glycina subterranea.* *Arachys hypogea.* LEGUMINOSAS.

Usos. Os tuberculos subterraneos são comestiveis, quer torrados ou cosidos. São tambem excessivamente aphrodisiacos.

Mandobi-guaçu. Veja-se *Pinhão de purga*.

Mandupitiu. Veja-se *Jarere*.

Mangabeira. *Hancornia speciosa.* Gomes. APOCYNES. Pernambuco.

Usos. Seus fructos, — bagas — amarellos com manchas vermelhas, são refrescantes, acidulos e gommosos. Comem-se crus ou preparados em doce.

De toda a planta e mesmo do fructo distilla um succo leitoso e pegajoso que póde substituir a *Borracha*.

Mangabeira brava. *Hancornia pubescens.* Martius. APOCYNES. Pernambuco, Bahia.

Usos. O extracto da casca é lactescente e amargo, e empregado em pequena dose nas obstrucções do figado, na ictericia, e nas molestias cu-

laneas chronicas. O leite desta arvore tem o prestimo do da gomma elastica.

Ha ainda uma outra especie :
Habsburgia comans. Martius.

Mangaiba. Veja-se *Mangabcira*.

Mangara'-mirim. Veja-se *Mangarito*.

Mangara'-peuma. Veja-se Mangaraz. Desfont. *Caladium violaceum*.

Mangarataia. Veja-se Gengibre.

Mangaraz. *Caladium poecile*. Schott. ARACEAS. AROIDEAS?
Usos. Seus tuberculos radicaes são alimentares.

Mangarito. *Caladium sagittifolium* Vent. ARACEAS. AROIDEAS?
Usos. Os mesmos do *Cará*, e do *Mangaraz*.

Mangavi. Veja-se *Cumandatiá*.

Mangerona do campo. *Glechon spathulatus*. Benth. LABIADAS. Rio Grande do Sul.

Usos. A infusão desta planta é anti-catarrhal e diuretica.

Mangue amarello. *Avicenia nitida*. Linneo. MYRTACEAS.

Usos. A casca e folha servem para curtir couros. Adstringente.

Mangue branco. *Laguncularia racemosa*. Gaertn. COMBRETACEAS.

Usos. Os mesmos dos mangues.

Mangue preto. Veja-se *Mangue vermelho*.

Mangue verdadeiro. Veja-se *Mangue vermelho*.

Mangue do brejo. *Eugenia nitida*. MYRTACEAS. Ytaguay.
Usos. Adstringente.

Mangue da praia. *Scævola-plumerii*. Cabo Frio.

Usos. Os mesmos das outras especies de mangues ; e fornece uma tinta preta boa para a tinturaria.

Mangue vermelho. *Rhisophora mangle*. Linneo. RHISOPHOREAS.

Usos. Os mesmos de todos os mangues. Na dose de uma oitava pode ser dado como anti-febril. O pó é util nas picadas dos insectos e dos peixes.

Mangueira. *Mangifera indica*. Linneo. ANACARDIACEAS-TEREBENTHINACEAS?

Usos. A casca e raiz são aromaticas e podem ser utilizadas nas gonorrheas e diarrheas. O fructo (manga) é acidulo saccarino e algum tanto resinoso para o pedunculo, e desprende quando maduro um aroma delicioso; é antiscorbutico. A amendoa é amarga e anthelmintica. O succo resinoso que se extrahê da manga é epispatico. As folhas são antidontalgicas.

Mani. Resina do *Onanî*.

Manicoba. *Jatropha*. EUPHORBIACEAS.

Usos. Fornece borracha.

Manimbu. Especie de Junça que nasce nos logares alagadiços da Parahiba.

Manipueira. Veneno extrahido da Mandioca.

Maniqueira. Bebida doce e substancial feita do succo da mandioca, cozido com arroz e milho e a qual se costuma juntar um pouco de aypim.

Manissoba. Comida feita das folhas da *Maniba* pisadas e cozidas juntamente com a carne ou peixe e temperada com sal e pimenta.

Maniva. Veja-se Mandioca.

Mantimento de araponga. *Eugenia adstringens*. MYRTINEAS

Usos. Adstringente.

Mapareyba. Veja-se *Mangue vermelho*.

Mapiehi. *Myrcia lanceolata*. MYRTACEAS.

Usos. Excitante e de aroma terebenthinaceo.

Mappam. *Hyppomane brasiliensis*. EUPHORBIACEAS.

Usos. Segundo Emilio Germon os indigenas curão o cancro cercando-o com massa de urucú e derramando em cima da chaga o succo do Mappam, o qual coagula-se e faz o doente transpirar e urinar notavelmente. Quando a escara cahe, a ferida está cicatrizada. E' preciso ter cuidado que o succo do *Mappam* só esteja em contacto com o tecido desorganizado, pois no caso contrario dar-se-hia a absorpção, e a morte do doente teria logar visto a propriedade venenosa de que goza esta especie de — Mancenilha. E' tambem util nas bobas secca.

Maracuja'. *Passiflora maliformis*. Linneo. PASSIFLOREAS.

Usos. O fructo é acidulo adocicado e refrigerante; externamente as folhas do maracujá são applicadas nas affecções de pelle. O cosimento da casca do fructo é antiophthalmico, e o de toda a planta tem a acção da salsa parrilha.

Maracujá-mirim. As folhas são desobstruentes, diureticas em cosimento e fomentações. Contuzas são applicadas topicamente nos tumores hemorrhoidarios. Do fructo se faz doce.

Maracujá de estrada. *Passiflora fatida*. Linneo. PASSIFLOREAS.

Usos. Empregado em banhos e cataplasmas nas erysipelas e inflammções cutaneas.

Ha ainda as especies.

Passiflora hircina.

» *hibiscifolia.*

Maracujá mamão. *Passiflora alata*. *P. quadrangularis*. Vellozo. PASSIFLOREAS.

Usos. Os mesmos do *maracujá*.

Maracuja' suspiro. *Passiflora edulis*. PASSIFLOREAS.

Usos. Os do MARACUJÁ.

Existem ainda. *Passiflora incarnata*.

» *sururuca.*

Maranacaba. Veja-se. Yatay.

Marapinima. E' uma arvore das florestas do Brasil quasi preta e de cujo amago se fazem obras que fingem tartaruga.

Marapuama. Rheumatismo quer em banhos, quer em infusão na dose 1 oitava para 1 libra d'agua. Debilidade, dyspepsia.

Maravilha. *Mirabilis dichotoma*. Linneo. NYCTAGINEAS.

Usos. A raiz é drastica, e empregada na leucorrhœa, hydropesias e affecções herpeticas. As folhas quentes e untadas de oleo são maturativas.

Marfim vegetal. *Phytolcphas macrocarpa*. PANDANEAS. Ruiz e Pavon. Palmeiras?

Usos. Esta palmeira que habita os limites brasileiros Peruanos dá um coco cujo albumen uma vez endurecido tem a brancura, a dureza e o polimento do marfim, e com elle torneado se fazem bocetas, caxinhas e diversos artefactos.

Mari. Veja-se *Umarí*.

Mari-mari. *Cathartocarpus brasilianus*. Personne. LEGUMINOSAS. Bahia. Joazeiro.

Usos. Seu fructo que encerra uma polpa igual a do tamarindo é ligeiramente purgativo.

Maria Gomes. Veja-se João Gomes.

Mariana. *Acnotinus cauliflories*. SOLANEAS.

Usos. Pode ser succedanea da saponaria tanto no dominio medico como no industrial.

Marianinha. *Cosmelina deficiens.* COMMELINEAS. Bahia.
Maranhão.

Usos. Os da Trapoeraba.

Marianinha de folha larga. Veja-se *Marinheiro de folha larga.*

Maria preta. *Conoclinium prasiifolium.* DC. COMPOS-
TAS. Bahia.

Usos. E' aromatica e empregada como excitante.

Maria preta. Com este nome é conhecida em alguns logares
a *Barauna.*

Marinheiro. Veja-se Jito.

Marinheiro de folha larga. *Guarea spicaeflora.* S. Hilaire.
MELIACEAS.

Usos. A casca e principalmente a raiz é adstringente e amargosa e actua especialmente sobre o systema lymphatico. E' empregada nas hydropesias, e indurações das vicerias abdominaes. Deve-se usar della com cautela.

Marinheiro de folha miuda. *Moschoxylon catharticum.* Mar-
tius. MELIACEAS. Minas, Bahia e Pernambuco.

Usos. O cosimento feito da casca desta planta é dado em clysteres nas febres terçaãs. $\frac{1}{2}$ onça da raiz recente.

Maririco'. *Sisyrichium galaxioides.* Gomes. IRIDEAS.

Usos. Sua raiz doce, inodora e reduzida á fecula é um brando laxativo muitas vezes empregado e util nas molestias dartrosas. Em clysteres é mui empregado nas creanças e nos adultos como anti-hemorroidario.

Marmelleiro. *Pinus cydonea.* Linneo POMACEAS.

Usos. Os fructos são doces ligeiramente acidos e adstringentes. Assados com assucar em seu interior são peitoraes. Todos conhecem a *marmellada* doce conveniente aos convalescentes. As sementes do marmello são mucilaginosas e de uma applicação medica quasi quotidiana.

Marmeleiro do campo. *Maprounea brasiliensis.* S. Hilaire.
EUPHORBIACEAS. Minas e Bahia.

Usos. A esta planta falta o succo acre que forma o caracter das Euphorbiaceas. E' empregado nos males de estomago.

Marroio do Brasil. *Marrubium americanum.* LABIADAS.

Usos. E' empregado como aromatico e desobstruente.

Marubá. *Simaruba officinalis*. RUTACEAS. Pará e Rio Negro.
Usos. E' fortemente amarga, e empregada como tónica e anti-febril. E' aconselhada tambem nas dysentherias e leucorrhæas.

Maruorana. Veja-se *Algodoeiro bravo*.

Massambará. *Trachypogon avenaceus*. Martius. GRAMINEAS.

Usos. Diuretico.

Massarandiba. *Eugenia*. Pison. MYRTACEAS.

Usos. O fructo é assucarado e agradável, e o succo da árvore se bebe como adoçante da garganta e do peito.

Massaranduba. *Achras paraensis*. *Massaranduba emarginata*. Lacerda. SAPOTACEAS. Lugares secos e arenosos. Pará.

Usos. Fornece um succo leitoso succedâneo da bórachia e antiphysico.

Applica-se o leite só ou mixturado. Os fructos são calmantes da tosse, e os emplastros feitos com a seiva leitosa são antiarthriticos.

Mastruco. *Seneciera pinnatifida*. D. C. *Lepidium americanum*. Veloso. CRUCIFERAS.

Usos. Excitante, antiscorbutico e antihemoptico. 2 a 4 onças.

Mata canna. Veja-se *Caa Ataya*.

Matafome. Especie de *Mandioca*. Tem a raíz quasi toda fóra da terra, e o talo roxo.

Mata-Mata. *Lecythis idalimon*. MYRTACEAS.

Usos. A casca é empregada contra a Phýsica pulmonar.

Matapao. *Clusia insignis*. Guttíferas. Cipó matador das arvores.

Usos. O succo lacteo resinoso entra na confecção de muitos unguentos.

Matapasto. Veja-se *Fedegoço*.

Mate. *Ilex paraguariensis*. Lambert. ILICINEAS. S. Paulo Minas e Sul da America.

Usos. E' de um uso ordinário a infusão das folhas ou do pó do mate. E' muito conhecido o saboroso *chimarrão* do Sul tomado no cabacinho e por meio de uma bombinha. O mate é sudorifico e diuretico.

Ha ainda as variedades.

Ilex acutifolia. Martius.

» *obtusifolia*. »

Mate bravo. Herva cauna.

Mate-me embora. E' uma Graminea empregada no Norte.

Maturá. Cajá, ainda muito verde ou antes á castanha com o pedunculo rudimentario.

Maturim. E' o *Maturim* no Ceará

Mayaca'. *Nyris americana*. XIRIDACEAS. Fronteiras da Guayana.

Usos. Esta planta infundida em vinagre ou óleo passa por bom remédio contra certas affecções da pelle.

Mecru. *Canna aurantiaca*: MARANTACEAS.

Usos. Obra como diuretico. A planta fresca contusa serve para banhos anti-rheumaticos, e contra as ulceras. O pó da raiz secca é um dentifricio. O succo da planta é bom contra o mercurialismo, e o do fructo meio maduro é util nas otites.

Medicineiro. *Jatropha officinalis*. EUPHORBIACEAS.

Usos. Mui gabado nas affecções syphiliticas.

Meimendro negro. *Hyosciamus niger*. Linneo. SOLANÉAS. S. Paulo, Santa Catharina e Rio Grande do Sul.

Usos. Seu cheiro é viroso e desagradavel. Suas folhas. são narcoticas, e aconselhadas nas affecções do systema nervoso. Se administra em fumigações em pó, em succo, em infusão, em extracto, em óleo, em tintura etc.

Ha ainda o Meimendro branco. *Hyosciamus albus*. Linneo. Tem as mesmas propriedades.

Melambó. *Drymis Winteri*. Martius. MAGNOLIACEAS.

Usos. A casca do Melambó é aconselhada contra as febres. E' de muita utilidade nas dysenterias, fraqueza intestinal e no trismo dos pretos. Audouard aconselha-a na febre amarella. E' contra indicado quando ha irritação franca. A dóse é de 4 a 5 oitavas em infusão.

Melancia. *Curcubita citrullus*. Linneo. CUCURBITACEAS.

Usos. O fructo que é ás vezes de grandêsa enorme tem uma substancia tão deliquescente que se desfaz na bocca. E' refrigerante e propria para acalmar o calor dos habitantes das regiões tropicaes.

Melancia da praia. *Solanum agrarium*. SOLANÉAS.

Usos. Os mesmos dos Juás.

Melão. *Cucumis melo* Linneo. CUCURBITACEAS.

Usos. O fructo é de um gosto e aroma agradaveis; elle é tido como refrigerante e calmante. Se algumas vezes se torna indigesto é isso devido ou a má qualidade do melão ou a uma idiosincrazia do individuo.

Melão de caboclo. Veja-se. Crua.

Melão de S. Caetano. Veja-se *Herva de S. Caetano*.

Mentasto. *Ageratum conyzoides*. Linneo. COMPOSITAS.

Usos. Amarga resinosa e mucilaginosa da-se como tónica nas diarrheas, e nas colicas ventosas.

Mentrueto. Veja-se Mastruço.

Mereurio do campo. Veja-se. *Galinha choca.*

Mereurio vegetal. Veja-se. *Manacá.*

Mercurio vegetal do Para'. Raiz do Manacá considerada como antisyphilitica.

Merua. *Spermaeoce longifolia.* Lacerda. RUBIACEAS. Pará.
Usos. Nas hemorrhoides em clysteres.

Merurana. *Phrettebum suaveolens.* Vitiferas? Pará.
Usos. Empregado nas febres.

Mil homens. *Aristolochia cymbifera.* Martius. *A. grandiflora.* Gomes. ARISTOLOCHÉAS.

Usos. Esta trepadeira de gosto amargo e camphorado é empregada contra a mordedura de cobras, e como antiseptica na gangrena e nas febres graves.

O pó da raiz é util nas ulceras atonicas, e internamente da-se na doze de 1 escropulo, e em infusão na doze de 1 oitava.

Mil em rama. *Achillea millefolia.* SYNANTHEREAS.
Usos. Sua raiz é estomachica febrifuga e anti-odontalgica.

Milho. *Zea mais.* Linneo. GRAMINEAS.
Usos. Sementes quentes e algum tanto nutritivas. Quebradas constitue a *cangica*.

Miraceen. *Solanum.* SOLANEAS.
Usos. A casca é doce e mucilaginosa.

Miuva. Veja-se *Aninga pari.*

Mocolim caba. *Hysmenia glauca* EUPHORBIACEAS.
Usos. Adstringente.

Mocororó. Veja-sc. *Aloá de arroz.* Maranhão.

Mocororó. Ccará. *Sueco de cajú fermentado.*

Mocury. *Usos.* Excellente madeira, e dá um fructo saboroso e aromatico e com a fórma de um pecego amarellado.

Mohica. Veja-se. *Buranhem.*

Moringa. *Guilandia moringa.* APOCYNÉAS.
Usos. É empregada em medicina, mas não sabemos em que casos.

Mororó. Veja-sc. *Cipó de esçada.*

Mororó. Em muitos logares se dá este nome a planta. — *Unha de boi.*

Morototó. *Panax cornulata.* POLIGALEAS.

Usos. Expectorante e diuretico.

Moscadeira. *Myristica officinalis.* MYRISTICÉAS.

Usos. Aromática.

Mozés. Arvore de mediana altura e pouca grossura. Sua folha gem é semelhante a do feto e sua flôr branca em fôrma de pincel.

Usos. Suas cinzas sãs boas para lexivia.

Mucuna. *Dolichos pruriens.* Humboldt. LEGUMINOSAS. Pó de mico. Veja-se olhos de burro.

Mucura. *Petiveria alhiacea.*

Mucutaia. *Laurus mucutaia.* LAURINEAS. Pará. Rio Negro.

Usos. Aromatico e excitante.

Mucuyba. Arvore alta de copa pequena semelhante a de um chapeo de sol, e que produz uma especie de azeitona de casca delgada contendo uma amendoa oval, de que se extrahê um oleo empregado pelos indigenas em muitas molestias.

Mulungu. E' a *Erythrina* na Bahia.

Munupin. *Sapium.* Euphorbiáceas.

Usos. Mixturada com pedra lipes é um bom remedio para os cravos de bobas.

Mureci. *Byrsonima verbascifolia.* *Bunchosia.* Manso. DC. MALPIGHEACEAS. Pará. Maranhão.

Usos. Os fructos são acidulos e comestiveis simples ou mixturados com assucar. As flores são lindissimas e a madeira é optima para construcção. O sarcocarpo faz purgar.

Mureci guassu. Veja-se. Mureci.

Mureci-penima. *Byrsonima chrysophylla.* Kunth. MALPIGHEACEAS.

Usos. Os mesmos do Mureci.

Murta do Para. *Eugenia lucida.* MYRTACEAS.

Usos. Adstringente,

Murtinhos. *Eugenia ovalatifolia.* MYRTACEAS.

Usos. Adstringente.

Mururé. *Bichetea officinalis.* URTICACEAS. Pará.

Usos. Antisymphilitico.

Musgo. *Lichen prolifer.* Linneo. LICHNEAS.

Usos. Nutriente e peitoral.

Mutamba. *Guasuma ulmifolia.* Linneo. BUTHNERIACEAS.

Usos. Os fructos gelatinosos e assucarados podem servir de alimento aos animaes. O cozimento é julgado emolliente. A casca é considerada em Pernambuco como desobstruente (Sarpa). Tambem se póde extrair desta planta uma especie degomma alcatira.

Mutamba preta. *Luhea speciosa.* Tiliaceas. Pará. Maranhão.

Usos. Mucilaginoza e odorifera.

Myrobolana. Veja-se Imbuseiro, Martius.

Myrabolano. Veja-se Acaya.

N.

Nhambu'. Herva rasteira da Bahia ; dá um botão amarello, e é usada contra as dores de dentes.

Namoym. Arvore chamada pelos indigenas *louro*, nascendo nas varzeas, e alagadiços do Pará, e cujos fructos se comem cosidos.

Nanavy. Vinho preparado com ananaz.

Nancibeia. *Manettia cordifolia.* Martius. RUBIACEAS.

Usos. Empregada na dose de ¼ oitava de raiz pulverisada nas hydropesias e na dysenteria.

Nani. Resina fornecida pelo *Oanini*.

Nha. Veja-se *Castanheiro do Maranhão*.

Nhambi. *Anthemis* ? COMPOSTAS.

Usos. Empregada pelos indigenas contra os calculos, os venenos, as obstrucções e as flatuosidades. E' aromatica e serve de condimento nas salladas.

Nhambu-gnaçu. Piron. Veja-se *Ricino*.

Nhandi. Veja-se *Pimenta dos Indios*.

Nhandiroba. *Feuillea Trilobata.* Linneo. *F. cordifolia.* Velloso. F. HEDERACEA. Poirson. NHANDIROBACEAS. Martius. CUCURBITACEAS ?

Usos. O fructo desta trepadeira dá uma especie de boceta que se abre circularmente e contem dentro 8 a 10 sementes chatas e largas conhecidas pelo nome de *Nozes de serpente*. Extrahe-se destas sementes um oleo amarellado bom para illuminação, porem que por amargoso não serve para alimento.

A Nhandiroba purga docemente; em pequena dose é empregada contra as mordeduras das cêbras, e tem a propriedade de fazer vomitar aos animaes. Julga-se ser efficacissima nos casos de envenenamentos pela mandioca, noz vomica e cicuta. Basta para se obter esse resultado socal-a com um pouco d'agua e bebel-a.

As semente são febrifugas.

Nhandu'. Veja-se *Pimenta dos Indíos*.

Nia. Veja-se *Castanheiro do Maranhão*.

Niambi. Veja-se *Pimenta da Índia*.

Noz da India. *Aleurites moluccana*. Wild. EUPHORBACEAS.

Usos. Esta arvore cultivada no Pará dá uma nóz cuja amendoa é saborosa e passa por aphrodisiaca. Ella para ser comestivel é preciso ser assada, senão actua como purgante, produzindo colicas. Extrahe-se tambem um oleo para illuminação.

Noz moscada do Brasil. *Cryptocaria moschata*. Martius. LAURINEAS. Minas, Porto Seguro e Bahia.

Usos. O fructo é de um aroma activo e empregado como carminativo, e nos mesmos casos do *Pichurim*.

Noz vomica do Brasil. *Strychnos gujanensis*. LOGANEACEAS.

Usos. A casca do fructo fornece uma especie de strychnina com que os indigenas do Amazonas envenenão suas settas. É um veneno narcotico acre.

Ha ainda as especies seguintes :

Strychnos toxifera.

Strychnos brasiliensis. M. Narda spinosa Velloso.

Strychnos trinervis. GARDENIA TRINERVIS. Velloso.

O.

Oajuru'. Veja-se *Goajurú*.

Oanani. *Moronobea coccinea*. Aubl. CLUSIACEAS. Pará e Rio Negro.

Usos. A resina fornecida por esta arvore entra na confecção de muitos emplastros vulnerarios.

Obaja-miri. Veja-se *ANDIRA ROSEA*.

Oca. *Oxalis tuberosa*. *OXALIDEAS*.

Usos. Adstringente acidulo.

Ocotea amargosa. *Ocotea amara*. Martius. *LAURINEAS*.
Planta que cresce nas margens do rio Yapura.

Usos. A casca amarga e aromática é empregada como estomachica.

Ocotea aromática. *Ocotea opifera*. Martius. *LAURINEAS*.
Rio Negro.

As sementes contem um óleo essencial que pode substituir mui bem o de limão.

Ocuba.

Cera extrahida de um vegetal abundante nas bordas do Amazonas e ainda não classificado. O fructo é do tamanho de uma balla de espingarda, e o envoltorio tingido de vermelho purpura. A noz é preta, e fazendo-se ferver a sua polpa a cera nada sobre o liquido. Depurada a cera toma a cor branca brilhante, e feita em velas dá uma luz mui viva. 16 libras de nozes dão 3 libras de cera.

Oera-repoty. Veja-se *Herba de passarinho*.

Oitchi. *Myrcia oitchi*. *MYRCINEAS*.

Usos. Os fructos são comestiveis.

Oiti. *Moquilea grandiflora*. Martius. *Pleragina rufa*. Arruda. *CHRYSOBALANEAS*. Pernambuco.

Usos. O fructo gommoso, assucarado e de um aroma e sabor agradaveis, é vendido na praça do mercado em Pernambuco. O caroço pulverisado e tomado em bebida ou clyster é um bom anti-diarrheico.

Oiti-cica. *Pleragina umbrosissima*. Arruda. *CHRYSOBALANEAS*. Sertões de Pernambuco.

Usos. Fructo assucarado, gommoso de aroma e sabor agradaveis.

Oiti-coroia. Veja-se *Oiti*.

Oiti-da-praia. *Pleragina odorata*. Arruda. *CHRYSOBALANEAS*. Pernambuco.

Usos. O fructo é gommoso assucarado e de aroma e gosto agradaveis.

Oitituruba.

Dá um fructo do tamanho de uma laranja, e cujo caroço preto por um lado reflecte a luz como espelho.

Olandim.

Usos. Dá mastros duraveis.

Óleo de palma. Veja-se *Azeite de dendê*.

Olhos de burro. *Dolichos mucunã.* LEGUMINOSAS.

Usos. Este cipó dá uma vagem coberta com um pello que tocando o corpo produz uma comichão extraordinaria.

Olhos de gato. *Nephelium litchi.* *N. Lungunum.* SAPINDACEAS.

Usos. Os fructos são refrigerantes.

Ombu'. Não classificada.

Arvore espessa, baixa, dando um fructo amarellado semelhante a ameixa. A raiz desta planta é assucarada e refrescante, e empregada nas febres inflammatorias.

Onnianga Pixericia. *Melastoma.* MELASTOMACEAS.

Usos. Das bagas desta planta se faz por meio da fermentação, mais ou menos elevada, vinho ou vinagre.

Ora pro nobis. *Cactus pereskia.* CACTEAS.

Usos. Emolliente e comestivel.

Orelana Veja-se *Urucú.*

Orelha de gato. *Hypericum conatum.* Lamarck. HYPERICINEAS. S. Paulo e Rio Grande do Sul.

Usos. As folhas, cujo cheiro é desagradavel, são empregadas em cozimento como gargarejos nas esquinencias.

Orelha de onça. *Cissampelos ovatifolia.* Saint-Hilaire. MENISPERMEAS.

Usos. E' adstringente e empregado com successo nas febres intermittentes e mordeduras de cobras e contra os vermes intestinaes, Dá-se em infusão a raiz. A folha desta planta é côr de perola e tão flexivel tanto verde como secca que enrola-se e desenrola-se sem quebrar as nervuras.

Orelha de pa'ô. Veja-se *Urupé.*

Orelha de rato. Veja-se *Caa-ataya.*

Orelia. *Allamanda aubleii.* APOCYNCEAS.

Usos. Purgativo drastico aconselhado nas colicas dos pintores.

Ha tambem outra especie :

Allamanda schottii.

Orgibão. Veja-se *Gervão.*

Orsellia. *Rocella tinctoria.* Martius. LICHNEAS.

Usos. Adoçante peitoral e fornece uma côr de azinhavre propria á tincturaria.

Temos ainda um genero mais :

Lecanora tinctoria.

Ortelã. *Marsypianthes hyptoides*. LABIADAS.

Usos. Aromatica e empregada em banhos no rheumatismo.

Ortelã do mato. *Peltodon radicans*. Benth. LABIADAS.

Usos. E' balsamica, carminativa e diuretica.

Ortiga. *Urtica urens*. Linneo. URTICACEAS.

Usos. Rubefaciente applicada a pelle e empregada nas hemoptesis hemorrhagias, leueorrhéas e eserophulas internamente ; e nas apoplexias lethargias, rheumatismos chronicos, paralsias e repereursões de exanthemas, externamente. A raiz cosida em vinho e dada na dose de 2 a 3 colheres por dia é mui util nos eatarrhos pulmonares. O sumo tambem é applicado nas uvulites. Dá-se em infusão na proporção de 1½ a 1 oitava para 2 lbs. de agua. Sueco na dose de 1 a 2 ouças.

Ha mais as seguintes especies :

Ortiga vivaz *Urtica dioica*.

» romana. *Urtica pelulifera*.

» branca *Lamium album*.

A primeira, segunda e quarta especie são aclimatadas.

P.

Pacapehua. *Semacopherum*.

Usos. Casea adstringente, eheiro de acido formico.

Pacarl. *Lafencia pacari*. Saint-Hilaire. SALICAREAS.

Usos. A madeira ó propria para tinturaria pois que fornece uma bella côr amarella. A raiz é tonica e antifebril.

Paconyre. Veja-se *Bananeira*.

Pacoba. Veja-se *Banana*.

Pacobeira. Veja-se *Bananeira*.

Pacobussu. Veja-se *Bananeira de S. Thomé*.

Pacocaatinga. E' nm nome que tem sido dado a diversas especies de plantas, nascendo da qui uma confusão extraordinaria. Assim. segundo Aublet, Pacocaatinga é o *Costus arabicus* de Linneo, segundo Lamarek é o *Amomum hirsutum* segundo Roseoé e o *Costus spiralis* &.

Paco caatinga. *Amomum hirsutum*. Lamarek. AMOMACEAS.

Usos. Masca-se esta planta no easo de gonorrhéa. Seu cozimento é empregado nos mesmos easos. E' avelludada e tem o eheiro de violetas. E' a *Canna do brejo* ou alguma outra especie.

Pacorá. *Alpinia nutans*. Roscoe. *A. humilis*. AMOMACEAS.
Velloso.

Usos. Raiz aromática, carminativa, estomachica e alexipharmaca na dose de 10 a 20 grãos. Suas sementes tem as propriedades do *Cardamomo da Índia*.

Pacory. Veja-se *Bacuri*.

Paco seroca. *Alpinia pacoseroca*. Jacq. *Alpinia racemosa*.
Velloso. AMOMACEAS.

Usos. Os mesmos do *Caité*.

Pacová. Especie de pimenta comprida e amarella.

Paineira. *Bombax*. MALVACEAS.

Usos. Fornece a paina.

Paineira do campo. *Pachira marginata*. *Carolina insignis*.
STERCULIACEAS.

Pajomarioba. *Cassia purpurina*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. Esta planta em alguns lugares é tomada por *Fedegoso*. O succo recente dado em clysteres é anthelmintico. O succo com leite e alvaiade é antiophthalmico. As sementes trituradas com vinagre são antidiartrosas. O cozimento assucarado é empregado contra a ischuria.

Existe ainda a especie :

Cassia falcata. Linneo.

Pajura

Arvore que nasce pelos lugares humidos do Pará, e cujos fructos são comestiveis. Suas sementes seccas e raladas são empregadas nas dysenterias.

Palmatoria. *Cactus tunei*. *Articula prolifera*. Linneo.
CACTEAS. Jacuípe. Tapicurú.

Usos. Os fructos são comestiveis.

Panacéa. Veja-se *Velame*.

Panduarana.

Planta empregada no Pará em clysteres nas hemorrhoides e dysenterias.

Acreditamos ser a *Canna indica*.

Pão de açacia. Veja-se *Atareno*.

Pão d'alho. *Crataeva tapia*. CAPARIDEAS.

Usos. As folhas contusas são maturativas e anti-hemorrhoidaes.

Pão d'arco. *Bignonia pentaphylla*. Linneo. BIGNONIA-
CEAS.

Usos. Passa por febrifugo e é boa madeira. A casca é empregada contra as ulceras. Também é util nas molestias venercas e rheumaticas.

Páo d'azeite. Veja-se *Lantim*.

Páo balla. *Trichilia guará.* Aublet. MELIACEAS, Pará.

Usos. O succo leitoso desta planta é um violento purgativo e vomitivo. O cozimento da casca é menos forte. Refere o povo que a *Jatropha multifida* de Linneo é o antidoto dos envenenamentos causados pelo succo desta planta.

Páo balsamo.

Arvore indeterminada, e que dá um balsamo semelhante ao do Perú. Martius julga que este balsamo é a *Cabureicica* de Pison e acredita que provem de uma arvore mui celebre entre os guaranis chamada *Anguai*.

Páo Brasil. *Cesalpina echinata.* LEGUMINOSAS.

Usos. Bella madeira e riquissima cor rubra fornece esta tão importante arvore. Uma porção de cal, de caparrosa ou de cinzas posta na decocção do Páo Brasil produz uma tinta preta mui util nas artes.

Páo Cardozo. Mucilaginoso emollicnte e succedaneo da althea.

Páo Carne. A raiz e sobretudo a casca é reconhecida como purgante e antivenereo.

Páo Cobra. *Quassia ophiorhiza.* RUTACEAS.

Usos. Raiz tonica, amarga, mucilagínosa é empregada nas febres, e diarrheas chronicas.

Páo de colher. *Tabernaemontana echinata.* Velloso.

APOCYNEAS.

Usos. A planta é lactescente e as folhas odoríferas. Acredita-se anti herniario e anti febril, porem deve haver cuidado visto pertencer ella a uma familia suspeita.

Páo Cravo. *Dicypellium caryophyllatum.* Nees. LAURINEAS.

Usos. A casca aromatica e enrolada em tubos se vende no commercio Europeo em muita escala visto o sabor aromatico e identico ao cravo da India.

Páo Ferro. *Bocoa proveansis.* LEGUMINOSAS.

Usos. Adstringente.

Ha muitas plantas com este nome porem o verdadeiro é a Ibirateca.

Páo Forquilha. Veja-se *Páo Pereira*.

Páo Homem. Veja-se *MARAPUAMA*.

Páo Lacre. Veja-se *Caaopía*.

Páo de Lagoa. Veja-se *Tabua*.

Páo de Maria. Veja-se *Lantim*.

Páo Molle. Veja-se *Guabipocacaiba*.

Pão de Novato. *Tripteris americana*. POLYONEAS.

Usos. A casca é adstringente. Nesta arvore se acoutão formigas cujas ferroadas são mui dolorosas.

Pão de Oleo. Veja-se *Cabureiba*.

Pão Papel. *Lasiandra papyrifera*. S. Hilaire. MELASTOMACEAS. Minas, Goyaz.

Usos. Esta planta fornece laminas não delgadas e claras que parecem folhas de papel.

Pão Pente. Veja-se *Pão Pereira*.

Pão Pereira. *Geissospermum*. Velloso. Freire Allemão. APOCYNACEAS.

Usos. E' um poderoso anti febril succedaneo da quina e empregado nos mesmos casos.

Da casca extrahe-se um principio amargo, *Pereirina*, que substitue o quinino.

Pão Pereira do Rio de Janeiro. *Picrania ciliata*. Martius. CASSUVIACEAS.

Usos. Os mesmos do *Geissospermum*.

Pão Pobre. E' uma. EUPHORBIACEA. Minas.

Seus fructos que se assemelham aos do carrapateiro (Mamono) são purgativos e suas amendoas dão um oleo que serve para luz e para confecção do sabão.

Pão de Porco. *Bursera gummifera*. Linneo. TEREBENTHINACEAS.

Usos. E' nesta arvore que os javalis feridos se encostão para untarem suas feridas com a resina que d'esta arvore transuda e que é tida por vulneraria. E' com esta resina que se falsifica no commercio a resina *Elemi*. Julgo ser uma das Almecegueiras já descriptas.

Pão Precioso. Veja-se *Casca preciosa*.

Pão de Quiabo. *Laurus speciosa*. LAURINBAS.

Usos. Mucilaginoso e empregado contra a mordedura de cobras.

Pão da Rainha. *Centrolobium paraense*.

Pão de Rato dos sertanejos. *Cisalpina glandulosa-vel microphylla*. Vell Bahia.

Pão Rosa. Veja-se *Pão cravo*.

Pão de sabão. *Sapindus divaricatus*. SAPINDACEAS.

Usos. A casca do fructo é amarga e empregada na chlorose. O fructo contem uma substancia viscosa que serve e tem as propriedades do sabão.

Páo de Santa Lucia. *Dalbergia*. LEGUMINOSAS. Rio de Janeiro.

Usos. A nóz desta planta é de côr purpurea carregada. E' doce agradável, de aroma especial e empregnada de uma uateria resinosa que arde com muito brilho.

Páo Santo. *Kielmeyera*. S. Hilaire. THEACEAS. STERCULIACEAS. Martius.

Usos. Planta de natureza mucilagínosa ; suaa folhas são empregadas em banhos como emollientes.

Páo Santo. Com este nome é conhecido em certos logares do Brasil o *Guaiaco*.

Páo de S. José. *Kielmeyera canacea*. STERCULIACEAS.

Usos. Os mesmos do Páo Santo.

Páo de Sassafras. *Laurus sassafras*. LAURINEAS. Espirito Santo.

Usos. E' sudorífico e antivenereo.

Páo de Semana. Veja-se Murecí.

Páo seringa. Veja-se Borracha.

Páo Terra. *Qualea grandiflora*. RUTACEAS. Minas.

Usos. Resinosa e forneccando uma bella tinta amarella.

Páo Trombeta. Veja-se *Ambaíba*.

Páo Velho. Veja-se *Guabipocacaíba*.

Papagalo. Veja-se *Tinhorão*.

Paparajuba. E' a *Caróba*. no Maranhão.

Papaterra. E' a *Douradinha* no Pará.

Papo de Peru. Veja-se *Mil homem*.

Paracary. *Verbena paracary*. VERBENACEAS. Pará.

Usos. Empregado em tintura ou infusão na asthma.

Paraíba. *Simaruba Parahyba*. S. Hilaire. RUTACEAS. Rio de Janeiro, Minas Geraes e Rio de S. Francisco.

Usos. A casca é amarga acre e narcotica. Os indigenas a tem como venenosa. Sua infusão é usada internamente contra as sarnas e empigens syphiliticas. Reclama muito cuidado a sua administração.

Paraparau'ba. E' a *CAROBA* no Maranhão.

Paratucu. Veja-se *Jasmim do mato*.

Para tudo. Com este nome são conhecidas pelo menos cinco substancias vegetaes brasileiras. 1ª. A raiz da *Gomphrena officinalis*. 2ª. A casca de uma *Apocynia* estudada por S. Hilaire. 3ª.

A casca de um *Costus* indicada por Martius. 4ª. A casca do *Piper Umbellatum* de Linneo. 5ª A casca da *Paraiba*, conhecida tambem com o nome de *Parobo*.

Para tudo. *Gomphrena globoza*. Linneo. AMARANTACEAS.

Usos. As raizes são insípidas porem nauseantes ; e applicão-se contra as febres intermitentes colicas, diarrheas, dyspepsias, e mordeduras de cobras. Alguns botanicos julgão ser esta planta a conhecida pelo nome de *Raiz do Padre Salerma*.

Paraturá. Especie do genero REMIREA. Aubl. Pison. CYPE-
RACEAS.

Usos. Araiz que é aromática, é empregada como fortificante em banhos, fumigações e clysteres. A infusão e diaphoretica e diuretica. A infusão da raiz é anti blenorragica. Alguns botanicos a tem pela barba de boi. *Remirea marítima*.

Parietaria. *Parietaria officinalis*. URTICACEAS.

Usos. Diuretico poderoso.

Parobo.

Casca espessa acinzentada no exterior, no interior amarelada e extrahida segundo S. Hilaire da *Simaruba Paraiba*.

Parreira brava. *Cissampelos parreira*. Lamarck. MENIS-
PERMEAS.

Usos. Geoffroy gaba suas virtudes diureticas, Lochner cita suas propriedades contra a ascite, a tympanite, a asthma e a leucorrhœa. E' aconselhada nas dyspepsias como estomachica segundo Pison e Descontilz: o succo das folhas se applica nas mordeduras de cobra, dando a biber ao mordido a raiz, infundida em vinho. Tambem se póde preparar com esta planta uma especie de cavaça.

Existem tres variedades de parreira brava :

Cissampelos gayeri.

» *argentea*.

» *microcarpa*

Patahe.

Usos. Arvore frutifera e cujo fructo pr par do produz um vinho branco delicioso, fornecendo a amendoa um oleo comestivel

Pataqueira. Especie de planta aromática. Provincias do Norte.

Patoua. Veja-se PATAHE.

Patiputá

Usos. O oleo extrahido da semente é aromatico e serve para curar queimaduras e frigidar peixe.

Patuarana. E' a canna indica de Linneo.

Paupeira. *Vallesia*. Ruiz e Pavon. APOCYNÉAS.

Usos. A casca desta grande arvore é anti-escrophulosa segundo Riedel e Ildefonso Gomes.

Pé de bezerro. Veja-se TINHORÃO.

Pé de gallinha. *Panicum dactylon*. Pison. GRAMINEAS.

Usos. A raiz contuza é empregada como alexipharmaca e resolutiva. E' tambem util para prevenir o aborto.

Pé de macaco. Veja-se *Licopodio Indigena*.

Pé de perdiz. E' em Minas a ALCAMPHORA.

Pepino do matto. *Solanum muricatum*. SOLANÉAS.

Usos. Os fructos são comestiveis. As folhas pisadas são empregadas na *hydrophobia*.

Pequim.

Arvore cuja madeira ó de lei. A amendoa do fructo dá um sebo alvo e duro proprio para velas. O fructo cozido é comestivel.

Perdicium brasiliense. *Trixis*. — *Compositas*.

Usos. Esta planta de cheiro forte é empregada em cozimento como adstringente na menorrhagia (Martius).

Pereira. Veja-se *Casca preciosa*.

Periná. *Canna do matto*.

Periparoba. *Piper umbellatum*. Velloso. PIPERACEAS.

Usos. O succo da raiz e das folhas é desobstruente. O seu cozimento ou infusão é aperitivo; o xarope é usado na coqueluche. As folhas frescas o aquecidas applicão-se nas partes rheumaticas e nas ulceras venereas.

Perrexí. Veja-se *Amor crescido*.

Perrexil. *Chrithonum maritimum*. OMBELLIFERAS.

Usos. Maregrave diz que as folhas e os raminhos desta planta cozidas com o peixe dão-lhe um gosto saboroso. Além disto o perrexil é desobstruente e diuretico. Tambem se chama em alguns lugares — *alecrim* do Pará.

Persicaria. Veja-se *Herva de bicho*.

Petum.

Petume. } *Fumo*.

Pety.

Peuva. *Tecoma speciosa*. D. C. BIGNONIA. Velloso. BIGNONIACEAS.

Usos. Diuretica e cathartica.

Pião. É no Pará o nome que dão ao *Jatropha curcas*.

Picahonha. Veja-se *Poaya*.

Picão *Bidens graveolens*. *B. bullatus*. Linneo. COMPOSTAS.

Usos. O sumo é empregado na ictericia. Os indigenas fazem um digestivo composto do sumo do *picão*, com agua ardente, folhas de *Tricccaria*, e gema d'ovo.

Picão da praia. *Acanthospermum*. Schrank. COMPOSTAS.

A. *Xanthioides*. Kunth. Plumbago PLUMBAGINEAS.

Usos. Em cozimento feito na proporção de 1 onça para 1 libra d'agua é um succedaneo da quina na febre intermittente. Tambem se applica nos casos de erysipelas.

Pichuá. *Euphorbia portulacoides*. Linneo. EUPHOBIAEAS.

Usos. É purgativa. Algumas gotas do succo lançadas em um caldo ou o cosimento das folhas é bastante para se alcançar o effeito.

Pichurim. *Nectandria pichurim major*. Nees. *Ocotea puehury major*. Barrié. LAURINEAS.

Usos. É empregado nas dyspepsias, nas diarrheas e leucorreas, quer o pó das favas internamente, quer em cataplasmas ou fomentações. Sua tinctura foi muito empregada no cholera na provincia do Pará

Pichurim bastardo. *Nectandria pichurim minor*. Nees. LAURINEAS,

Usos. Os mesmos da *Nectandria major*.

Pimenta apuá. *Capsicum baccatum*. *C. cerasiforme*. SOLANEAS.

Usos. Condimento. Excitante.

Pimenta de cheiro. *Capsicum ovatum*. DC. *C. odoriferum*. Velloso. SOLANEAS.

Usos. Condimento. É tambem empregada como aromatica e anti-hysterica.

Pimenta coroadá. S. Hilaire. *Calyptanthus aromatica*. MYRTACEAS.

Usos. É considerada por alguns botanicos como sendo o *Myrtus pseudo caryophyllus*. Gomes.

Pimenta cumari. *Capsicum frutescens*. SOLANEAS.

Usos. Como condimento. Tambem entra em certas preparações contra as affecções anginosas.

Pimenta de gallinha. Veja-se. AGUARAQUYA.

Pimenta dos indios. *Piper unguiculatum*. Velloso. PIPERACEAS

Usos. A raiz é sialagoga, diuretica e empregada nas hydropesias e nas odontalgias. Parece ser o *Aperta Ruão* mui conhecido.

Pimenta malagueia. *Capsicum pendulum.* Velloso. SOLANEAS.

Usos. Empregada como condimento sobretudo para o Norte.

Pimentado Pará. *Spilanthes oleracea.* SYNANTHEREAS.

Usos. Os do mastruço.

Pimenta do sertão. *Xilopia grandiflora.* Saint-Hilaire. ANONACEAS.

Usos. Seus fructos aromaticos, acres e apimentados são empregados como condimentos e carminativos.

Pimenta da terra. *Capsicum annum.* SOLANEAS.

Usos. Condimento.

Pimentão. *Capsicum cordiforme,* SOLANEAS.

Usos. Excitante, aromatico, e epispatico. Usado como condimento.

Pimentão comprido. *Capsicum longum.* D. C. SOLANEAS.

Usos. Os mesmos do Pimentão.

Pimenta de Índia. *Xilopia seicea.* *X. brasiliensis.* Saint-Hilaire. ANONACEAS.

Usos. As fibras desta planta se separão tão facilmente que se podem fazer cordões e tecidos.

Seus fructos especies de pimenta são usados como condimentos e empregados como carminativos. A madeira serve para mastro de navios.

Pinguiciba. Veja-se PA'O PEREIRA.

Pinguim *Promelia pinguim.* BROMELIACEAS.

Usos. Antelmintico e diuretico.

Pinhão de purga. *Jatropha curcas.* LINNEO. EUPHORBIACEAS.

Usos. Os pinhões pôem ser comidos tirando-se o germen e o envoltório, pois que frescos tem o gosto de amendoas. Se não se tem a precaução que acabamos de apontar elles embebedão e purgão violentamente segundo a quantidade. 6 amendoas são bastantes para este ultimo effeito.

O oleo que dos pinhões americanos se extrahе pôde substituir o de *croton tiglio.* De 15 a 20 gotas até 412 oitava purga tambem.

Pinheira. *Anona cscabrosa?* ANONACEAS.

Usos. Os mesmos da fructeira de conde

Pinheiro do Brasil. *Araucaria brasiliana.* Lambert.
CONIFERAS.

Usos. Os pinhões são agradáveis e comestíveis, e da arvore distilla uma resina rutilante, de cheiro agradável e que póde ser empregado nos casos em que se usa da Terebenthina.

Pino. Veja-se. *Queimadeira.*

Pinoguaçu. Veja-se MAMOEIRO.

Piperioca. *Cyperus píperioca.*

Piperona. Veja-se. *Betys.*

Pipi. *Petiveria tetandria.* Gomes. PHYTOLACEAS.

Usos. Muito empregado em banhos e em tintura nas paraliasias do movimento e mesmo do sentimento, e nos rheumatismos.

Piqui. *Caryocar brasiliensis.* S. Hilaire. *C. butirosa.* Personne. RHISOBOLEAS SAPINDACEAS.

Usos. O fructo (drupa) desta arvore é do tamanho da cabeça de uma creança e contém uma amendoa agradável ao palladar, e da qual se tira um oleo doce. A polpa do fructo é composta de uma substancia graxa que serve em logar da manteiga para a preparação dos alimentos.

Ha ainda duas especie. *Caryocar glabrum*, e *Caryocar tomentosum* com as mesmas propriedades.

Piquiã. Veja-se Piqui.

Pira cauba. Veja-se CUMMARY.

Piragúia. Veja-se CIPÓ SUMÁ'.

Piranga. É o *Carajurú* já descripto e cuja infusão (folhas) é antidiarrheica e anti herpetica.

Piraquara. *Cipó Sumá.*

Piretro. *Ferraria purgans.* Martius. IRIDEAS.

Usos. O bulbo radical amylaceo é ligeiramente purgativo na doze de 3 a 4 oitavas.

Piriguaya. Veja-se *Cipó Suma.*

Piriri. *Mabea piriri.* Aublet. EUPHORBIACEAS.

Fornece caoutchou.

Existe na fronteira de Guayana.

Piririna' É o coqueiro *Jaraiuva.*

Pitangueira. *Eugenia michelis.* Lamark. *E. uniflora.* Linneo. MYRTACEAS.

Usos. Seus fructos rubicundos acidos e assucarados são comestíveis. Delles se fazem compotas, e vinagre. A planta é adstringente. Em Pernambuco costumão empregar o cosimento das folhas nas dores rheumaticas ou venereas.

Pitangueira de cachorro. *Calyptanthus obscura*. MYRTACEAS. Minas.

Usos. Os fructos são doces e ligeiramente adstringentes.
Ha no Rio de Janeiro a especie *C. tuberculosa*.

Pitangueira do mato. *Eugenia ligustrina*. MYRTACEAS. S. Paulo.

Usos. Fructos acidulos assucarados e ligeiramente adstringentes

Pitangueira miuda. *Myrcia rubella*. MYRTACEAS. Goyaz.
Usos. Os fructos são acidos, e a planta adstringente.

Piteira. *Agave americana*. BROMELIACEAS, Martius. LILIACEAS. Linneo.

Usos. As folhas dão filanças optimas para cordas, e fornece por trituração succo que espessado pela evaporação e junto com cinza forma um bello sabão. Assadas sobre carvão são optimas para o curativo das feridas. Frescas são excellentes topicos antisymphiliticos, e contra a lepra. O succo é antidoto do veneno da mandioca. O hampio secco serve de isca para guardar fogo. O extracto na dose de 4 a 2 escrupulos é um poderoso remedio contra a ascite, e hydropesias em geral.

Pitombeira. *Sapindus edulis*. S. Hilaire. SAPINDACEAS. Bahia e Pernambuco.

Usos. Os fructos são comestiveis e refrigerantes acidulos.

Pitumarana. *Lisianthus scrratus*. GENTIANEAS.
Usos. Amargo e resolutivo em cataplasmas.

Pixirica. *Mnianga Pixirica*. MELASTOMACEAS.
Usos. Os fructos são comestiveis.

Pixiricussu. *Melastoma tacaari*. MELASTOMACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Os mesmos da Pixirica.

Piuva. E' o *Ipê* em S. Paulo.

Pluma da Persia. *Tanacetum suarcolens*. CORYMBIFERAS. COMPOSTAS ?

Usos. Aromatica, amarga e um tanto acre é raras vezes empregada como estomachica e carminativa.

Poaya.

Nome com que o povo appellida a muitas plantas vomitivas, pertencentes a generos e familias diferentes.

Richardsonia emetica. Martius.
» *rosea*. Saint-Hilaire.
» *scabra*. D. C.

Borreria.

Machaonia.

Viola.

Polygala.

Ionidium.

Poaya branca. *Richardsonia scabra.* D. C. *Richardsonia brasiliensis.* Gomes. RUBIACEAS.

Usos. Sua raiz é emetica.

Ha ainda outra especie:

Richardsonia emetica. Martius.

Poaya do campo. *Borreria poaya.* D. C. RUBIACEAS. S. Paulo e Rio Grande do Sul.

Usos. Os da Ipecacuanha.

Poaya do campo. *Polygala poaya.* Martius. S. Paulo. POLIGALEAS.

Usos. A raiz desta planta é emetica na dóse de $\frac{1}{4}$ a 1 oitava e empregada nas febres biliosas.

Poaya comprida. *Borreria emetica.* Martius. RUBIACEAS.

Usos. Os da Ipecacuanha.

Ha ainda outra especie:

Borreria verticillata. Mey.

Poaya do mato. Veja-se *Poaya de botica.*

Poaya da praia. *Borreria ferruginea.* D. C. RUBIACEAS. Cabo Frio.

Usos. Os da Ipecacuanha.

Poaya do rio. *Machaonia brasiliensis.* RUBIACEAS. Bahia.

Usos. Os da Ipecacuanha.

Poaya verdadeira. Veja-se *Ipecacuanha.*

Pobura. Veja-se *Angelim.*

Poejo. *Cunila microcephala.* Benth. LABIADAS. Rio Grande do Sul. Rio. Ha ainda outra especie: *Manetia cordifolia.* Martius.

Usos. Empregada nas tosses chronicas.

Poejo da praia. *Centrospermum xantioides.* Rio de Janeiro Minas.

Usos. Tónico.

Polvilho.

O residuo da lavagem da tapioca, e que levado ao fogo se tem o cuidado de não deixar granular mechendo-se continuamente constitue o *polvilho*

Usos. Empregado como anti-diarrheico em clysteres, como absorbente nas erythemas, como alimento etc.

Potincoba. *Polygonum hydropiper.* POLYONEAS.

Usos. E' um bom tópic excitante nas dores antigas e nas velhas ulceras.

Seus fructos substituem as pimentas. Esta planta póde ser empregada nas anginas gangrenosas, e como sialagoga.

P. q. a. *Couroupita guianensis.* Aublet. MYRTACEAS. LE-CYTHIDEAS ?

Usos. Seus fructos contém uma polpa saborosa. Sua madeira é usada em diversos artefactos, quer dos indígenas, quer dos povos civilisados.

Ptii. Veja-se *Ibirarema*.

Puça. *Cissus antiparalyticus.* AMPELIDEAS. Maranhão.

Usos. As folhas são acres e se empregão pisadas nas paralyrias. As sementes são empregadas como enfeites.

Puça dô mato. *Cissus silvestris.* AMPELIDEAS. Maranhão.

Purga de Amaro Leite. E' em Goyaz a *Jalapa* de São Paulo.

Purga de Caboclo. Veja-se *Purga de gentio*.

Purga do campo. *Echites alexicaca.* Martius. APOCYNESAS. S. Paulo, Minas, Goyaz e Mato Grosso.

Usos. E' purgativa na dôse de 2 oitavas e empregado na oppilação, ictericia e melancolia.

Purga de Carijó. *Perianthopodus Carijó.* CUCURBITACEAS. Cuiabá.

Usos. E' um drastico, e empregado contra as mordeduras das cobras $\frac{1}{2}$ a 1 oitava da raiz. O fructo é cor de zarcão e a raiz tuberosa. Julgo ser a *Esphelina* de S. Paulo.

Purga de cavallo. *Convolvulus ventricosus.* Manso. Paraná. CONVULVACEAS.

Usos. E' um poderoso purgante empregado nos animaes cavallares,

Purga de Cayapo. *Dermophylla elliptica.* CUCURBITACEAS.

Usos. O fructo amarello e comprido deste cipó contem umas sementes miudas marginadas por uma linha branca e que tem uma vir-tude fortemente purgativa. E' mui empregada nas mordeduras de cobras, e cômô drastico.

Purga de Cayapo de S. Paulo. *Cayaponia globosa.* CUCURBITACEAS.

Usos. O fructo redondo e amarello deste cipó tem umas sementes tão drasticas quo dadas em clyster podem quando em doses elevadas produzir hemorrhagias. $\frac{1}{2}$ fructo é um bom purgante.

Purga do gentio. *Cayaponia diffusa*. Manso. *Bryonia pillosa*. Velloso. CUCURBITACEAS. Rio de Janeiro e Minas.

Usos. A raiz usada como purgativo é empregada também nas mordeduras das cobras. Frescas ou seccas e pulverisadas a doze é de 2 oitavas. Uma fructa deste cipó é um bom purgante. Ha ainda a especie *Cayaponia cablocllei*. Martius.

Purga de João Paez. Veja-se. CAA ATAYA.

Purga de João Paes em S. Paulo Veja-se. Bucha dos paulistas. Minas.

Purga do pastor. *Echites pastorum*. Martius. APOCYNÉAS.

Usos. Purgativo muito empregado pelos indigenas.

Purga dos paulistas. Veja-se. ANDAASSU'.

Purga de veado. Veja-se. PURGA DO CAMPO.

Puruhy. O fructo pulverisado e dissolvido em pouca porção d'agua é empregado nos pleurises.

Q.

Quassia paraense. Veja-se. Caferana.

Quatelé. *Lecythes olaria*. LECYTHIDEAS. Pará. Maranhão. Ceará.

Usos. As amendoas são comestiveis.

Quatro patacas. *Allamanda violacea*. APOCYNÉAS. Ceará.

Quaxinduba. Veja-se. GAMELEIRA.

Queimadeira. *Cnidioscolus marcgravii*. EUPHORBIACEAS.

Usos. As sementes são empregadas como as do Andaaçu. Em Pernambuco esta planta pisada e applicada em massa dizem aproveitar nos tumores carbuncullosos, e esfregando a massa nas manchas da pelle as faz desaparecer. Segundo Riedel a Queimadeira é o *Plumbago scanecens* da familia das PLUMBAGINEAS.

Ha mais duas especies :

Cnidioscolus neglectus. Pohl.

» *vilifolius*. Pohl.

Queraiba. Veja-se. Páo d'Arco.

Quiabo. Veja-se. Quingombô.

Quina bicolorada. *Solanum pseudochina*. S. Hilaire. SOLANEAS. S. Paulo.

Usos. A casca é eminentemente amarga e torna-se um bello succedaneo da quina verdadeira.

Quina de Camamu'. *Coulinia illustris*. Velloso. APOCYNÉAS.

Usos. A casca amargosa é prescripta nas febres intermitentes em decocção, infusão e extracto.

Quina de Cayenna. *Quassia amara*. Linneo. RUTACEAS. Pará e Bahia.

Usos. Tem um amargo francamente pronunciado. A casca é mais amargosa que o lenho, e a raiz mais que a casca. E' um tonico energico sem acreza, e da-se em infusão, vinho, tinctura ou extracto.

Quina do campo. *Strychnos pseudoquina*. S. Hilaire. Loganiaceas. Minas e S. Paulo. APOCYNÉAS.

Usos. Os mesmos que tem a verdadeira quina.

Quina do campo. *Hostia brasiliensis*. Velloso. RUTACEAS. Minas.

Uso. Casca amarga, adstringente e anti-febril.

Quina do Cuiaba'. *Cinchona cuyabensis*. Manso. RUBIACEAS.

Quina de D. Diogo de Souza. Veja-se. QUINA DO PIAUHY.

Quina do mato. *Cestrum pseudoquina*. SOLANEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. Esta especie de quina tem a casca muita amargosa e é um optimo succedaneo da verdadeira quina.

Quina do mato. *Exostema cuspidatum*. S. Hilaire. Minas e Rio de Janeiro. RUBIACEAS.

Quina do mato. *Exostema australe*. S. Hilaire.

Quina de Pernambuco *Coutarea speciosa*. Aubl. RUBIACEAS.

Quina do Piahy. *Exostema sousanum*. Martius. RUBIACEAS.

Quina do Para' *Cascaria adstringens*. Sapindaceas. Pará
Usos. Empregada nas febres de máo caracter e em loções nas ulceras sordidas.

Quina de S. Paulo. *Solanum pseudoquina*. S. Hilaire. SOLANEAS. Coritiba.

Usos. A casca desta planta é empregada pelos naturaes de S. Paulo e Coritiba contra as febres intermitentes.

Quina do Rio de Janeiro. *Exostema formosum*. Cham.
RUBIACEAS.

Quina do Rio de Janeiro. *Buena hexandra* Poht. Ru-
BIACEAS.

Quinas do Rio Negro.

Cinchona firmula.....
Cinchona lambertiana... } Martius.
*Cinchona bergenia*ana... }
Cinchona macrocnemia.
Usos. Cascas antifebris.

Quina do Rimigio. *Cinchona remigiana*. S. Hilaire. Ru-
BIACEAS. Minas Novas.

Quina do Rio Grande. *Dioscorea febrifuga*. Martius.
RHAMNEAS.

Usos. Anti-febril e tonica.

Quina da serra. *Cinchona ferruginea*. S. Hilaire. Ru-
BIACEAS.

Quingombô. *Hibiscus esculentus*. Linneo. MALVACEAS.

Usos. Suas folhas e seus fructos ainda verdes e cozidos com carne ou peixe & são de bello gosto. A cataplasma feita desta planta ou dos fructos é abstergente. E' um vegetal eminentemente mucilaginoso'.

Quingombô de cheiro. *Hibiscus abelmoschus*. Linneo.
MALVACEAS.

Usos. Usado em fomentações e clysteres.

Quiquoio. Veja-se. AZEITE DE DENDÊ.

Quiquoaquimputu. Veja-se Batata doce.

Quiruiriri. *Myrtus quiruiriri*. MYRTACEAS. Sertão de Minas.

Usos. Os fructos vermelhos e do tamanho de uma bala de espin-
garda são comestiveis.

Quti. Veja-se. Pão de Sabão.

Quitoco. *Pluchea quitoc*. DC. COMPOSTAS.

Usos. E' empregado como carminativo, resolutivo, anti-hysterico e digestivo tanto interna como externamente. Em infusão se dá 1 oi-
tava para 1 libra d'agua fervendo.

Quya. Veja-se. PIMENTA DA TERRA.

Quya apua. Veja-se. Pimenta malagueta.

Quyaqui. Veja-se *Pimenta da terra*.

Quyassu. Veja-se. *PIMENTÃO*.

Quyinha. Veja-se *Pimenta da terra*.

R.

Rabo de bugio. *Alsopihylla aromatica*. Martius. MYRTACEAS.

Usos. Mucilaginosa e empregada nos catarrhos e hemoptisias.

Rabo de guariba. *Clynodium officinalis*. CORYMBIFERAS.

Usos. Aromatico e excitante

Raivosa. E' em Minas a *Tiborna*.

Raiz amargosa. Veja-se *Genciana*.

Raiz de anvers. E' a *Caferana* no Rio Negro.

Raiz de babeiro. *Echites longiflora*.

Raiz do Brasil. Veja-se. *Ipecacuanha*.

Raiz da china branca. Veja-se. *Japecanga*.

Raiz de cobra. Veja-se. *Tiu*.

Raiz de frade em Minas. E' o *Cipó Cruz* em S. Pau lo

Raiz de guiné. *Petiveria aliacea*. PHYTOLACEAS.

Usos. Os mesmo do *Pipi* pois que é uma especie do mesmo genero.

Raiz de jacare-arú. Veja-se. *Caferana*.

Raiz de lagarto. Veja-se *Tiu*.

Raiz de ouro. Veja-se. *Ipecacuanha*.

Raiz do padre Salerma. *Gomphrena officinalis*. Martius. AMARANTHACEAS.

Usos. Raiz aromatica e applicada na dyspepsia, diarrhea, febres intermitentes e mordeduras de cobras. Não será a *Gomphrena globosa*. *Casca pra tudo?*.

Raiz preta em Minas. E' a *Chiococca densifolia* de Martius. CANINANA.

Raiz preta do Rio de Janeiro. *Chiococca anguifuga*. Martius. E' o *cipó Cruz* em S. Paulo.

Raiz do sol. *Aristolochia paraensis*. ARISTOLOCHIAS.

Usos. Sabor aromatico camphorado. E' empregada como excitante,

Batania da terra. *Krameria argentea*. Martius. KRAMERIACEAS. Minas e Bahia.

Usos. Adstringente.

Remedio do vaqueiro. *Occimum incanescens*. LABIADAS.

Usos. Draphoretico e diuretico.

Ricino. Veja-se. Carrapateiro.

Romeira. *Punica granatum*. Linneo. GRANATEAS.

Usos. As flores e a casca do fructo são preconisadas na dysentheria, diarrhea chronica, hemorrhagias passivas sobre tudo uterinas, blenorrea, leucorrhea e amygdalite. A casca da raiz é um poderoso teniafugo. Os fructos são temperantes e diureticos, e quer elles quer os xaropes com elles confectionados podem ser uteis nas febres inflammatorias, biliosas &c. As flores dão-se em infusão na porção de 2 á 4 oitavas para 2 librs d'agua. A casca do fructo em cozimento 1 a 2 onças para 2 libras d'agua. A casca da raiz em cozimento 2 onças para 2 libras d'agua reduzidas a metade pela decocção. Xarope do fructo 1 a 2 onças. Pó da raiz 1 a 3 oitavas.

Rosario de jambu'. *Eugenia racemosa*. Myrtaceas.

Usos. Raiz diuretica e desobstruente; a casca e os grãos do fruto são anti-febris.

Rosca para as mulas. Veja-se Sacarolha.

Ruibarbo do campo. *Ferraria cathartica*. Martius. IRIDIAS.

Usos. Os mesmos do *Piretro*. 1 a 2 oitavas do succo fresco. A raiz secca se dá em cozimento.

Ruibarbo do charco. Veja-se. *Pyretro*.

Ruivinha. *Rubia noxia*. *Galium paratyense*. Velloso. RUBIACEAS.

Usos. Tinturaria.

S.

Sabonete. Veja-se. *Pão de sabão*.

Sabugueiro. *Sambucus australis*. Cham. Santa Catharina, Rio Grande do Sul e S. Paulo.

Usos. As folhas são tão diaphoreticas como as do Sabugueiro europeu.

Saca estrepe. Pernambuco.

Usos. Mexendo-se as folhas desta planta com agua obtem-se uma mucilagem que se julga util nos cancrios.

Sacacolha. *Helicteres Izora*. Velloso. STERCULIACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. As flôres são emollientes.

Sacubaré. *Cyrtopodium sacubaré*. SMILACEAS.

Usos. Os mesmos da Japacanga.

Salepo indigena. *Orchis mascula*. Linneo. ORCHIDEAS.

Usos. Produz uma substancia seculenta, nutritiva, e analeptica.

Salsa brava. *Mikania abutilifolia*. CORYMBIFERAS.

Usos. Odorifera e excitante, e applicada em banhos nos reumatismos.

Salsa do máto. *Herreriasalsaparrilha*. SMILACEAS. Rio de Janeiro, Minas e Bahia.

Usos. Os mesmos da Salsaparrilha.

Salsa da praia. *Ipomœa maritima*. *I. litoralis*. CONVULVACEAS.

Usos. As folhas, quer interna quer externamente são empregadas contra as gonorrhêas antigas, e a raiz que é leitosa, é considerada como drastica. Segundo Pison o caule e as folhas são emollientes.

Salsa do Rio Grande do Sul. *Polygonum acetosaeifolium* Vent. POLYONEAS.

Usos. O seu cozimento e sobretudo o do caule é julgado antisiphilitico.

Salsaparrilha. *Smilax salsaparrilha*. Lioneo. *Salsaparrilha officinalis*. Humboldt. Bonpland. SMILACEAS. Pará.

Usos. A raiz é diaphoretica e um dos primeiros antisiphiliticos. Ha innumeraveis especies de salsaparrilha todas com as mesmas propriedades.

Salsaparrilha dos pobres.

E' o cajú em Pernambuco.

Salva. *Lippia citrata*. VERBENACEAS. Rio Grande do Sul.

Usos. A infusão das folhas é anticatarrhal; o cozimento é antirheumatico tomado em banhos.

Salva do Brasil. *Salvia fulgens*. LABIADAS.

As folhas brilhantes e escarlates cor de fogo tornão esta planta mui linda. E' empregada como aromatica e antispasmodica.

Salva do Pará. *Hyptis incana*. LABIADAS. Marajó.

Usos. Em banhos como excitante aromatico.

Samambaia. *Polypodium lepidopteris*. *Aspideum conaceum*.

Usos. Raiz mucilaginosa, sudorifica, antirheumatica e peitoral.

Sambaiba. *Curatella sambaiba*. S. Hilaire. DILLENIACEAS. Minas.

Usos. A segunda casca que é adstringente emprega-se nas feridas dos animaes, e nas ulceras atonicas.

Sambaibinha. Veja-se *Cipó de carijó*.

Sambau-va. Veja-se *Sambaiba*.

Sangue de dragão. *Croton*. EUPHORBIACEAS. Minas e Bahia.

Usos. Dá uma gomma resina avermelhada.

Sapateira. MELASTOMACEAS.

Usos. E' adstringente e as folhas muito empregadas para curtir couros os quaes ficão avermelhados. Dá tambem uma boa tinta preta.

Sapê. *Anatherum bicorné*. GRAMINEAS.

Usos. Emolliente e diuretico e algum tanto sudorifico é o cozimento de sua raiz. As folhas são empregadas para limpar os porcos depois de mortos, e para cobrir as casas. Suas raizes longas servem de cordas para amarrar os membros d'aquelles que são mordidos pelas cobras, afim de que o veneno não suba ao coração, como dizem os indigenas.

Sapé macho. *Arundo*. GRAMINEAS. Espirito Santo.

Usos. Aperitivo, desobstruente e resolutivo.

Sapotaçu. *Clercia passiflora*. Velloso. Ubatuba.

Sapote. *Achras sapota*. Linneo. SAPOTACEAS.

Usos. A casca do Sapote é adstringente e febrifuga (Brown). O fructo é excellente para comer-se, e serve contra a stranguria. Suas sementes são diureticas e aperitivas, e na dóse de duas oitavas com assucar e agua constituem uma emulsão aconselhada nas colicas nephriticas, e nas areias (gravelle).

Sapote grande. *Achras mamosa*. Linneo. SAPOTACEAS.

Usos. Os mesmos do Sapote.

Ha mais a especie:

Mimusops subsericea. Martius. Com as mesmas propriedades.

Sapucaiero. *Lecythis grandiflora*. Aubl. LECYTHIDEAS. *Bertholetia excelsa* de Humboldt.

Usos. Os fructos desta grande arvore (sapucaias) são do tamanho da cabeça de uma creança e ainda maiores; contem amendoas agradaveis ao paladar. Os macacos são apaixonados extremamente pelas sapucaias. A emulsão preparada com as amendoas da sapucaia é anticatarrhal e antinephritica.

Sapuealero branco. *Lecythis lanceolata*. Poir. LECYTHIDEAS.

Usos. Os mesmos do *Lecythis grandiflora*.

Sapueaiero-mirim. *Lecithis minor*. LECYTHIDEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Os fructos são pequenos contendo 5 ou mais amendoas.

Saputa' *Anthodiscus braylensis*. HYPOCRATEAS.

Usos. Os fructos são comestiveis, mucilaginosos e assucarados.

Saracura. *Begonia hirtella*. BEGONIACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Temperante e ligeiramente adstringente, é empregada com muita vantagem na dose de 1 a 2 onças do sumo nas diarrheas.

Saracura. *Jussieua angulata*. ONAGRAREAS. Norte.

Usos. Nas hemoptisias e diarrheas.

Sargaço do mar. *Fucus natans*. Linneo. ALGAS. Pernambuco

Segundo Pison é empregado em Pernambuco como diuretico e lithonriptico. Fornece o iodo.

Sassafras do Brazil *Ocotea cymbarum*. Kunth. LAURINEAS.

Usos. A casca amarga aromatica é empregada como tonica e carminativa

Saudades do Brejo. *Chrysocoma cymosa*. Vellozo. COMPOSTAS. Rio de Janeiro.

Usos. A raiz é antisiphilitica.

Sayão. *Kalanchoes brasiliensis*. Camb. PHITHOLACEAS.

Usos. O succo das folhas é empregado no curativo das feridas. O cozimento das folhas é resolutivo dos engorgitamentos lymphaticos, usado em banhos. A folha fresca applicada sobre as fontes combate as cephalias supra orbitarias.

Seilla brasileira. *Pancratium guyanensis*. AMARYLLIDEAS.

Usos. O bulbo é excitante, acre, emetico, expectorante e diuretico. E' muito empregado quer nos catarrhos, quer nas hydropesias. E' conhecida com o nome de cebolla branca ou brava. No Pará dão o nome de *cebolla brava* — a *clusia rosca*.

Sebipira. *Sebipira mayor*. Martius. LEGUMINOSAS. Provincias meridionaes.

Usos. A madeira é dura e perduravel e empregada em trabalhos technicos. A casca tem o gosto acerbo e adstringente. E' considerada como diaphoretica, e usada contra os tumores arthriticos devidos ao virus venereo. O barão de Paiva a considera um poderoso excitante do aparelho lymphatico. Serve-se do sen cozimento em banhos contra as affecções herpeticas chronicas.

Sebipira falsa *Ferreirea spectabilis*. Freire Allemão. LEGUMINOSAS. Rio de Janeiro.

Sebupira. Veja-se Sebipira.

Sebuua-uva. Veja-se Sucu-uva.

Segurelha. *Satureja hortensis*. LABIADAS.

Usos. Aromatica e serve para condimento.

Segurelha brasileira. *Ocimum gratissimum*. LABIADAS.

Usos. Os mesmos da portugueza.

Sene do campo. *Cassia cathartica*. Martius. LEGUMINOSAS.
S. Paulo e Minas.

Usos. Cathartico : 4 oitavas dos foliolos para uma libra d'agua fervendo. Ha ainda a especie *Cassia magnifica* Martius.

Sensitiva. Veja-se *Malicia das mulheres*.

Sepepera. Veja-se *Sebipira*.

Serciba-tinga. Veja-se *Mangue branco*.

Seringueira. *Borracha* no Pará. SIPHONIA.

Serpão. *Thymus serpyllum*. LABIADAS.

Usos. Aromatico e serve para condimento. E' empregado nos casos que reclamão os antis-pasmodicos e excitantes, e externamente nos edemas, ecchymoses etc. etc.

Serralha. *Sonchus levis*. Velloso. CHICORACEAS.

Usos. Comestivel, desobstruente e depurativa.

Sete casacas. *Britoa Sellowiana*. MYRTACEAS. Minas

Usos. Adstringente.

Sete sangrias. *Cuphea ingrata*. Cham. LYTHRARIACEAS.

Usos. O cosimento desta planta é muito empregado como anti-febril nas intermittentes.

Ha ainda uma especie *Cuphea balsamona*. Cham.

Sete sangrias do Rio Grande do Sul. *Symplocos platyphylla*. SYMPLOCEAS.

Usos. A casca da raiz desta planta é amargosa, adstringente e mucilaginoso, e empregada como anti febril nas febres terças. Da-se em cosimento.

Sete sangrias. *Barbarina tetandra*. Martius. SYMPLOCEAS.
Minas.

Uso. Os mesmos do genero *symplocos*.

Sicopira. Veja-se *Sebipira*.

Silva. *Rubus brasiliensis*. Martius. ROZACEAS.

Usos. Os fructos conhecidos por *Amoras de Silva* são assucarados, avermelhados e servem para confeccionar um xarope que pôde ser applicado como antisporbutico. Ha ainda a especie *Rubus jamaicensis*. Linneo.

Silva da praia. Veja-se *Ininboja*.

Silvina. Veja-se *Cipó Carneiro*.

Simbaíba. *Dadia liza*. Maranhão.

Usos. E' empregada nas dôres e difficuldades de urinar, hemoptisias e vomitos. Os penteciros usão della para lixarem os pentes, e por isso no Pará é conhecida com o nome de *Lixa*.

Simira. *Psychotria semira*. Linneo. *RUTACEAS*.

Usos. Adstringente. Tinturaria.

Solidonia. *Trixis divaricata*. Sprengel. *T. antimenorrhœa*. Martius. *Castra regia*. Velloso. *SYNANTHEREAS*. Rio de Janeiro, Pará e Minas.

Usos. O cosimento das partes herbaceas é empregado nas ophtalmias, e o extracto da raiz é emmenagogo.

Sorveira. *Callophora utilis*. Martius. *APOCYNÆAS*. Pará e Rio Negro.

Usos. O succo leitoso desta planta serve para verniz. E' tambem um anthelmintico e se dá na dose de 2 a 3 oitavas junto com o oleo de ricino.

Suassu-çaa. }
Suassu-aia. } *Herva grossa*.

Subragi. *Cianothus speciosa*. *Rhamneas*. Minas.

Usos. Amargo, e anti rheumatico.

Sucopira. Veja-se. *Sebipira*.

Sucuuba. *Plumeria phagedenica*. Martius. *APOCYNÆAS*. Rio de Janeiro e Pará.

Usos. E' applicado o succo leitoso desta planta contra os vermes intestinaes. Externamente emprega-se nas ulceras stonicas e nas verrugas; é de uma efficacia extraordinaria na blenorrhœa.

Ha ainda *Plumeria drastica* M. V. applicada em pequenas doses nas febres intermitentes, na ictericie; nas obstruções do figado e no pleuriz. Emprega-se o succo leitoso fresco com oleo de amendoas doces.

Sucuuba-rana. *Pterandrium amarum*. Lacerda. *MALPYGHEACEAS*. Pará.

Usos. O cosimento das folhas é empregado contra a sarna.

Suçuaia. Veja-se *Herva collegio*.

Suê. Nome africano e pelo qual são conhecidas muitas de nossas plantas.

Sumarè. *Cryptopodium brasiliensis*. ORCHIDEAS.

Usos. O succo gommo gelatinoso é empregado pelos sapateiros. Socado é um bom supurativo, e em cozimento é peitoral.

Sururucá. *Passiflora sururuca*. Velloso. PASSIFLORAS.

Sururucujã. *Passiflora albida*. Velloso. Bahia. PASSIFLORAS.

Usos. Os do Maracujá.

Sussuaia. Veja-se *Herva grossa*.

T.

Tabaco. Veja-se *Fumo*.

Tabua. *Aeschynomene*. LEGUMINOSAS. Ceará.

Usos. Os mesmos que a *Typha* do Sul. CYPERACEAS.

Tabu'a. *Typha minor*. Sul.

Usos. Empregada na confecção de esteiras etc. Também a empregão em banhos como emolliente.

Ha as especies :

Typha latifolia.

« *angustifolia*.

Tabuquinha. *Penouca nemorosa*. *Commelinea communis*. COMMELINEAS. Logares humidos do Pará.

Usos. Esta planta, que parece ser a *trapoeraba*, se emprega no Pará em clysteres nas affecções hemorrhoidaes e nas disenterias. E' conhecida também por *Granma da terra*.

Tacahamaca. Resina fornecida pela *Amyris ambrosiaca* e não pela *Icica* como pensa alguém. E' aromatica e empregada nos catarrhos chronicos, rheumatismo, hysteria, etc. etc.

Tacoari. E' o *Castanheiro* do Maranhão em Cuiabá.

Tacomarè. Veja-se *Canna de assucar*.

Tagoa-uva. Veja-se *Tatagiba*.

Tahauhê. Veja-se *Caa-ataya*.

Taiaboeira. *Mandioca pequena, enfesada*.

Tajabussu. Veja-se *Tayoba*.

Tajaz. Veja-se *Tayoba*.

Tajuba. Veja-se *Tatagiba*.

Tajuja. Veja-se *Abobreira do mato*.

Tajura'. Veja-se *Tinhorão*.

Tamacoaré. Veja-se *Balsamo do Perú*.

Tamarindeiro. *Tamarindus indica*. Linneo. LEGUMINOSAS.

Usos. O fructo é uma vagem contendo uma polpa acida adstringente ligeiramente assucarada. Conforme a dóse da polpa do tamarindo ella é refrigerante ou laxativa.

Tambatajá. *Caladium*. AROIDEAS. Maranhão e Pará.

Usos. As folhas são empregadas topicamente nas obstrucções do fígado e baço.

Tameorana. *Dalechampia*. EUPHORBIACEAS.

Usos. Excitante e pruriginosa. E' conhecida tambem por — CAA-JASSARA.

Tamaotarana. Veja-se. *Mandobi*.

Tangaraca. Nome de muitas plantas venenosas de naturezas differentes. Pison admite quatro e diz que ellas envenenão os homens e os animaes a maneira do arsenico, e que o seu melhor antidoto é a raiz da mesma planta contusa.

Tangaraca. *Cephaelis ruillidefolia*. RUBIACEAS.

Usos. As sementes são mui venenosas.

Tangaraca-assu. *Palicourea officinalis*. RUBIACEAS.

Usos. As folhas são anti-rheumaticas em banhos e internamente em infusão fraca.

Tangaraguassu-cao. *Coccoloba crescentiaefolia*. POLIGONEAS.

Usos. As bagas são adstringentes.

Tangerina. *Citrus margarita*. AURANTIACEAS.

Usos. Refrigerante, acidulo agradável; a casca do fructo é tonica e antiscorbutica quando madura.

Tapagiba. Veja-se. *Tatagiba*.

Tapeçava. Pisen. *Vassourinha*.

Taperiba. Fructo que segundo os nossos indigenas excita o appetite venereo.

Tapia. *Crataeva narvala*. CAPARIDEAS. Olinda e seus arredores.

Usos. Os fructos são comestiveis, vinhosos e de cheiro alliaceo. O cozimento das folhas é anti-rheumatico, e contuzas são anti-hemorroidarias.

Tapicho. *Siphonia rhytidocarpa*. Martius. EUPHORBIACEAS.

Usos. Fornece gomma elastica.

Tapicuy. Vinho feito da mandioca.

Tapinhoan. *Silvia navalium.* LAURINEAS.

Usos. E' uma excellente madeira de construcção. A casca é adstringente.

Tapioca. Pó que se deposita no fundo dos vasos sobre que se expreme a mandioca. Lavado muitas vezes e levado ao forno para granular á calor moderado forma a farinha conhecida por aquelle nome. O pó da Tapioca antes de ir ao forno diluido em agua fria, e posto depois em uma panella onde haja agua fervendo e a dubado com o tucupi fervido, forma muitas vezes o almoço e o jantar de nossos indigenas.

Tapyra cayenna. Veja-se. *Canna fistula.*

Tapyra coana Veja-se. *Canna fistula.*

Tapyracoynana. *Cassia sclerocarpa.* Volger. Marcgrave. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do *Tamarindeiro.*

Tapyra pecu. *Tapiria?* Aublet. Herva Grossa. *Elephantopus.* Martius.

Usos. Vulneraria e desobstruente do figado.

Taquari. *Mabea taquari.* Aublet. EUPHORBACEAS. Fronteira da Guayana.

Usos. Fornece caoutchou.

Taqueira. Abobora pequena, chata e de casca liza.

Tareroqui. Veja-se. Fedegoço.

Taririqui. Planta empregada nas paralisias esfregando-se as partes enfermas com as folhas cosidas. O cozimento da raiz é util nos tumores e orchites como resolutivo.

Tapagiba. *Broussonetia tinctoria.* *Morus tinctoria.* URTICACEAS *Artocarpeas.*

Usos. Esta planta hoje quasi de todo extincta dá pela cocção uma excellente tinta amarella muito apreciada nas artes.

Tatai-y. Veja-se. *Tatagiba.*

Tatapiririca. *Amyris.* TEREBENTHINACEAS.

Usos. Os fructos são doces e comestiveis.

Tata-uva. Veja-se *Tatagiba.*

Tatu'. E' uma especie de mandioca.

Tatu. *Eugenia axillaris.* MYRTACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Adstringente.

Tatuauba. MELIACEA. Ha tres especies sendo a branca a mais empregada.

Usos. Emeto cathartica.

Tauba. Veja-se *Tatagiba*.

Tauiri. *Couratari gujanensis*.

Tavagiba. Veja-se *Tatagiba*.

Taya. } *Tayoba*.

Taya-uva. }

Tayoba de S. Thomé. *Collocasia antiquorum*. *Arum collocasia*. Velloso ARACEAS. AROIDEAS?

Usos. Suas folhas são comestiveis ; sua raiz um tanto acre cozida com sal perde sua acridez e torna-se agradável como o cará

Tayoba. *Caladium esculentum*. Linneo. Aroideas.

Usos. Fornece a um grande numero de povos dos paizes quentes alimento saudavel. Suas enormes raizes formecem uma abundante fecula que se come cozida ou torrada. As folhas tambem são comestiveis, e servem de cataplasma maturativas.

Ha mais as especies.

Caladium mucronatum. Pison.

» *poecile*. Schott.

Tayoiã. Veja-se *Abobreira do mato*.

Tayurá. Veja-se *Tinhorão*.

Tayuyá miúdo. *Alternanthera tayuiã*. Manso. *Melothria?* CUCURBITACEAS.

Usos. Este cipó cotovellado e de folhas profundamente cordiformes de ponta aguda é alterante e seus fructos são purgativos.

Tayuyá de fructa encarnada. *Trianosperma tayuyá*. Martius. *Bryonia tayaya*. Velloso. CORCURBITACEAS. Rio de Janeiro.

Usos. Raiz nabiforme drastica na dósa elevada, emetica em pequena dóse. Emprega-se o pó 12 a 14 grãos.

Ha mais a especie:

Trianosperma arguta. Martius.

Wilbrandia scabra. Martius.

Tayuyá do Para'. *Trianosperma glandulosa*. Martius. CUCURBITACEAS.

Usos. Empregado como um excitante do systema lymphatico.

Tayuyá de quiabo. *Wilbrandia hibiscoides*. Manso. CUCURBITACEAS. Minas e S. Paulo.

Usos. Os mesmos das outras especies de Tayuyá.

Teipoca. *Plumeria bicolor*. APOCYNÆAS.

Usos. Os mesmos da *Tiborna*.

Teitacapeba. E' uma *Melastoma*.

Usos. E' um poderoso adstringente.

Teiu. *Jatropha opifera*. Martius. *Jatropha lacerti*. EUPHORBACEAS.

Usos. Da raiz branca e carnosa desta planta se prepara um extracto resinoso que na dóse de meia oitava obra como purgativo e é empregado na hydropesia e nas mordeduras de cobras.

Tembetaru' *Xanthoxylum langsdorffii*. Martius. XANTHOXILACEAS.

Usos. A casca sobretudo a da raiz é empregada contra as dores de dentes e dos ouvidos em cozimentos, loções e fomentações. E' amarga, acre e aromática.

Tentos. *Abrus precatorio*. LEGUMINOSAS.

Usos. A raiz é mucilagínosa; as folhas fornecem um extracto que pode passar por arcassus. As sementes que são vermelhas e com olho preto se dizem venenosas o que precisa confirmação.

Teriry. Veja-se QUIRUIRI.

Tety-pote-iba. Veja-se *Oera repoty*.

Tetypoteira. *Vitis arbustina*. Pison.

Usos. Esta parasita é resoliativa, útil na hydropesia e fortificante. Martius julga ser esta planta a Guira.

Thiothio. *Azeite de dendê*.

Ti, *Dracena brasiliensis*. *Cordilina terminalis*. Liliaceas.

Usos. A raiz assada embriaga.

Tiborna. *Plumeria drastica*. Martius. APOCYNÆAS. Minas. Bahia. Pernambuco.

Usos. O succo leitoso da Tiborna ó empregado fresco e misturado com leite de amendoas, em pequenas dóses (uma colher) nas febres intermitentes, na ictericia, nas obstruções chronicas e no empyema. O extracto da casca se dá na dóse de oito grãos. O succo leitoso da Tiborna do Rio de Janeiro,—*Plumeria phagedenica*, é aconselhado por Martius contra os vermes intestinaes. A casca secca purga na dóse de dois escropulos.

Ticuara. E' um caldo feito de farinha d' agua, ou de farinha secca com agua fria. Tambem se dá esse nome a qualquer succo de fructa misturado com farinha, agua, e assucar.

Ticuna. Veneno composto com o succo de diversos cipós indigenas.

Timbó. *Paullinia pinnata*. Linneo. *Serjania lethalis*. S. Hilaire. SAPINDACEAS.

Usos. A casca, as folhas e o fructo são narcotico acrés, actuando como venenos principalmente sobre o aparelho renal e massa encephalica. Alguns indigenas o empregão contra a hydrophobia, melancolia, alienação e amaurose. As cataplasmas do cozimento deste cipó applicadas no hypocondrio direito e nas regiões costaes, são de utilidade nas hepatitis e pleuresias. E' com o Timbó que os nossos indigenas embebedão o peixe para apanhal-os a mão.

Timbó do Rio de Janeiro. *Physalis heterophylla*. E' uma especie do Camapú.

Timburi. Mimosa.

Timpabea. *Mahonia glabrata*. BERBERIDEAS.

Usos. Serve para entorpecer os peixes.

Tinquaciba *Zanthoxilum tinguaciba*. RUTACEAS.

Usos. Esta planta é mui empregada pela facilidade com que arde ao fogo.

Tingui. Norte. Especie de Timbó fedorento que entorpece os peixes e mata o gado vaccum.

Tingui capetã. }
Tingui de cola. } *Timpabea*.

Tinhorão. *Caladium bicolor*. Vent. AROIDEAS.

Usos. As folhas são empregadas em gargarejos nas esquinencias. O succo expresso é cathartico. A raiz é um poderoso remedio contra a bicheira dos animaes. O cozimento das folhas é antidontalgico.

Tintureira vulgar. *Phytolacca decandra*. Linneo. PHYTOLOGACEAS.

Usos. Empregada em cataplasmas nas ulceras de máo character.

Tipi do Maranhão.

E' o Mucurá do Pará.

Tiplaca }
Tiplacica } *Tapioca*.
Tipioja }

Tipi. *Frutex arborescens*. Pison.

Usos. Diz Pison que esta planta fornece de sua casca uma mucilagem com que se fricciona os membros dos adultos atacados de dores articulares. As folhas e a raiz deste arbusto são empregadas em banhos nas febres intermitentes e affecções herpeticas.

Parece que esta planta é a *petiveria* conhecida no Pará com o nome de *Mucuracaba*.

Tipu. *Tipuana speciosa*. LEGUMINOSAS.

Tiririca. *Cyperus brasiliensis*. GRAMINEAS. *Cyperoidean*.

Usos. Pela sua semelhança com o *Cyperus longus* europeu deve ser emmenagoga e estomachica.

Tiririca. Mato Grosso.

É uma planta do genero *Scleria* da familia das GRAMINEAS.

Tiu. *Adenoropium opiferum*. Martius. EUPHORBIACEAS. Minas S. Paulo e Goyaz.

Usos. É um purgativo muito empregado na ictericia, hydropsias e obstruções das visceras abdominaes. 1 oitava de extracto e sendo este preparado a frio, 1½ oitava é bastante para uma dose. Alguns querem que seja o Tiu conhecido.

Tiu. É em Pernambuco a Contraerva.

Tolanga. *Leonurus cardiaca*. Linneo. Martius. LABIADAS.

Usos. O succo dado ás colheres é antihemoptico e peitoral, e julga-se um antidoto da raiva. 2 colheres do succo com mel de jatý.

Tomate. *Solanum lycopersicum*. Linneo. *Lycopersicum esculentum*. Donal. SOLANEAS.

Usos. O fructo é empregado como condimento nos alimentos. A planta é aromatica. O tomate é um bom remedio para os callos nos pés.

Tomba. É em Minas a Espelinade S. Paulo.

Tonhoacembrabeova. Veja-se *Verbasco*.

Topinambour *Helianthus tuberosus*. Linneo. RADIADAS.

Usos. Os tuberculos da raiz analogos ás batatas são comestiveis, crus ou preparados.

Touca de viuva. *Petrea volubilis*. VERBENACEAS.

Usos. Excitante e diaphoretica,

Touri. Veja-se *Umiri*.

Tracum. Veja-se *Imbè*.

Trapomonga.

Empregada secca e pulverisada nas ulceras.

Trapoceraba. *Tradescantia diuretica*. Martius. COMME-LINEAS.

Usos. É empregada como emolliente sabonosa, em banhos, em clysteres e internamente nas dores rheumatismaes, e na retenção espasmodica de urinas. É um excellente antihemorrhoidal, e útil nas hydropesias. O succo das folhas frescas calma a irritação dos dartros, e seus banhos são mui proveitosos nas affecções herpeticas. Tambem se dá o cozimento desta planta 2 libras por dia e 3 onças por cada vez nas leucorrhéas e gonorrheas.

Trapoceraba ephemera. *Tradescantia geniculata.* COM-MELINEAS.

Usos. Empregada contra as mordeduras das cobras.

Trapoceraba rana. *Maria Anninha* no Rio de Janeiro e em Minas.

Trapoceraba vermelha. *Tradescantia rubra*

É estimulante e lavando-se o rosto com o cozimento desta planta a pelle toma a côr rosacea.

Tremate. *Baccharis brasiliana.* Linneo. *Vernonia scabra.* Pers. CORYMBIFERAS.

Usos. Suas folhas contundidas e applicadas sobre os olhos fazem desaparecer as dores nas ophthalmias; o que faz suppor-as emollientes e calmantes.

Tres folhas brancas. *Ticorea febrifuga.* Saint-Hilaire. *Costa aromatica.* Velloso. RUTACEAS.

Usos. A casca amarga e adstringente é empregada em infusão ou extracto contra as febres intermitentes

Tres folhas vermelhas. *Esenbeckia febrifuga.* Martius. RUTACEAS. S. Paulo e Rio de Janeiro.

Usos. Os da Laranjeira do mato.

Trevo. *Cleoma viscosa?* Pison. CAPARIDEAS.

Usos. A raiz em decocção é usada pelos naturaes do paiz contra o fluxo de ventre proveniente do frio.

Trevo d'agoa. *Oxalis repens.* Saint-Hilaire. OXALIDEAS.

Usos. Refrigerante e antiscorbutico.

Ha diversas especies :

Oxalis fulva. Saint-Hilaire.

» *cordata.*

» *martiana.* Zuccar.

Trevo de cheiro. *Pleurantha odorata.* CORYMBIFERAS.
Usos. Os do Trevo ordinario.

Trevo azedo. Veja-se Trevo d'agua.

Trifolio. *Oxalis acetocella.* OXALIDEAS.

Usos. O succo é antiscorbutico.

Trigo branco. *Triticum amyleum*. Nees. GRAMINEAS.

Usos. Os mesmos das outras especies de Trigo.

Trigo caudeal *Triticum hibernum*. Linneo. GRAMINEAS.

Usos. Os mesmos do Trigo tremez.

Trigo durasio. *Triticum durum*. Desfont. GRAMINEAS.

Usos. Os mesmos das outras especies de Trigo.

Trigo tremez. *Triticum sativum*. Linneo. GRAMINEAS.

Usos. Dizer que além de outras propriedades o trigo forma o principal alimento do homem, é fazer a maior apologia desta planta.

Tripa de gállinha. *Dalbergia gracilis*. LEGUMINOSAS. Mato Grosso.

Trombeteira branca. *Datura arborea*. Linneo. SOLANEAES.

Usos. O cheiro desta planta é damnoso. Emprega-se a Trombeteira como narcotico nos rheumatismos em banhos. As folhas fumadas são uteis na asthma.

Ha ainda a Trombeteira roixa *Datura fastuosa* Linneo.

Trueuas. E' o Cipó do Imbê em Mato Grosso.

Tuaiussu'. Veja-se *Marinheiro de folha larga*.

Tuaupoca. Veja-se *Marinheiro de folha larga*.

Tuca. Nome da *Castanha do Brasil* (*Bertholceia excelsa*.)

Tucari. Veja-se *Castanheiro do Maranhão*.

Tucumã. Vinho feito do succo da palmoira *Tucuma-y*.

Tucupi. E' o succo amarellado que sahe da mandioca descascada e ralada quando se a comprime no tipity fervido ou deixando azedar por espaço de 24 horas., e adubado com sal, pimenta e cravo da terra é o molho o mais agradável dos nossos indigenas.

Este mesmo *tucupi* não fervido ou azedado, é um poderoso veneno. Seu contra veneno dizem ser a casca da mandioca.

Tucupi-pixuna. E' o tucupi engrossado e recozido.

Tucupiyca. E' o succo da mandioca encorporado com a tapioca

Tut-juva. Veja-se *TAPAGIPA*.

Tukira. Nome brasileiro de uma planta da familia das Irideas e empregada como purgativa.

Tupaipi. Veja-se *Urucatu*.

Taperebá. *Mangifera pinnata* *Spondias mangifera*. TEREBEN-
THINACEAS.

Usos. Fructos venenosos. A casca pulverisada é util nas dysen-
therias. O cozimento do lenha efficaz na gonorrhœa. O succo das folhas
se emprega nas otites.

Tapietéha. Veja-se *Vassoura*.

Tupixava. Veja-se *Vassourinha*.

Tupurupo. Veja-se *Caferana*.

Tuquira. Veja-se *Lírio*.

Turari. *Paullinia grandiflora*. S. Hilaité. SAPINDACEAS.

Usos. Os mesmos do *Timbó*.

Turiuva. Veja-se *Carapeirana*.

Turumá. *Vitex turumá*. Martius. VERBENACEAS.

Usos. O cosimento da casca é empregado contra as affecções sy-
philiticas acompanhadas de aboia. Seus fructos são peitoraes.

Turuman. Veja-se *Ipf*.

Tury. Veja-se *Guajará*.

Typyrati. Farinha crua da mandioca cortada em rodas, secca
ao sol, e pizadas á pilão.

TyQyrá. Veja-se *Lírio amarelo do campo*.

U.

Uapuim-massa'. Arvore do Rio Negro. Desta arvore fazem
os Jurupoxunas suas tangas e camizas. Cortão os mais grossos tron-
cos no comprimento que lhes parece, fazem uma incisão longitudi-
nal, introduzem uma palmeira de madeira por entre os labios da in-
cisão, tirão a casca, raspão a epiderme verde e tornando a applical-a
sobre o tronco, batem-lhe até expellir a humidade.

Uariá. Planta cuja raiz é feculenta e alimentar.

Uariguena. *Pimenta longa redonda e vermelha*.

Uarubé. É o succo da massa da mandioca d'agua, ou secca
mixtureada com a mesma mandioca e temperada com o tucupi fervido.

Uarumá. *Maranta arounz.* Aublet. MARANTACEAS.

Uauçu. *Monopterix uauçu.* LEGUMINOSAS.

Usos. As sementes são oleosas e amargas.

Ubá. *Canna brava*. Nees

Usos. Fazem-se do ubá cestos, balaios etc. e das hasteas floríferas gaiolas e caudas de foguetes. É empregado como excitante diuretico.

Ubaaçu. Veja-se *Páo Pereira*.

Ubacaba *Psidium radicans*. MYRTACEAS. Rio Grande.

Usos. Fructos comestíveis e planta adstringente.

Ubacaia. *Costus spicatus*. Martius.

Usos. Os da *Canna de Macaco*.

Ubaia. Veja-se *Pitangueira*.

Uba-tím. Veja-se *Milho grosso*.

Ubirarema. Veja-se *Ibirarema*.

Ubira-siqua. Veja-se *Icicariba*.

Ubussu'. *Manicaria saccifera*. Veja-se *Coqueiros*.

Ucuuba. *Myristica sebifera*. Martius. MYRISTICÉAS.

Usos. Os mesmos da Bicuiba. O leite é útil na esquinencia.

Umari *Geoffroya inermis*. Linneo. LEGUMINOSAS Pernambuco, Bahia.

Usos. Sua casca é um poderoso anthelmintico cuja administração reclama critério. Se a dose é forte vomitos copiosos e superpurgações apparecem que podem prejudicar. A dose regular é de $\frac{1}{4}$ oitava do pó para um adulto, e de 3 oitavas em cosimento tomado as colheres, e de 1 escropulo do extracto. Deve-se evitar beber agua fria durante a acção deste medicamento.

Umbaru. *Hibiscus cannabinus*. MALVACEAS.

Usos. Emolliente.

Umbé. Veja-se *Ambé*.

Umbu'. Veja-se *Imbuzeiro*.

Umburapuama. Veja-se *Manacá*.

Umiri *Humirium floribundum* Martius. HUMIRIACEAS.

Usos. O oleo fornecido por esta planta póde substituir o de Copahiba. Ha ainda outra especie *Humirium balsamiflorum*. Aublet.

Umiri bastardo. *Trexandria elliptica*. Pará.

Usos. Seu oleo é adstringente e util o cosimento da casca na ulcera da garganta.

Unha d'Anta. *Bauhinia aculcata*. LEGUMINOSAS.

Usos. É empregada nas mordeduras de cobra e na morphêa em banhos e em cosimento, na dose de meia onça para uma libra d'agua.

Unha de Boi. Nome dado a muitas especies do genero *Bauhinia* por causa da forma das folhas.

Unha de Boi. *Bauhinia forficata*. Link. LEGUMINOSAS.

Usos. Planta mucilagínosa e levemente adstringente é applicada nas affecções que reclamão medicamentos destas propriedades e emprega-se em cataplasmas, clysteres, gargarejos etc. Parece ser a *B. aciculata* de V. e M.

Unha de gato. *Perlebca bauhiniioides* BIGNONIACEAS.
Martius. *Bauhinia imbricata*. DC.

Usos. É reputada alexitere e empregada nas mordeduras de cobras.

Unha de vaca. Veja-se *Unha d'Anta*.

Upéuua. Veja-se *Ipê*.

Urarema. *Andira stipulacca* Benth. LEGUMINOSAS.

Usos. Os mesmos do Angelim amargoso, porém não tão empregado. É conhecido por *Angelim coco*.

Urari. *Jaguaraninca urary*. Lacerda. Pará.

Usos. A casca da raiz é amarga e util nas dores de dentes.

Uriunduva. Veja-se *Arocira do campo*.

Urubu-eaa. *Aristolochia trilobata*. ARISTOLOCHIAS.

Usos. Fetida e amargosa. Excitante.

Urubueuba. SOLANEAS. Maranhão.

Usos. Culinarios.

Urubugereo. Veja-se *Urubucaa*.

Urubu goene. Veja-se. *Urubucaa*.

Urucatu. *Amaryllis princeps*. AMARYLLIDEAS? ORCHIDEAS?

Usos. O bulbo do Urucatu é uzado como o bulbo da scilla. Algumas especies são mui venenosas segundo a opinião de Martius.

Urucu. *Bixa orellana*. Linneo. BIXINEAS.

O fructo é uma capsula crigada de espinhos contendo muitas sementes revestidas de uma pellicula avermelhada.

Usos. Com a cor vermelha das sementes se tinge a manteiga o chocolate &c. Os nossos indigenas pintão o corpo com esta substancia; mixturando-a com oleo de ricino ou de côco, e em consequencia do sabor desagradavel que sentem os mosquitos estes não mordem os indigenas. A cor que o urucú dá aos estofos desbota debaixo da acção dos raios solares e dos acidos. Em medicina era antigamente empregado o urucú como ligeiro purgativo e estomachico; hoje julga-se ser

um ligeiro expectorante. Os grelos postos n'agua largão uma mucilagem anti-ophthalmica. Tambem passa por antidoto do veneno da mandioca.

Urucurana. *Hieronima alchornoioides*. EUPHORBIACEAS.

Usos. Madeira de lei.

Urucurana do Minas. *Croton tilliaefolium*. Manso. EUPHORBIACEAS.

Usos. Purgativo brando.

Urneurana. Veja-se. Carrapicho.

Urucuuba. Veja-se. Urucu.

Urumbeba. Veja-se Jurumbeba.

Utuapoca. Veja-se. Marinhcero de folha larga.

Utuauba. Veja-se Jito.

Urupé. *Agaricus crispus*. Lacerda. Pará.

Usos. O pó é antiscrophuloso.

Uvaaya. Veja-se Uvalha.

Uvaça do campo Veja-se Ubacaba.

Uvalha. *Eugenia uvalha*. E. *campestris*. MYRTACEAS. S. Paulo.

Usos. Os fructos da Uvalha são doces e adstringentes e comestiveis.

Uvapurama. *Myrtus racemosa*. MYRTACEAS. Logares maritimos.

Usos. A raíz é diuretica e desobstruente a casca e as sementes febrifugas.

V.

Vampi. *Cockia punctuata*. Retz. AURANTIACEAS.

Usos. Fructos acidulos e comestiveis.

Vara-apiá. Veja-se Grãos de gallo.

Vareta. *Cipura*. Vel. *Cipella*. IRIDEAS.

Usos. Os mesmo do Maririçô.

Vassoura. *Sida carpinifolia*. MALVACEAS. Linneo. S. scoparia. Velloso. Rio de Janeiro.

Usos. Emollicente empregada em banhos em logar de malvas.

Vassourinha. *Scoparia dulcis*. Linneo. *Vandellia praten-*
sis. SCROPHULARINEAS.

Usos. Esta planta reúne qualidades adstringentes e mucilaginosas. Emprega-se como emolliente nos catarrhos pulmonares e em clysteres nas hemorrhoides. Ella regularisa o fluxo catamenial tomada na doze de 2 onças de seu succo (folhas) e tambem é calmante nas otites. No Perú os naturaes a preferem nas febres á quina. Serve este arbusto reunido em feixes para vassouras.

Velame do campo. *Croton campestris*. S. Hilaire. EUPHORBIAEAS. S. Paulo.

Usos. A raiz é purgativa e empregada em S. Paulo como antisyphilitico.

Velame do campo. Minas. *Croton fulvus*. Martius. EUPHORBIAEAS.

Usos. Os mesmos do Velame de S. Paulo.

Verbaseco. Veja-se *Barbasco*.

Vergamote. Especie de *Lima cmbiguda*.

Vetiver. *Andropogon muricatum*. GRAMINEAS.

Usos. Mui aromatico e como tal empregado.

Viba. Veja-se *Canna de Assucar*

Ucuiba. Veja-se *Bicuba*.

Vinagreira. E' o *Hibiscus besurcalus*.

Vinda eaa. *Catimbium nutans*. ZEZIMBERACEAS.

Usos. E' empregada em cozimento nas diarrheas, e os fructos são bons nas colicas.

Vinhatico. *Echinospermum*. ^{LAURINEAS.} *Leguminosae*

Usos. Madeira muito estimada para artefactos domesticos.

Violeta do Pará. *Sida repens*. MALVACEAS.

Usos. E' mucilaginosa e empregada em clysteres nos casos de hemorrhoides.

Virola. *Virola sebifera*. Aubl. E' a *Ucuiba*.

Visgueiro E' uma *Acacia* da familia das Leguminosas.

Usos. Fornece uma resina molle e glutinosa conhecida pelo nome de visgo.

Vuarame. *Helicteres brasiliensis*. H. isora. Velloso. STERCULIAEAS.

Usos. As flores são usadas nas anginas, em gargarejos.

Ha muitas especies de Vuarame.

Helicteres olvata Lamarck.

» *corylifolia* Ne s.

» *brevispira* S. Hilaire.

» *Vuarame* Martius &.

Vuba. *Gynerium saccharoides* Nees. *Arundo sagittaria*. Marc grave. GRAMINEAS.

Usos. O cozimento da raiz da Vuba é empregado contra a queda dos cabellos. A planta é sacarina mucilaginosa.

X.

Xeringueira no Para'. *Syphonia elastica*.

Xiriubeira. Veja-se *Herba Chumbo*.

Xiquixiqui. Espécie de Palmeira de que se faz cordas.

Xixi. *Jiluautea emetica*. LEGUMINOSAS.

Usos. A ceiva serve de verniz. A casca é resinosa, sabor amargo e adstringente forte, empregado como vomitivo.

Y.

Ybametara. Veja-se *Cajazeiro*.

Ybirarema. Veja-se *Ibirarema*.

Ybira-paye. Veja-se *Aguay*.

Yciy. Veja-se *Icicariba*.

Ycô. *Colicodendron ycô*. CAPPARIDEAS. Minas. Bahia e Pernambuco.

Usos. As folhas desta planta desenvolvem nos cavallos que a comem um meteorismo abdominal; excitão os intestinos e dão lugar a um estado de dysuria tal que os matão em pouco tempo. Segundo Martius o remedio contra esse estado é o oleo de ricino com sal da cozinha.

Ypadu'. *Erythroxylon coca*. Lamarck. ERYTHROXYLEAS. Malpighiaceas?

Usos. O pó das folhas actua sobre o systema nervoso. A infusão é excellente para matar a sede e mesmo a fome. Mascando-se as folhas obetem-se o mesmo effeito. Seu sabor é fracamente aromatico e os indigenas usão muito desta planta para fortalecel-os em seus trabalhos. Ha mais tres especies de Ypadú que são empregadas como adstringentes e contra as mordeduras das cobras. Os indigenas do Amazonas, seccão ao forno as folhas do Ypadú, reduzem-n'as a pó em um pilão apropriado, e misturando com um pouco de cinzas das folhas de *ambauba* e um pouco de tapioca trazem-no na bocca em vez de masca e o engolem depois de bem macerado.

Ypu' É o *Convolvulus operculatus* de Gomez.

Yquetala. *Scrophularia aquatica.* Marchand. SCROPHULARI-
NEAS.

Usos. Assegura-se que esta planta é um bom remédio nas apoplexias, pleurisas e febres intermitentes. Serve para tirar ao senne o cheiro nauseante.

Yto. Veja-se *Jito*

Yuca. *Yuca aromatica.* LILIACEAS.

Usos. Fornece uma resina analogo a *Elemi*.

Z.

Zaburro. Veja-se *Milho*.

Zambuciro. Especie de *Cidreira*.

MEMORIAL THERAPEUTICO.

Abcessos. Albara. Apostemeira. Araticum. Bananeira. Butua do corvo. Caité. Carrapateiro. Centeio. Cipó cururu. Cuité. Cujumary. Flor d'agua. Mamangá. Pão d'alho e os inumeraveis emollientes e excitantes descriptos.

Affecções broncho pulmonares. Abiu. Agrião. Al-cassus. Alecrim do mato. Algodoeiro. Almecegueira. Ambaiba. Apotiacoroa. Avença. Barbasco. Batata ingleza. Borracha. Caspeba. Cafezeiro. Camapú. Camará-tinga. Carana. Carrapicho. Casca preciosa. Castanheiro. Chá de frade. Cipó chumbo. Cupahiba. Cumandatiá. Douradinha. Figueira do inferno. Fumo. Guando. Guaxima. Guitti-turoba. Herva collegio. Herva do pai Caetano. Herva de vintem. Ibiracem. Ipecacuanha. Jararaca. Jaroba. Jatobá. Mangerona do campo. Matamatã. Morototo. Musgo. Orselia. Sambanbaia. Sapucaieiro. Tolanga. Turumá. Urucú. Vassourinha. &.

Affecções herpeticas. Algodoeiro. Agrião. Araticum. Araroba. Banancira de S. Thomé. Batata ingleza. Bucha. Buchinha. Caacimay. Cabacinho. Camarinhas. Camapú. Cipó suma. Douradinha. Espinha de carneiro. Fedegozo. Flor d'agua. Ibirarema. Jacarey-ataua. Jasmim de Italia. Japecanga. Jupiedi. Maracujá. Maravilha. Maririçô. Mayacá. Pajomarioba. Pão d'arco. Serralha. Tipi. Trapoeraba e outras plantas antisypthilicas.

Affecções syphiliticas. Acaya. Alcamphoreira. Alcornoco. Ambaiba. Argemoma. Braço de preguiça. Cainca. Caité. Cajamurú. Canna do brejo. Caroba. Carrapicho da calçada. Casco de cavallo. Cinco folhas. Cipó cm. Cupahiba. Douradinha. Espelina. Estoraque Gamelleira. Goajurú. Guando. Herva de bicho. Inimboja. Ipê. Japecanga. Joapitanga. Juricuara. Loco. Maleiteira. Manacá. Mangueira. Maracujá. Medicineiro. Munupiu. Mururê. Pacocaatinga. Pão d'arco. Pão carne. Pão de sassafrás. Parahiba. Piteira. Salsa do mato. Salsaparrilha. Salsa da praia. Saudades do brejo. Serralha. Turumá. Velame &.

Affecções do apparelho urinario. Aguaraquya-açú. Alcamphoreira. Alfavaca do campo. Bananeira do mato. Barba de boi. Beringella. Camapú. Capim catinga. Castanheiro. Conyza. Cordão de frade. Flór d'agua. Guabiropa. Guaiabipocaiba. Herva de bicho. Herva collegio. Herva moira. Herva pombinha. Ipê. Jaborandi. Jauna Juça. Juripeba. Lycopodio. Lirio. Mangerona do campo. Massambará. Mentrasto. Ortela do mato. Pajomarioba. Parietaria. Perrexil. Sapê. Sapote. Sapucaieiro. Sargaço. Trapoeraba &.

Amenorrhœa. Abacateiro. Açafroeiro. Algodoeiro. Baunilha. Bucha. Buchinha. Caneleira preta. Chá da terra. Cuiandatiá. Cumarú. Herva cidreira. Herva de S. Caetano. Hervinha de parida. Jararaca. Solidonia. Tiririca &.

Angina. Casca de paratudo. Cipó chumbo. Flor de pavão. Guaxima. Herva moira. Jaboticabeira. Jiquirioba. Língua de tucano. Malva do campo. Orelha de gato. Ortiga. Pimenta cumari. Potincoba. Tinhorão. Ucuuba. Unha de boi. Vuame &.

Aptas. Bananeira de S. Thomé. Cajueiro. Cunduá &.

Colica. Abacateiro. Algodoeiro. Bety. Bicuiba. Fumo. Gingibre. Guaraná. Ibirá. Mentrasto. Nhambi. Orelia. Ortelã do mato. Pacorá. Parreira brava. Quitoco. Sassafras &.

Coqueluche. Alfavaca do campo. Algodoeiro. Cafezeiro. Figueira do inferno. Ipecacuanha. Mamoeiro. Periparoba &.

Diarrhea & Dysentheria. Abricoteiro. Acaya. Acoita cavallo. Ambaiba. Amoreira de silva. Angico. Araticum. Azedinha do brejo. Baga da praia. Barbatimão. Buranhem. Cacaozeiro. Cagaiteira. Cajazeiro. Calumba. Calunga. Carqueja. Ginipapeiro. Guabirola. Guaiabeira. Guaraná. Herva andorinha. Herva de passarinho. Ipecacuanha. Mangueira. Marubá. Melambo. Nancibéa. Oiti. Pajurá. Panonarano. Pão cobra. Pichurim. Piranga. Raiz do padre. Salerma. Sacurá &.

Dispepsia. Bicuiba. Butua. Caapeba. Caferana. Calumba. Calunga. Caneleira preta. Cardamomo. Carqueja. Casca d'anta. Catinga de mulata. Centaurea. Chá da terra. Coração de Jesu. Coto-cotó. Cumariú. Fedegoso. Genciana. Gingibre. Guaraná. Herva de vintem. Ibirá. Jabotá. Larangeira do mato. Ocotea amargosa. Pacorá &.

Elephantiasis dos Arabes. Aguapé. Amor crescido. Cuité. Cafezeiro. Herva prelá. Jaborandi. Jiquitibá. Jumbéba. Língua de vacca. Mil homem. Malícia das mulheres. Marinheiro de folha larga. Pão Pereira. Picão da praia. Sayão etc. etc.

Elephantiasis dos Gregos. Assacú. Caavurana. Gigoga. Herva de S. Caetano. Inhame. Iapecauga. Jupiedí. Pateira. Queimadeira. etc. etc. etc.

Embaraço gastro intestinal. (Vomitivos e purgativos). Andaaçú. Batatá de purga. Caapiá. Cabello de negro. Cachim. Cana fistula. Capinchinguim. Carrapateiro. Caxa porra. Cerejeira de purga. Cipó de carijó. Cipó guyra. Coral. Guardiã. Ipecacuanha. Itou-bu'. Jalapa. Jalapinha. Jencucu'. Jito. Loco. Pão balla. Pão carno. Penva. Pinhão de purga. Piretro. Purgas (diversas especies). Tayuja. (diversas especies.) etc. etc.

Empigem. Azedinha. Camandauassu'. Fedegoso. Jasmim de Italia. Mariricó. Pajomarioba. Piranga. Piretro. Trapoeraba etc. etc.

Escorbuto. Agrião. Azedinha. Chagas miudas. Genipapeiro. Jauna. Mastruço. Silva. Trifolio. etc. etc.

Escrophulas. Fumo. Ortiga. Juquiri. Lingoa de vacca. Paupeira. Sebipira. etc. etc.

Febres. Ambuiaembo. Apogitagoara. Arroz. Avaramo. Bau-nilha da Bahia. Caa-ataya. Cafezeiro. Calunga. Calumba. Camari-nhas. Canambaya. Coneleira branca. Canudo de pita. Carqueja. Cas-ca de laranjeira da terra. Casca de paratudo. Coentrilho. Comanda-hyba. Coração de Jesu. Cruá. Cuité. Cumbeba. Cupuassu. Eoare-te seu. Figueira da barbaria. Flór de babeiro. Flor de paixão. Fru-cteira de burro. Fumo bravo. Gervão. Grama da praia. Herva de co-bra. Imbuzeiro. Juquirionano. Laranjeira do mato. Marinheiro de folha miuda. Marubá. Melambo. Merurana. Mil homem. Ombu'. Orelha de onça. Pacari. Pão d'arco. Pão cobra. Pão de colher. Pão Pereira. Picão da praia. Quinas. (diversas especies). Raiz do padre Salerma. Sete sangrias. Tiborna. etc. etc.

Gangrena. Ambuia-embo. Aninga d'agoa. Mil homem etc.

Hemleranea. Algodoeiro. Cuité. Lingoa de vacca. Mei-mendo. Sayão. etc. etc.

Hemorrhagia. Acaju'cica. Angico. Barbatimão. Buranhem. Cipó carneiro. Curucu'. Embeguaca. Fumo. Ortiga. Jiquitibá. Mas-truço. Perdicium. Rabo de bugio. etc. etc.

Hemorroides. Aguapé. Amongeaba. Assa peixe. Babosa. Barba de velho. Barbasco. Beldroega. Caamembeca. Cacaozeiro. Carrapateiro. Caavurana. Herva Andornha. Herva de bicho. Mara-cujá micum. Maririçó. Meruá. Panduarana. Pão d'alho. Trapoera-ba. Vassourinha. Violeta do Pará. etc. etc.

Hernia. Barbatimão. Barba de velho. Cuité. Herva do pantano. Juquiri. Pão de colher etc.

Hydropesia. Abobreira do mato. Alcornoco. Auinga. Bu-cha. Buchinha. Cainca. Calumba. Calunga Caninana. Carrapicho do sertão. Gamelleira. Gervão. Gilbarreira. Guaiambê. Ibirarema. Mara-vilha. Marinheiro de folha larga. Nancibea Parreira brava. Tety-po-teira &.

Leucorrhœa. Acaya. Açoita cavallo. Ambaiba. Baga da praia. Bananeira de S Thomé. Barbatimão. Buranhem. Casca d'anta. Con-trayerva. Estoraque. Guajurú. Guabirola. Herva de S. Caetano. Ipê. Jiquitibá. Juquiri. Maravilha. Marubá. Ortiga. Parreira brava. Pi-churim. etc.

Mordedura de cobra. Ayapana. Alcamphoreira. Alecrim bravo. Algodoeiro. Ambuiaembo. Butua miuda. Caa-cica. Contrayerva. Guaco. Herva da cobra. Herva de Santa Anna. Jararaca. Nhandroba.

N. B.

Sendo applicaveis quer medica quer hygienicamente em muitas occasiões as preparações a que se prestão muitos de nossos vegetaes, as apontamos no corpo deste pequeno dictionario, que apenas contém 1743 plantas.

No memorial therapeutico indicamos uma pequena fracção dos vegetaes conhecidos, para mostrar tão sómente a vastidão da nossa materia medica.

Uma ou outra repetição nos escapou, e além das erratas que apresentamos emendadas, alguns erros typographicos se encontrarão, os quaes o criterio do leitor corrigirá.



CORRIGENDAS.

Página	1	atribue	attribuem
	6	Trianospermia	Trianosperma
	7	venulosas	venulosa
	8	Dunael	Dunal
	9	Boccharis	Baccharis
	10	Hediwigea	Hedwigea
	11	Austoloecheas	Aristoloecheas
	12	Geoffra	Geoffroya
	17	Arvideas	Aroideas
	18	ulmesolia	ulmifolia
	23	arthiristicos	arthriticos.
	29	Simabo	Simaba.
	30	Vesbenacers	Verbenaceas.
	34	S. Hilari	S. Hilaire
	37	inermes	inermis
	»	Hibsicus	Hibiscus.
	38	Stachsy	Stachys.
	39	Grameneas	Gramineas.
	48	Attalea	Attalea
	50	Pheocorpa	Pheocarpa
	59	febrifugo	febrifuga
	61	Guapurongo	Guapuronga
	68	Alcamphor	Alcamphora
	74	Prychotria	Psychotria
	86	leucodenaron	leucodendron
	99	Cagteas	Cacteas.
	103	Laurimbas	Laurineas
	111	Centrospermuna	Centrospermum
	127	precatorio	precatorius
	139		Suprima-se a 1. ^a e 2. ^a linha.
	130	olvata	ovata.

SUPPLEMENTO

AO

Diccionario de Plantas Medicinaes Brasileiras

PELO

Dr. Nicoláo Joaquim Moreira



RIO DE JANEIRO

TYPOGRAPHIA.—RUA DE GONÇALVES DIAS N. 33.

1871

Àa Illm. Sr.

DR. LADISLÁO NETTO

Director da secção de Botanica do Museu Nacional.

Não me conhecia V. S., quando em França teve a bondade de animar-me nestes estudos com as benévolas palavras que distribuiu ao meu *Diccionario de Plantas Medicinaes Brasileiras*, e, pois, para que V. S. não me acredite esquecido, tomo a liberdade de escrever seu illustre nome na primeira pagina deste trabalho.

20 de Setembro de 1871.

DR. NICOLÃO J. MOREIRA.

A QUEM LER.

Não é o interesse que nos leva á publicação deste segundo estudo de nossas plantas medicinaes, pois que todos sabem que trabalhos desta especie são votados a apodrecerem nas livrarias.

O unico movel que actua em nosso espirito é a idéa fixa e tenaz de procurar fazer sobresahir os grandiosos recursos da materia medica brasileira, mostrando a necessidade de irmos substituindo as substancias exoticas que nos chegam quasi sempre deterioradas pelas indigenas, e neste sentido invocamos as intelligencias amestradas nesta sorte de estudos a fazerem o que a nossa mediocridade não nos permite.

A acção medicamentosa que attribuímos a cada uma das plantas deste supplemento acha-se garantida por minuciosas indagações, e debaixo do ponto de vista da synonymia, quem consultar este trabalho hade reconhecer que alguma coisa fizemos, sacudindo o pó das diversas bibliothecas e livrarias desta cidade e importunando os amigos que julgavamos habilitados a informar-nos em taes materias.

Aos criticos toda a obdiencia.

Aos maitacas — completa indifferença.

N. J. M.

SUPPLEMENTO

AO

Diccionario de Plantas Medicinaes Brazileiras

A

Abatiopé. Veja-se *Abatuy*.

Abatuy. Segundo alguns authores é uma especie de milho minto; na opinião de Martius é o arrôz lusitano, *oryza sativa*.

Abajeru. *Moquilea canomensis*. Mart. Chrysobalanaceas.

Uzos. Os do *Guarjurú*.

Abi. Veja-se *Abiu*.

Abi-iba. Veja-se *Abiu*.

Abiu. *Lucuma caimito*. *Labatia reticulata*, Mart. Sapotaceas Pará.)

Uzos. Os fructos são assucarados e gommozos e empregados nas affecções pulmonares.

Abiu-rana. *Lucuma lasiocarpa*. Sapotaceas. (Pará e Amazonas.)

Uzos Os mesmos do *Abieiro*, não sendo os fructos, porém, tão agradaveis. O *Abiu-rana* (*abiu spuria*) fornece uma optima madeira.

Abiu-sylvestre. Veja-se *Abiu-rana*.

Acacia. Genero das Leguminosas. Das especies brasileiras as mais importantes são : *A. angico*. *A. jurema*. *A. pharnesiæna*.

Açafrão. Veja-se *Cangerana Miuda*.

Açafroeira. *Nyctanthus arbor tristis*. Jasminaceas.

Uzos. As flores desta planta abrem-se á noite, e, alem de fornecerem oleo aromatico excellente, dão uma materia corante amarellada.

Acaiaca. *Cedro Brasilense*. Lauraceas.

Acaia-catinga. E' uma *Terebinthinacea*.

Acajavana Veja-se *Fel da Terra*.

Acaju-iba Veja-se *Cajueiro*.

Acajú-mirim. *Anacardium humile*. Anacardiaceas. (S. Paulo, Minas, Norte.)

Acajú-y. Veja-se *Acajú-mirim*.

Acanthospermum. Genero das Compostas. Entre as especies brasileiras notão-se. *A. hirsutum*. *A. xanthioides*.

Acapóra. *Sambucus australis*. Cham. Caprifoliaceas. (S. Paulo).

E' na opinião de Martius o *sabugueiro lusitano*.

Acapú. *Andira Aubletii*. Leguminosas.

Acapu-rana. *Wulschagelia*. Mart. Rutaceas.

Uzos. Emprega-se como amarga-aromatica.

Acariçoba. E' conhecida em algumas localidades pelo nome de — *herva do capitão*.

Acauan-caa. E' o *Guaco* no Amazonas.

Achiat. Veja-se *Urucú*.

Achiot. Veja-se *Urucú*.

Achira-mourou. *Cordia nodosa*. Cordiaceas. (Pará).

Uzos. Fructos comestiveis.

Achit. *Cissus*. Ampelideaceas.

Açucena do Brejo. E' o *Assa peixe*.

Agoniada. *Plumeria lancifolia*. Mart. Apocynaceas. (Canta-gallo).

Uzos. Acasca e o succo são causticos e purgativos.

Aguaraciunha. Veja-se *Jacucanga*.

Aguara-ciunhaaçu. E' a *Crista de gallo*.

Aguara-ponda. *Stachytarpha dicotoma*. Vahl. Verbenaceas.

Uzos. Empregão as folhas torradas como succedaneas do chá da India. O succo das folhas é laxativo na doze de 2 colheres para as creanças.

Aguara-quiyá. E' segundo Martius a *Pimenta de gallinha* dos Portuguezes.

Aguaribay. *Croton*? Euphorbiaceas.

Agutigupo-obi.—*Thalia*. Linn: *Maranta*. Mart.

Ahouay. *Cerbera Manghas*. Apocynaceas.

Uzos. As sementes são emeticas e toxicas; a seiva lactescente purgativa e as folhas e cascas succedaneas do senne.

Aja-rana. Indeterminada. (Pará).

Uzos. Arvore fornecendo boa madeira de construcção.

Ajeurana. *Grangeria*. Rosaceas.

Uzos. Comestível.

Ajuba. Segundo Martius é o *Louro lusitano*.

Ajuga. Veja-se *Lingua de boi*.

Alecrim do Pará. Veja-se *Perrexil*.

Alecrim das paredes. *Conyza alopecuroides*. Lam. Compostas.

Uzos. A raiz é diuretica e lithontriptica.

Alecrim selvagem. Veja-se *Herba santa*.

Algodoeiro Bravo. *Hibiscus bifurcatus*. Lacerda. Malvaceas. (Ceará.)

Uzos. A casca é empregada como emetica; as folhas comem-se fazendo-se primeiramente ferver n'agua para largarem os espinhos.

Allamanda. *Allamanda Aubl. Orelia grandiflora*. Apocynaceas. (Norte.)

Planta suspeita. Em doze regular pode ser applicada como excellente purgativo nas colicas dos pintores.

Amandurana. Veja-se *Algodoeiro bravo*.

Amaniu. Veja-se *Algodoeiro*.

Aminiu. Veja-se *Algodoeiro*.

Amaré. *Metrodorea excelsa*. F. Allemão. Rutaceas.

Uzos. Emprega-se a casca como anti-febril.

Amari. Veja-se *Amaré*.

Amary. Veja-se *Amaré*.

Amaytin. *Porouma bicolor*. Artocarpaceas.

Uzos. Os fructos são acidos e mucilaginosos, devendo melhorar pela cultura.

Ambaiba. *Cecropia peltata*. Artocarpaceas.

Uzos. O succo extrahido dos grelos e misturado com leite ou cozimento de cevada assucarado é util nas diarrheas, gonorrheas, leucorrheas e menstruação copiosa. A massa do interior do tronco é empregada nas ulceras cancerosas. O xarope preparado com o leite da—*Ambaiba branca*—é de grande proveito na phthisica pulmonar. A agua obtida da raiz por meio de incisões convem nas dores de peito. O miolo dos olhos da planta socado com folhas de urtiga é po-

deroso anti-hemoptico. A casca da arvore goza de propriedades adstringentes e é empregada nas diarrehas e fluxos mucosos.

Ambapaya. Veja-se *Mamoeiro*.

Ambay. Veja-se *Ambaiba*.

Ambaya-embo. *Aristolochia labiosa*, Aristolochaceas.

Uzos Os mesmos do Milhomem.

Existem ainda as especies : *A. humicifolia* . *A. theriaca* . *A. anti-hysterica* e *braziliensis*.

Ambrosia. *Ambrine ambrosioides*, Chenopodiaceas.

Uzos. Carminativa, sudorifica e emenagoga.

Amburarembo. Veja-se *Ambaya-embo*.

Ambu-y. Dão em Minas este nome ao espinheiro de ameixas. *Ximenia americana*.

Ameiju. *Anona erythrocarpa*, Anonaceas.

Amendoi-rana. Veja-se *Alcerim bravo*.

Ameixeira preta. *Prunus paranaensis*, Amygdaleaceas.

Uzos. Os fructos são acidulos e refrigerantes.

Amendoa brava. *Cerasus brasiliensis*, Rosaceas. (Rio de Janeiro. (Ceará.)

Uzos. Acção toxica, hyposthenica.

Amor do campo. *Zornia*, Leguminosas.

Uzos. Emproga-se nas urinas leitosas.

Amoreira de Silva. *Rubus brasiliensis*, Mart. Rosaceas.

Uzos. Emprega-se nos mesmos casos em que são uteis as amoras. Em jejum suspende a diarreia de sangue.

Amoreira do mato. *Brosimum*, Artocarpoaceas. (Ceará.)

Anacôdo. *Robinia panacoco*, Aubl. *Swartzia tomentosa*, Leguminosas. (Norte).

Uzos. A casca é um poderoso sudorifico.

Ananaz de agulha. *Bromelia muricata*, Bromeliaceas.

Uzos. O fructo é comestivel e produz todos os effeitos do *Ananassa sativa*.

Ananím. Veja-se *Oanani*.

Anario. *Convolvulus*, Convolvulaceas. (Ceará.)

Uzos. A batata é comestivel, porem depois da reiterada lavagem de modo a extrahir-lhe a parte nociva.

Andira ibiatiaribá. *Andira rosea*, Leguminosas.

Andiroba. *Carapa guyanensis*. Aubl. *Xilocarpus carapa* Spreng. Meliaceas. (Norte.)

Uzos. O oleo é empregado externamente nas hepatites e splenites; nas feridas e no tétano. Dá excellente luz e delle se faz sabão. Obtem-se dos fructos por expressão ou decocção. O fructo é comestivel e anti-helminthico. O cosimento da casca é anti-febril.

Andura-obaja-mirim. Veja-se *Angelica*.

Angali. Veja-se *Andira*.

Anga-iba-atan. Veja-se *Arvore de Ombella*.

Angelica brava. *Guettarda-angelica*. Mart. Cinchonaceas.

Uzos. Raiz acre, aromatica, e empregada pelos veterinarios como vulneraria, adstringente e febrifuga.

Angelica de rama *Schubertia multiflora*. Mart. Asclepiadaceas. (Ceará.)

Uzos. Emprega-se como aromatica; toxica para os cães.

Angelico. *Aristolochia*. Aristolochaceas. (Ceará.)

Uzos. Empregada como tonica nas febres graves e catharros.

Angelim Amargoso. *Andira anthelmintica*. Benth. Leguminosas.

Uzos. Asamendoas ingeridas em quantidade podem envenenar produzindo o narcotismo.

Anguhybatan. Veja-se *Inhuhybatan*.

Anguhybatan. E' em certas localidades a *canella brava*.

Anhoatiba. No Espirito Santo dá-se este nome á *canella*,

Anhuhyba. Veja-se *Anhoatiba*.

Anhu-yba-peabya. Especie de *Sassafras*.

Anil. E' no extremo Norte a *Arruda brava*.

Anil-açu. *Eupatorium*. Compostas. (Ceará.)

Uzos. Emprega-se nas contusões e mordeduras de cobras.

Anil Bravo. *Thephrosia toxicaria*. Leguminosas. (Norte.)

Uzos. Basta lançar ao rio alguns ramos munidos de folhas de *Thephrosia* para que os peixes venhão á tona d'agua entorpecidos. A tinctura da *Thephrosia* tem propriedades diaphoreticas e narcoticas, podendo mesmo envenenar. Este vegetal fornece uma bella tinta azul.

A *Thephrosia purpurea* é util nas dyspepsias.

Anil Miudo. Veja-se *Caa-chira*. (Raiz desobstruente.)

Apareiba. Veja-se *Mangue Vermelho*.

Apé. *Bombea elegans*. Aroideas. (Pará e Maranhão.)

Uzos. Tem um sabor doce porém pruriginoso. E' pouco empregada.

Apé-iba. Veja-se *Jangadeira*.

Aplhi. No Pará é uma *Dorstenia*.

Apiy. *Picus*. Urticaceas. Lacerda. (Pará, Amazonas).

Uzos. O succo leitoso e as folhas são calmantes, anti-febris e expectorantes.

Apotyacorara..... Euphorbiacea. (Pará).

Uzos. Existem duas especies, a 1ª emprega-se em forma de cozimento nas tosses seccas e a 2ª é anti-ophthalmica.

Araçazeiro Cagão. *Psidium rusccens*.

“ **Felpudo.** *Psidium incanescens*.

“ **de Pedra.** *Psidium petreum*.

“ **de Pernambuco.** *Psidium pubescens*.

“ **da Praia.** *Psidium albrotum*.

“ **de S. Paulo.** *Psidium incanescens*.

“ **de Tingutjar.** *Diospyros*. Ebenaceas. (Ceará.)

} MIRTACEAS.

Uzos. Emprega-se como ichthyotoxico.

Arapoca, Golipca. Rutaceas.

Uzos. E' um bom febrifugo, e emprega-se para tinguljar o peixe.

Araracanga. *Aspidosperma*. Apocynaceas.

Araruta. *Maranta arundinacea*. Linn. Marantaceas.

Uzos. A araruta conhecida dos nossos indigenas pelo nome de *—agoutiguepe—* fornece uma optima fecula comestivel. O succo da planta é acre; no estado fresco rubefaz a pelle e mascando-se as folhas provoca-se uma copiosa salivação. Acreditão os indigenas que a fecula da araruta cura as feridas feitas por settas hervadas.

Araticum Alagadlço. Veja-se *Araticum do rio*.

Araticum-paná. *Anona palustris*. Linn. Mart. Anonaceas.

Uzos. Emprega-se como anthelmintico. Na opinião do Sr. Dr. Capanema o succo da planta pode cegar. Muitos praticos a consideram venenosa.

Araticum-pitaya. *Anona squamosa* ? Vell. Anonaccas.

Uzos. O pó dos grclos é optimo remedio para os piolhos. Veja-se *Atta*.

Areá. Salepo brasiliensc. (Pará.)

Aristolochia. E' um dos importantes generos das Aristolochiaceas.

Uzos. As plantas deste genero são quasi todas tonicas, estimulantes e uteis nos ultimos periodos das febres lentas. Empregão-se tambem nos cazos de amenorrheas e como sudorifico. Entre as especies brasileiras predominão—*acymbifera*, *labiosa*, *ringens*, *galeata macroura*, cujas raizes são aromaticas porém desagradaveis, de gosto acre e forte.

Arnotte. Veja-se *Urucú*.

Aroeira. *Schinus aroeira*. Vell. Anacardeaceas.

Uzos. A casca da aroeira é adstringente e empregada pelos pescadores para fortalecer os fios das redes. Seu extracto pode substituir o do cato. Alguns a considerão anti-febril, sendo certa sua efficacia nas hemorrhagias passivas. De suas folhas frescas extrahese uma agua por distillação apropriada ao toilette. Os nossos indios empregão o succo contra a ophtalmia. Não está provado que o dormir sob a sombra da *arvore* dê efficaz resultado a tumefacção de pelle como diz S. Hillaire. A doze do extracto em pillulas é de 2 a 4 grãos e a da casca em cozimento de 2 oitavas para 1 libra de agua.

Aroeira do Ceará. *Myracrodion urundeuva* F. Allemão (Ceará.)

Uzos. Os mesmos da *Aroeira*.

Aroeira do Rio Grande do Sul. *Schinus-anti-arthritis*. Anacardeaceas.

Uzos. O succo balsamico desta planta é anti-arthritico ; o cozimento das folhas é util nas ulceras atonicas ; a agua distillada das folhas e fructas é empregada na polyuria.

Arradiabo. Veja-se *Queimadeira*.

Arraté. *Copaifera pubiflora* Linal. Leguminosas.

Arrebenta Cavallo. *Solanum arrebenta*. Solanaceas.

Uzos. O cozimento é empregado em banhos contra os tuberculos mezenthericos.

Arruda Brava. *Kaonophyllum tinctorum*. Synanthereas. (Norte.)

Uzos. Acção toxica.

Arruda do Mato. *Pilocarpus officinalis*. Aubl. Rutaceas Mart.

Uzos. Aromatica, excitante e tonica.

Arvoeiro. E' nas Alagoas o *Abrus precatorius*.

Arvore da Morte. Veja-se *Mancenilha*.

Arvore de Tucano, Veja-se *Turuma*.

Arvore da vacca, Veja-se *Massaranduba*.

Assacú-mirim. E' nas Alagoas o *Abrus precatorius*.

Assa Peixe. *Bohemeria caudata*, Urticaceas.

Uzos. Emprega-se em banhos nos ataques hemorrhoidarios e como diuretica, na dóse de 1/2 oitava para uma libra d'agua em cozimento. O succo das folhas (novas) aromaticas e leitosas são uteis como collyrios. A raiz é aperiente e depurativa.

Assa Peixe Branca. O succo das folhas contundidas e misturadas com duas claras d'ovos e duas colheres de vinagre e assucar serve para clysteres, nas febres malignas.

Atoló. Veja-se *Urucú*.

Atta. *Anona squamosa*, Anonaceas.

Uzos. As folhas tem um aroma desagradavel avinagrado, os grãos da fructa são acres, e reduzidos a pó matão os piolhos da cabeça. O fructo é delicioso.

Atta. E' no Ceará a Pinha da Bahia e a *Fructa de Conde* do Rio de Janeiro.

Avencão. *Acrosticum aureum*, Filiaceas.

Uzos. Emprega-se como expectorante.

Axi. Veja-se *Pimenta*.

Ayapana cotonosa. *Euphorbia cotinifolia*, Linn. Euphorbiaceas.

Uzos. Ichtyiotoxicas.

Azedinha do Ourives. Veja-se *Azedinha do Brejo*.

Ayou. *Nectandra pisi*, Miq. Lauraceas.

Uzos. Emprega-se como aromatica e tonica.

B

Bacamichú. *Bumelia*, Sapotaceas. (Ceará).

Uzos. A casca é amargosa, adstringente e febrifuga.

Bacopari. *Platonia insignis*, Clusiaceas. (Ceará).

Bacoropari. *Moronobea esculenta*, Arr. Canellaceas.

Uzos. Os do *Bacori*.

Bagre. E' um *Machcerium* no Rio de Janeiro. Outros dão este appellido á *Merendiba*.

Bainha de Espada. *Acanthinophyllum strepitans*. Artocarpaceas.

Balata. *Couratari estrellensis*. Raddi. Lecythidaceas.

Uzos. Os mesmos, pouco mais ou menos, do *Sapucayeiro*.

Balsamona. *Cuphea balsamona*. Lythreaceas.

Uzos. Empregada como aperitiva e fundente, tirando-se tambem vantagem, nos casos de febres intermittentes.

Bamborral. Veja-se *Herba de Santa Maria*.

Barbas de Bode. *Trapogon pratense*. Chicoraceas.

Uzos. E' util nos casos que reclamão os estomachicos, aperitivos e vulnerarios.

Barbas de Cabra. *Spiræa aruncus*. Rosaceas.

Uzos. Emprega-se como adstringente, tonica e febrifuga.

Barbas de Camarão. *Sthrychnos*. Loganiaceas. (Ceará.)

Uzos. As sementes e as raizes são venenosas.

Barbas de S. Pedro. *Polygala fluminensis*. Polygalaceas.

Uzos. Expectorante.

Barbasco. *Jacquinia armillaris*. Linn. Myrcinaceas. (Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo.)

Uzos. E' ichthyotoxica e venenosa para alguns animaes.

Barbatimão. *Shyphnodendron barbatimão*. Leguminosas.

Uzos. Alem das propriedades apontadas no Diccionario as sementes desta planta são venenosas.

Barberina Tetrandra. Simplicaceas. (Minas.)

Uzos. A casca da raiz é amarga ligeiramente adstringente e mucilaginoso. Emprega-se nas febres intermittentes.

Baririçô. Veja-se *Mareriçô*.

Baririçô do Campo. Veja-se *Batatinha do campo*.

Batata do Ar. Veja-se *Batata brava*.

Batata Brava. *Cocculus cinerascens*. Menispermaceas.

Uzos. A raiz é tónica, desobstruente e febrifuga. A fecula é adstringente. Serve para tingir de preto.

Batata Doce. *Convolvulus edulis*. Convolvulaceas.

Uzos. Os fructos são comestiveis e fornecem uma fecula nutritiva como a do arrôz. Das folhas faz-se um extracto util nos rheumatismos.

Batata do Enfleira. *Convolvulus*. Convolvulaceas. (Ceará.)

Batata de Purga. *Ipomoea altissima*. Mart. Convolvulaceas.
(Ceará.)

Uzos. Raiz drastica.

Batata da Terra. Veja-se *Batata doce*.

Batatinha. *Cypella*. Veja-se o Diccionario.

Batatinha do Campo. *Morca aphylla*. Manso. (Minas.)

Uzos. Os do Maririçô.

Batinga. *Gymnanthes*.

Batiputá. *Gomphia hexasperma*. Ochnaceas. (Ceará.)

Uzos. Empregão-se os fructos contundidos nos tumores articulares. Fornece azeite que serve para condimento.

Bauba. Veja-se *Ambauva*.

Bauna. *Cardiospermum*. Sapindaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. As folhas preparadas em xarope são preconisadas na coqueluche.

Beery. Veja-se *Mbeery*.

Beijos de Frade. *Impatiens*. Balsaminaceas.

Uzos. A agua distillada desta planta tomada em grande abundancia provoca a diabetes.

Bellas Noites. Veja-se *Maravilhas*.

Bery. Veja-se *Imbiri*.

Betonica. *Hyptis*. Labiadas. (Alagôas.)

Uzos. Empregada em banhos nas molestias uterinas.

Bexuquillo. Veja-se *Poaia*.

Bico de Corvo. Veja-se *Alcassus bravo*.

Bicuiba de Folha miuda. *Myristica bicuiba*. Schott. Myristaceas.

Biculbuçú. Veja-se *Bicuiba*.

Bilros. *Alstroemeria pelegrina*. Amaryllidaceas.

Uzos. A raiz fornece fecula.

Bilros. No Ceará é um *Erythroxylum*.

Biru'. Veja-se *Imbiri*.

Bocaua. Veja-se *Bicuiba*.

Boia-cáa. Veja-se *Paracary*.

Boia-cica. Veja-se *Paracary*.

Bolsa de Pastor. *Zeyheria montana*. Mart. Bignoniaceas.
(Minas e S. Paulo.)

Uzos. A casca é anti-syphilitica, bebida em infusão a frio.

Borbo. Veja-se *Rabo de tatu*.

Bordão de Velho. Indeterminada. (Alagóas.)

Uzos. Empregada como anti-ophthalmica. A raspa da madeira é aperitiva, diuretica e anti-dartrosa.

Bordão de Velho. E' no Ceará a *Gaipocaiba*.

Brandão. Indeterminada. (Ceará)

Uzos. Empregada como anti-syphilitica em clysteres somente.

Brincos. *Sthrukeria*. Vell. Vochysiaceas.

Uzos. Emprega-se contra a diarrhéa.

Broma. Indeterminada. (Alagóas.)

Uzos. Empregada como depurativa.

Bucho de Rã. Veja-se *Camapú*.

Bucutá. *Aspidosperma excelsum*. Benth. Apocynaceas.

Arvore notavel pelo seu tronco cannellado parecendo composto por muitos troncos. Em sua base nascem ramos lateraes, tubulosos apresentando grandes cavidades e que os indios aproveitão para seus domicilios.

Bugi. *Combretum*. S. Hil. Combretaceas. (Minas, Goyaz e Bahia.)

Uzos. A casca é adstringente, e obtem-se desta arvore uma rezina apropriada á confecção de velas.

Bumelia. Genero das sapotaceas.

D'entre as mais importantes especies sobresaem : a *nigra*, a *lycioides*, a *retusa*, e a *graveolens*. A primeira de casca amarga e febrifuga ; a segunda, de fructo aspero ligeiramente adocicado e util nas diarrheas ; a terceira, de fructo leitoso, a quarta de um cheiro mui desagradavel.

Buricica. Lauraceas. (Bahia.)

Burruen. *Brosimum*. Mart. *Piratinera*. Aubl. Artocarpaceas. (Minas e Bahia.)

Uzos. Fornece por meio de incisões um succo leitoso nutritivo de que os indios se utilisão.

Querem alguns observadores que esta arvore seja o *Páo de letras* ou *Páo serpente*.

Butinha. *Aristolochia grandiflora*. Aristolochiaceas. (S. Paulo e Minas.)

Byrsonima. Genero das Malpighiaceas.

Encerra este genero as especies: *laurifolia*, *rhopalæfolia* *cocco-*

lobaeifolia, productoras da casca conhecida nas pharmacias com o nome de Alcornoco o que tão util parece ser na phtysica pulmonar.

C

Caa-apia. Veja-se *Contrayerva*.

Caa-atia. Veja-se *Herva de Santa Luzia*.

Caa-co. Veja-se *Malicia das mulheres*.

Caa-jassa. Veja-se *Tamcorana*.

Caa-mendã. Veja-se *Flôr de casamento*.

Caa-mirim. Veja-se *Maté*.

Caa-opia. Veja-se *Pão de lacre*.

Caa-peba. *Cissampelos glaberrima*. Menispermaceas.

Maregrave dá-lhe o nome de cipó de cobra.

Caa-peua. Veja-se *Cuapcha*.

Caa-pim. Veja-se *Capim*.

Caa-pim-peba. Veja-se *Sapé*.

Caapororooa. *Myrsina*. Myrsinaceas.

Uzos. Emprega-se em banhos contra as affecções cutaneas.

Caa-puçá. Veja-se *Camapil*.

Caa-roba. Veja-se *Caroba*.

Caa-taya. Veja-se *Herva de bicho*.

Caa-taya. Veja-se *Purga de João Paes*.

Caa-quera. E' a *Dormideira*. Tambem se dá este nome a *Cassia sericia*.

Caa-teninga. Veja-se *Mata-pasto*.

Caa-tia. Veja-se *Herva de S. Luzia*.

Caá-tigoa. *Trichilia catigoa*. S. Hil. Meliaceas.

Uzos. Emprega-se exteriormente nos rheumatismos. Esta planta dá ao couro uma bella côr amarella.

Caa-xio. Lauraceas. (Norte.)

Uzos. Util na asthina, como aromatica e excitante.

Caa-yby. E' o Anil.

Cabeça de Frado. Veja-se *Mucundá*.

Cabollo de Negro. *Cynarus suberosus*. Compostas.

Cabeçalhos de S. João.

Uzos. Emprega-se a casca da raiz em poções ou clysters nas obstrucções, febres e asthma.

Cabiuna. *Miscobium violaceum*. Leguminosas.

Cabuy. *Schinus roifolius*. Anacardiaceas.

Uzos. Pouco mais ou menos os da *Aroeira*.

Cachim. E' em S. Paulo o *Mata-olho*.

Caeté. Veja-se *Imbiri*.

Café do Mato. Veja-se *Lixa*.

Caiaué. *Elais melanococca*. Veja-se *Coqueiros*.

Caimito. *Chrysophyllum caimito*. Sapotaceas.

Uzos. Os do *cambucazeiro*.

Caioitiá. Veja-se *Caa-cica*.

Caipunga. E' no Pará a *Coerana* da Bahia.

Caubim. (Alagóas.)

Uzos. A casca e a raiz são purgativas. Emprega-se em pequenas dozes no rheumatismo e na syphilis.

Cajarana. ou **Cangerana.** Meliaceas.

Uzos. Emprega-se a raiz em cozimento ou xarope, e em tinctura ou extracto contra as sezões e febres catarrhaes.

Cajavana. *Spondias tuberosa*. Anacardiaceas. (Ceará.)

Uzos. O cozimento dos fructos é muito util nas febres inflammatorias.

Cajueiro Bravo da Serra. E' uma *Curatella*.

Uzos. A casca da raiz é um energico aperiente.

Cajueiro Bravo da Serra. E' a *Jeritacaca* que no Ceará é uma *Rhopala*.

Calumba Brasileira. Veja-se *Cajarana*.

Calunga. *Aristolochia bilobata*. Mart. Aristolochiaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Emprega-se como abortiva.

Camará Cidrilha. Veja-se *Herva cidreira* do Ceará.

Camará de Leite. *Borrchia*. Compostas. (Ceará.)

Uzos. Fornece um succo leitoso.

Camara-juba Amarella. *Lantana aculeata*. Verbenaceas.

Uzos. Emprega-se contra a tosse e o rheumatismo.

Camarú. Veja-se *Jóa de Capote*.

Camassum. (Alagóas.)

Uzos. Emprega-se nas colicas flatulentas.

Cambuy. *Myrciaria, Eugenia crenata*. Mart. Myrtaceas.

Uzos. Os fructos são conestiveis. A casca da planta e das folhas ligeiramente adstringentes.

Campainha. *Abutilon speciosa*. Malvaceas.

Uzos. Emolliente.

Cananga. *Myristica macrophylla*. Myristaceas. (Amazonas.)

Uzos. Emprega-se no rheumatismo.

Cangabá. Veja-se *Manacá*.

Canella do Cheiro. *Oreodaphne*. Lauraceas.

Uzos. O oleo extrahido da casca deste vegetal é empregado contra o rheumatismo.

Canema. Veja-se *Coerana*.

Cangambó. Veja-se *Manacá*.

Cangerana Miuda. *Guarea trichlioides*. Vell. (Rio de Janeiro).

Uzos. Fornece um oleo aromático assaz agradável e proprio á perfumaria.

Canguá. Veja-se *Cipó de gota*.

Caninana. No Ceará é uma *Cassia*.

Canjarana-açú. Veja-se *Marinheiro de folha larga*. (Guarea.)

Canna. Genero das Marantaceas.

Entre as especies brasileiras notão-se a *aurantiaca*, *glaucae* indica. Os tuberculos de todas são diureticos.

Canna do Brejo Roxa. *Alpinia spiralis*. Costus. Amomaceas.

Uzos. Os caules são diureticos; as folhas aquecidas e applicadas sobre os enfartes ganglionares os resolvem.

Canna Marona. *Caladium seguinum*. Araceas.

Uzos. O succo deste vegetal é acre e corrosivo. 2 oitavas podem matar.

Canoés. *Avicenia tomentosa*. Verbenaceas. (Ceará, Pará.)

Uzos. Empregado como aromático, diaphoretico e aphrodisiaco.

Canudo de Purga. *Rauwolfia canescens*. Welld. Apocynaceas. (Norte.)

Uzos. A raiz é emeto-cathartica.

Canudo do Lago. E' o *Mata-cabras* no Ceará.

Canudo de Pito. E' a *Sapucainha*.

Caperleçoba. *Conoclinium*. Compostas.

Uzos. Emprega-se contra as úlceras.

Caperleçoba Branca. *Chenopodium hircinum*. Chenopodeaceas.

Uzos. Fornece um óleo anthelmintico.

Capetleçoba. Veja-se *Herba de bicho*.

Capim das Lombrigas. E' no Norte a *Spigelia*.

Capipo-atinga. *Paspalanthus*. Gramineas. (Minas e S. Paulo.)

Capitão do Campo. *Terminalia sericea*. Combretaceas.

Uzos. Emprega-se a casca como adstringente.

Capitiu. *Citriosma laurifolia*. Atherospermaceas. (S. Paulo.)

Uzos. Em banhos nas dores rheumaticas.

Caporoçoba. *Clusia ? Ilura ?*

Capupuva. Veja-se *Sapé*.

Caqueira. *Cassia dormiens*. Vell. Leguminosas.

Uzos. Emprega-se como purgativa.

Cará branco. *Dioscorea hastata*.

« **bravo.** « *conferta*.

« **de espinho.** « *bulbifera*.

« **mimoso.** « *tuberosa*.

« **de Sapateiro.** « *bulbifera*.

« **tinga.** « *conferta*.

Caragoata. *Bromelia spinosa*. Liliaceas.

Uzos. Os da *Piteira* pouco mais ou menos.

Caragoatá-açú. *Fourcroya gigantea*. Liliaceas.

Uzos. Veja-se *Piteira*.

Carajurú. *Bignonia chica*. Bignoniaceas.

Uzos. Fazendo-se ferver as folhas desta planta obtem-se uma substancia feculenta vermelha, preciosa para a tincturaria. Acredita-se ser anti-bobatica, applicada topicamente.

Caraiapé. Bignoniacea ? (Pará, Amazonas.)

Uzos. Emprega-se em banhos nas affecções dartrosas.

Caranday. *Copernicia cerifera*. Mart. Palmeiras.

Carapiá. E' no Ceará o *Apihy*.

Cardamomo Falso. *Alpinia nutans*. Amomaceas.

Uzos. Aromatica.

Cardamomo do Mato. *Hedychium*. Amomaceas.

Uzos. Aromatica. Emprega-se no rheumatismo. A fecula é util nas dispepsias.

Cardamomo do Mato. *Renealmea*. Amomaceas.

Uzos. As sementes são aromaticas e apimentadas. (Ceará.)

Cardo Sancto. *Argemone mexicana*. Papaveraceas. (Em todo o Brazil.)

Uzos. As folhas desta planta, chamada pelos hespanhóes, *Figueira do Inferno*, são como os fructos, narcoticas e sedactivas. O leite é anti-herpetico, e empregado contra a syphilis e as opthalmias (instillações). As sementes torradas e pulverisadas, na doze de 1 a 1 1/2 colher, constitue um bom purgante. Fumadas as folhas com o tabaco de rôlo é optimo recurso contra a asthma. Na India emprega-se como succedanea da ipecacuanha, e os nossos indigenas acreditão ser ella util nas mordeduras de cobra.

Caroará-caa. *Piperonia volubilis*. Piperaceas.

Uzos. Emprega-se em cozimento no rheumatismo arthritico e venereo.

Caroba-açú. Veja-se *Caroba*.

Caroba Branca. *Sparratosperma lithontripticum*. Mart. *Bignonia leucantha*. Vell. Bignoniaceas.

Uzos. Alem das propriedades communs ás carobas goza ainda das diureticas e lithontripticas.

Caroba do Campo. *Jacarandá ruffa*. Manso. Bignoniaceas.

Uzos. Os da *Caroba*.

Caroba-mirim. Veja-se *Caroba branca*.

Carobinha do Campo. *Bignonia nodosa*. Manso. Bignoniaceas.

Uzos. E' anti-bobatica e empregada contra a gonorrhœa.

Carolina. *Adenanthera pavonia*. Leguminosas.

Uzos. Suas folhas são anti-rheumaticas. Suas sementes um pouco chatas são comestiveis.

Carrapatinho. No Maranhão é uma *piperacea*.

Carrapicho de Cavallo. Veja-se *Carrapicho* do Ceará.

Carrapicho do Ceará. *Krameria tomentosa*. Polygalaceas.

Uzos. Emprega-se como adstringente. E' a *ratania*.

Carua-iba. *Gerascanthus*. Cordiaceas.

Carurú-guaçú. *Phytholoca decandra*. Linn. Phytholaceas.

Uzos. As folhas são irritantes, o succo da planta drastico. Em

cataplasmas sobre as ulceras é um optimo detergente. Emprega-se tambem contra o rheumatismo e a syphilis internamente. Nos can-
cros, se não cura-os, modifica poderosamente o character.

Carurú de Perdrix. Veja-se *Cururi-guaçu*.

Caryocar. Genero das Rhizobolaceas.

Comprehende entre as especies brasileiras empregadas: *C. bra-
siliense*, *C. glabrum*, *C. butyrosu*m, *C. tomentosum*.

Casca amargosa. Veja-se *Jaroba*.

Casca d'anta da Bahia. *Rauwolfia bahiensis*. Riedel.
Apocynaceas.

Uzos. Actua como tonica na doze de 4 oitavas para uma libra
de vehiculo.

Casco de cavallo. *Barbieria undulatus*. Bignoniaceas. (Per-
nambuco).

Uzos. E' empregada como anti-bobatica.

Cascos. *Dioscorea*. Dioscoreaceas. (Ceará.)

Uzos. O tuberculo é comestivel é farinaceo.

Cascaria. Genero das *Samydaceas*.

Entre as especies brasileiras importantes temos :

C. ulnifolia, cujas folhas são uteis nas ulceras e o succo nas mor-
deduras de cobra.

C. lingua, empregada em cozimento (folhas) nas febres inflam-
matorias.

C. adstringens, util em loções como detergente.

Cassia. Genero das Leguminosas.

Entre as especies brasileiras notão-se :

C. medica, *C. rugosa*, *C. splendida*, *C. laevigata*, *C. occidentalis*,
C. sericea, *C. cathartica*, *C. magnifica*, *C. falcata*, *C. sclerocarpa*,
C. fistula.

Catanduba. *Piptadenia moniliformis*.

Catinga. E' o Marmelleiro branco no Ceará.

Catinga de Macaco. Veja-se *Gitirana*.

Catinga de Mulata. E' no Maranhão a *Canelleira brava*.

Catinga de Negro. *Cleome speciosa*. Capparidaceas.

Catingueira. *Caesalpinia bracteata*. Leguminosas.

Uzos. As flores são peitoraes.

Catingueira brava. *Croton*. Euphorbiaceas.

Uzos. Excitante.

Catuaba. E' a *Sabina* em Minas.

Catuaba. *Erythroxylum*. F. de Sisn. Erythroxylaceas. (Ceará.)

Uzos. Tónico amargo.

Cauã. (Ceará.)

Uzos. A infusão da casca da raiz na doze de 1 onça para uma libra d'agua é util nas febres; além de ser purgativa e anti-scorbutica.

Cavallina. *Equisetum arvense*. Equisetaceas.

Uzos. Levemente diuretico.

Caxinguba. Veja-se *Caxim*.

Caxinguba. Veja-se *Coajinguba*.

Cebiá. *Mimosa caesalpincaefolia*. Leguminosas.

Cebipira-guaçú. Veja-se *Sipipira*.

Cebola branca. Veja-se *Cebola cecem*.

Cedrilha. *Aloysia citriodora*. Verbenaceas.

Uzos. Aromatica.

Cedro. *Cedrela brasiliensis*. Meliaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. A casca é adstringente e emetica. O Dr. A. de Castro diz haver tirado vantagem do xarope do cedro nos casos da pthisica pulmonar.

Cega-olho. E' na Bahia o *Officinal da Sala*.

Cerneira. Veja-se *Cebid*.

Uzos. Emprega-se como adstringente.

Chá do Brazil. *Stachytarpheta jamaicensis*. Verbenaceas.

Uzos. As folhas são laxativas nas creanças. Applicão-se tambem como modificativas nas ulceras.

Chá de taboleiros. *Lippia*. Verbenaceas. (Ceará.)

Uzos. Diaphoretico o empregado contra a tosse.

Chachim. E' em S. Paulo, o *Mata-olho*.

Chanana. *Turnera opifera*. Mart. Turneraceas.

Uzos. Emprega-se em Minas contra a constipação de ventre e a dispepsia.

Chapariô Bravo. *Rhopala complicata*. Proteaceas.

Chichá do Norte. *Sterculia lasiantha*. Mart. Sterculiaceas.

Chiqui-chiquê. *Cactes*. (Ceará.)

Uzos. Fornece farinha para mingãos.

Chiqui-chiqui. *Crotalaria vitellina*. Papilionaceas.

Uzos. A raiz tuberosa fornece fecula comestivel.

Chocalho. *Crotalaria striata*. Papilionaceas.

Choyne. Veja-se *Cuieté*.

Choyté. Veja-se *Cuieté*.

Churú. *Pergonium racemosum*. Myrtaceas.

Cinco Fôlhas. *Potentilla reptans*. Rosaceas.

Uzos. Adstringente e anti-rheumatica.

Cinco Folhas. *Bignonia depauperata*. *Hedera-quinqüefolia*. Vell. Bignoniaceas.

Uzos. Anti-rheumatica applicada em banhos; internamente anti-syphilitica.

Cipó Camarão. *Arrabidaea*. (Ceará.)

Cipó cambuoa. *Dasymena*. Filiaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Emprega-se como ligeiro anti-spasmodico.

Cipó Carneiro. *Echites*. Gaudich. Apocynaceas.

Cipó Carneiro. *Anchietea salutaris*. Jonidiaceas.

Uzos. Muito empregada nas hemorragias.

Cipó Carneiro do Rio de Janeiro. Veja-se *Silvina*.

Cipó Catinga. *Nikania*. Euphorbiaceas.

Uzos. Emprega-se como aromatico.

Cipó de Cobra. *Cissampelos glaberrima*. Menispermaceas.

Uzos. A raiz algum tanto acre é empregada contra as mordeduras de cobra.

Cipó-em. *Periandra dulcis*. Smilaceas.

Uzos. Os da *Salsaparrilha*.

Cipó de Fogo.

Uzos. Em clysteres contra a syphilis.

Cipó de Gota no Ceará. E' a *Parreira brava*.

Cipó Hlapuá. E' a *Mandioea do mato* no Amazonas.

Cipó de Imbiri. *Dioclea violacea*. Mart. Papilionaceas.

Cipó de Lavadeira. *Reissekia smilacea*. Smilaceas.

Uzos. Emprega-se como anti-syphilitico.

Cipó do Leite. Veja-se *Teajiá*.

Cipó do Macaco. *Stenolobium velutinum*. Leguminosas. (Ceará.)

Uzos. Ichtyotoxico.

Cipó Matador. *Picus arpaçusa*. Cas. Artocarpaceas. (Rio de Janeiro.)

Cipó Muta-mutá. Veja-se *Cipó de esçada*.

Cipó paratudo. E' no Ceará a *Bauha* do Rio de Janeiro.

Cipó de Vaqueiro. Veja-se *Cipó de fogo*.

Cipó vermelho. *Doliocarpus rollandii*. Dilleniaceas. (Cuiabá e Maranhão.)

Uzos. As bagas são venenosas.

Cochonilha Vegetal. *Spiloma rosea*. Lychnaceas.

Uzos. Emprega-se como peitoral.

Colomba Brava. E' o *Cardemomo* no Ceará.

Combetarú. Veja-se *Mamminha de porca*.

Comichá. Myrtaceas. (Minas e S. Paulo.)

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Copaia. *Jaracandá-procera*. Bignoniaceas.

Uzos. Emprega-se nas molestias syphiliticas.

Copau-buçú. Veja-se *Gamelleira*.

Coqueiro caranda. E' em Mato-Grosso a *Copernicea cerifera*.

Coração de Boi. *Anona reticulata*. Anonaceas.

Uzos. Segundo o Sr. Dr. Peckolt as sementes em emulsão tornão-se uteis nas diarrheas.

Coração Verde. *Nectandra Roddii*. Lauraceas.

Uzos. Adstringente e aromatico.

Coró Bravo. *Convolvulus*. Convolvulaceas. (Ceará.)

Uzos. A tubera é comestivel depois de extrahida a parte nociva por meio de repetidas lavagens. Serve para tinguir o poixe.

Corisco. (Alagoas.)

Uzos. Emprega-se como anti-septica.

Corimbó. Bignoniaceas.

Uzos. Planta sarmentosa, odorifera e de flor roxa rubra.

Corindiba. *Sponia micrantha*. Ulmaceas.

Coróa de Frade. *Cactus*. Cacteas. (Ceará.)

Uzos. Excellente alimento para o gado.

Corongo. *Gomphrena leucocephala*. Mart. Amarantaceas.

Uzos. Emprega-se nas febres adynamicas como amargo e aromatico. No Ceará dá-se o nome de *Para tudo* ás cascas da raiz do *Corongo*.

Camarourana. *Taralea oppositifolia*. Aubl. Leguminosas.

Uzos. Os do *Cumarú*.

Couve do Mato. *Lactuceae*.

Uzos. Emprega-se em banhos nas molestias do utero.

Couvinha Cravinho. Veja-se *Cravo de Urubús*.

Cravo de Urubús. *Porophyllum*. Compostas. (Ceará,)

Uzos. Suas propriedades são nervosthenicas, anti-hystericas e emmenagogas.

Croatá. *Bromelia spinosa*. Bromeliaceas.

Cronha-criz. Veja-se *Esponjeira*.

Cuaro. *Galphimia brasiliensis*. Malpighiaceas.

Uzos. Pode ser empregada como tonica e anti-febril.

Cuchiu-kybaba. Veja-se *Pente de macaco*.

Cuegiba. Veja-se *Cuietezeira*.

Cui-puúna. E' em S. Paulo uma *Myrtaceae*.

Cui-peuna. E' na Bahia uma *Myrtaceae*.

Cui-peuna. *Lasiandra mutabilis*. Melastomaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. O succo misturado com agua é abstergente das ulceras. Emprega-se em tincturaria.

Cuiruiri. Veja-se *Quiruirí*.

Cumacahi. Apocynáceas. (Amazonas.)

Uzos. Toxicas.

Cumarú. *Torresia cearensis*. Fr. All. Leguminosas. (Ceará.)

Uzos. A infusão da casca do *Cumarú* tem a mesma virtude medicinal do louro ccrejo, das folhas do pecegueiro. Fornece uma resina semelhante ao ambar.

Cumati. Asclepiadea? Apocynaea?

Cunabi. Veja-se *Conabi*.

Cunami. Veja-se *Conami*.

Cunuri. Euphorbiaceas. (Amazonas.)

Cupiuba. Veja-se *Copahiba*.

Curaro. *Strychnos toxifera*. Loganiaceas. (Pará e Rio Negro.)

Uzos. Planta assaz venenosa.

Curraleira. Veja-se *Pé de perdiz* no Diccio nario.

Curuapé. *Paullinia sarmentosa*. Sapiudaceas.

Uzos. Os da *Paullinia pinnata*.

Curubá. Cucurbitaceas.

Curuba-y-mirim. Veja-se *Sepipira*.

Curui-caa. *Rosea scabra*. Amaranthaceas.

Uzos. Empregada em banhos nas hydropesias.

Cururi. Myrtaceas.

Curumaré. Veja-se *Genomaré*.

Curupica-iba. Terebinthinacea.

Cururé. Veja-se *Caa-rerú*.

Cururú. *Paullinia cururú*. Sapindaceas.

Cururú. *Anisolobus cururú*. Apocynaceas. (Amazonas.)

Uzos. Toxica.

Cutitiriba. (Pará.)

Uzos. Os fructos são comestiveis.

D

Dorstenia. Genero das Moreaceas.

Entre as especies brazileiras apontão-se a *contrayerva*, a *brasilien-sis* e a *opifera*.

As raizes frescas' são aromaticas, amargas e acres e paixão por tonicas, emeticas e estimulantes.

Dracontium pertusum. E' a *Monstera Adansonii*. Scholt. Aroidaceas.

Uzos. O succo recente é caustico. O cozimento da planta emprega-se em banhos nos rheumatismos articulares.

E

Eloendro. Veja-se *Espirrodaira*.

Embaiba. Veja-se *Imbaiba*.

Embeu. *Gualteria*. Veja-se *Pindaiba*. Anonaceas. (Rio de Janeiro.)

Embira. *Xilopia frutescens*. Veja-se *Pindaiba*. Anonaceas.

Embirete. E' a *Embira de Minos*. (Bahia e Espirito Santo.)

Embir-oçú. No Rio de Janeiro é uma *Bombacea*, e na Bahia e Pernambuco uma *Lecythidea*.

Embuy-aembo. Veja-se *Embira-timbó*.

Engasga Vaccas. *Lucuma montana*. Fr. All. Sapotaceas.
(Ceará.)

Enquiri. *Chrysophyllum tomentosum*. Fr. All. Sapotaceas.
(Ceará.)

Espiga de Sangue. *Helosis brasiliensis*. Schott. Balanophoraceas.

Uzos. As flores e a batata são anti-hemorrhagicas.

Espirradeira. *Nerium oleander*. Apocynaceas.

Uzos. Além dos referidos no Diccionario o cozimento das folhas é util contra os piolhos da cabeça. O pó da casca e da raiz mata os ratos.

F

Fava cheirosa. Será o *Pichury*? (Amazonas.)

Uzos. Ralada e tomada em agua quente é util na hemi-crania e dores nervosas.

Fava de Rama. *Canavalia bonariensis*. Solanaceas. (Ceará.)

Uzos. Purgativa. Toxica para os animaes.

Feijão bravo. *Canavalia ensiforme*? D. C. Leguminosas.

Uzos. Toxica para os animaes,

Feijão dos caboclos. *Trophis*? Peckolt. Artocarpaceas.

Uzos. Os Puiys alimentão-se com este feijão.

Fel da Terra. E' no Ceará a *Cajarana*.

Fel da Terra. *Lophophytum mirabile*. Mart. Lophophytaceas.

Uzos. A batata fresca em banhos é util na rachitis; secca e pulverisada emprega-se na ictericia; as flores são aphrodisiacas.

Feto Indigena. *Polypodium instans*. Filiaceas.

Uzos. E' a raiz desta planta um poderoso teniacida.

Feto Macho do Brazil. Veja-se *Samambaia*.

Figueira Branca. Veja-se *Gamelleira*.

Figueira da India. Veja-se *Jamacarú*.

Figueira do Reino. *Ficus carica*. Artocarpaceas.

Figueira do Surinam. Veja-se *Ambaiba*.

Flor de Babado. Veja-se *Flôr de babeiro*.

Formigueira. *Triplaris noli me tangere*. Polygonaceas. (Matto Grosso.)

Uzos. Excitante energico.

Frecha de Capoeira. Veja-se *Assa-peixe*.

Fruteira de Burro. *Anona xilopoides* ? *Uvaria febrifuga*. Anonaceas.

Uzos. Emprega-se como anti-febril; as sementes porém são julgadas tóxicas.

Fruteira de Burro. E' o *Capparis pulcherrima*. Cappariaceas.

Fruteira de Cachorro. *Cupania*. Sapindaceas. (Sul do Brazil.)

Uzos. Canicida.

Fruteira de Conde. E' a *Atta* no Ceará e a *Pinha* na Bahia.

Fruteira de Cotia. Veja-se *Indaya-açú*.

Fruteira de Jacú. *Duranta plumeri*. Verbenaceas.

Uzos. Os fructos acidulos são uteis nas febros inflammatorias.

Fruteira de Macaco. *Caportroche* sp. Bixineaceas.

Fruteira de pomba. Dá-se este nome a *Gallinha Choca* e ao *Mercurio do campo*.

Fruteira de Perdrix. *Byrsonima variabilis*. Malpighiaceas.

Uzos. Planta adstringente e empregada contra a albuminuria na doze de 1 1/2 onça de folhas para uma libra de cozimento.

Fumo Bravo. *Polygonum*. Polygonaceas. (Ceará.)

Uzos. Icthyotoxica.

G

Geneuna. Veja-se *Cannafistula*.

Genipuarana. *Perigara angusta*. Aubl. Lecythidaceas.

Uzos. Os da *Jandiparandiba*.

Geromari. Veja-se *Gerumaré*.

Gergelim Bravo. *Crotalaria*. Leguminosas.

Uzos. E' anti-blenorrhagico.

Gerumáro. *Cassia*. Leguminosas.

Uzos. Os fructos são agradaveis.

Getica. E' a tubera da batata.

Gingeira brava. *Prunus brasiliensis*. Cham. *Cerasus sphaerocarpa*. Amygdalinaceas.

Uzos. Os do louro cerejo.

Gingeira da Jamaica. E' a *Malpighia glabra*.

Giquiriti. E' no Ceará o *Abrus precatorius*.

Gitirana. *Convolvulus*. Convolvulaceas. (Alagóas.)

Uzos. Desobstruente applicada em fomentações. Fornece uma especie de lã.

Goerana. *Chrysophyllum perfidum*. Fr. All. Sapotaceas. (Ceará.)

Uzos. Os fructos são venenosos. Talvez a unica especie do genero *Chrysophyllum*, pois que todas as outras produzem fructos comestiveis.

Goiabi-pocaca-biba. E' uma *Mimosa*.

Goya-ibira. *Cecropia concolor*. Urticaceas.

Gomma de batata. Veja-se *Batata de purga*.

Gomma Elemi. Veja-se *Almecegueira*.

Gomma de Pellado. Extrahe-se de uma *Acacia* de Cantagallo.

Gomphia. Genero das Ochnaceas.

As mais importantes das especies brasileiras são: *G. hexasperma*, *G. parviflora*.

Goyana-timbó. *Erythrina*. Vell. Leguminosas.

Goyti. Veja-se *Oiti*.

Gramma do Pará. Veja-se *Sapé*.

Gramma da Praia. E' no Pará o *Sapé*.

Gramma da Praia. *Stenotaphrum glabrum*. Graminaceas. Bahia.)

Uzos. Raiz emolliente e refrigerante.

Grão de Gallo. *Lucuma torta*. *Labatia oblongata*. Sapotaceas. (Serro do Frio.)

Uzos. Os mesmos do *Guiti-toroba*.

Grãos de Macaco. *Moutobea guyanensis*. Ebenaceas.

Uzos. Os fructos são doces e mucilaginosos.

Grãos de Porco. *Cordia grandiflora*. Cordiaceas. (Corcovado e Minas.)

Uzos. Os fructos são mucilaginosos e levemente adstringentes.
Grumamé. E' em S. Fidelis o *Mata-olho*.

Guabiroba. Nome pelo qual são conhecidas diversas especies de *Psidium*, *Eugenia* e *Myrtus*.

Guabiraba. *Campomanesia virescens*. Myrtaceas.

Uzos. Os fructos são doces e comestiveis.

Guabiroba. *Eugenia myrabolana*. Myrtaceas. (Pará.)

Uzos. Ligeiramente adstringente. O fructo é acidulo.

Guabiroba. *Abbevillea maschalantha*. *Psidium dulce*. Vell. Myrtaceas.

Guabiroba-mirim. *Campomanesia aprica*, vel *rhydophilla*. Myrtaceas,

Guabiroba Felpuda. *Campomanesia discolor*.

» **Liza.** » *obseura*.

» **do Mato.** » *xanthocarpa*.

» **Mirim.** » *aprica*.

Guabiyu'. Veja-se *Guabira-guaçu*.

Guacá. *Chrysophyllum edule*. Sapotaceas. (S. Paulo.)

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Guacão. *Dasynema*. Schott. Filiceas.

Uzos. Emprega-se como adstringente.

Gaibipocaiva. *Calliandra tubulosa*.

E' segundo o Dr. Sisneiros o *Páo Podre* ou *Bordão de Velho*.

Guaimbé. *Philodendron arborescens*. Araceas. (Bahia e Pernambuco.)

Uzos. Os do *Cipó de Imbé*.

Guambé. Veja-se *Guaimbé*.

Guajarahy. Veja-se *Guajará*.

Guapeva. Sapotacea e que muitos querem que seja o *Chrysophyllum caimito*.

Guapeva. *Ilypanthera guapeva*. Cucurbitaceas.

Uzos. Possui as mesmas propriedades da *Jatobá*.

Guapurunga. *Marlieria tomentosa*. Myrtaceas. (S. Paulo.)

Uzos A casca emprega-se como tónica e adstringente em banhos.

Guaracica. *Lucuma fissilis*. F. Allemão. Sapotaceas.

Uzos. Os fructos são acidulos e emprega-se a casca da planta como adstringente.

Guaraito. *Chrysophyllum*. F. Allemão. Sapotaceas.

Guarantan. Sapindaceas. (S. Paulo.)

Suspeitamos da acção deste vegetal.

Guara-quyinh-açu'. Veja-se *Aguara quynh-açu'.*

Guararoba. Veja-se *Araribá.*

Guariuba. Veja-se *Gurijuba.*

Guembó. Veja-se *Imbé.*

Guina. *Portlandia hexandra*. Cinchonaceas.

Uzos. Amarga, adstringente e desagradavel é a casca desta planta.

Guineh. *Trixis divaricata*. Sp. T. anti-menorrhœa. Mart. Compostas. (Minas.)

Uzos. A infusão da raiz e folhas é applicada contra a metrorrhagia uterina.

Guirapariba. Marcg. Será o *Páo d'Arco*?

Guirapiá. Veja-se *Grãos de gallo.*

Gurijuba. Leguminosas.

Gurupé. *Licania*. Chrysobalanaceas. (Amazonas.)

Uzos Os da *Turiuva.*

Guyti-lba. E' a *Pleraginia rufa.*

Gypió. Olacinaceas. (Pará.)

Uzos. Aromatica e applicada nos casos de febres putridas.

H

Herva do Bicho. No Maranhão dá-se este nome ao *Fedegoso* do Rio de Janeiro, *Pajamarioba* do Pará.

Herva do Bicho. Dá-se algumas vezes este nome a *Herva moira.*

Herva Cauna. Veja-se *Maté.*

Herva cidreira. *Avellaria officinalis*. Labiadaceas.

Uzos. Os da *Herva cidreira* vulgar.

Herva de Cobra. *Marsypianthes híptoides*. Labiadaceas.
E' a *Boia-eaa* do Pará, ou *ortelá do mato.*

Herva da Costa. *Schubertia multiflora*. Mart. Asclepiaceas. (Ceará.)

Uzos. Acção toxica energica.

Herva Chumbo. *Avicennia alveolata*. Lacerda. Myoporinaceas

Uzos. Pode ser succedanea do *Mangue branco*.

Herva Dutra. *Miconia*. Melastomaceas. (S. Paulo.)

Uzos. A infusão ou cozimento das folhas é util nas diarrheas. Emprega-se em clysteres.

Herva Ferro. *Heliophyllum elongatum*. Apocynaceas.

Uzos. Adstringente e consolidante peitoral.

Herva Ferro. E' em algumas provincias a *Purga de João Paes*.

Herva de Isca. Veja-se *Conysa*.

Herva de Jaboti. E' um *Piper* empregado em banhos contra o rheumatismo.

Herva de Macahé. *Leonurus sibiricus*. Labiadaceas.

Uzos. O oleo essencial extrahido desta planta é anti-spasmodico e anti-rheumatico.

Herva Molle. *Caa-membee*.

Herva Mular. Veja-se *Alcamphora*.

Herva dos Namorados. Veja-se *Puçá*.

Herva de Nossa Senhora. Veja-se *Cipó de cobra*.

Herva de Perdriz. Veja-se *Fruteira de Perdriz*.

Herva Santa. *Chenopodium ambrosioides*. (Pará.)

Herva Santa. E' o *Fumo* em muitas localidades do Brazil.

Herva de Sant'Anna. *Kuhnia arguta*. Compostas.

Uzos. Emprega-se contra as mordeduras de cobras.

Herva de Santa Eugenia. E' o *Cipó de lavadeira*.

Herva de Santa Maria. Tambem tem este nome a *Jiraca*.

Herva de S. Martinho. *Sauvagesia erecta*. Sauvagesiacas.

Uzos. Applica-se como mucilaginoso nas ophtalmias e inflammções de intestinos e bexigu.

Herva de Sapo. Veja-se *Coração de Jesú*. (Dicionario.)

Herva Viva. Veja-se *Sensitiva*.

Hedyosmum Bomplandianum. Chloranthaceas.

Uzos. Emprega-se nas febres, hemicranias, etc.

Heymassoli. Veja-se *Imbuim*.

Iluaca. Veja-se *Guaedó*.

Hymenocæa. Genero das Leguminosas.

Entre as especies brasileiras notão-se: *H. courbaril*, *H. martiana*, *H. olfersiana*, *H. sellowiana*, *H. stigonocarpa*, *H. stilbocarpa*.

Todas offerecem um succo resinoso applicado nas affecções pulmonares.

Hyptis. Genero das Labiadaceas.

Entre as especies brasileiras conhecidas figurão: *H. pectinata*, *H. fruticosa*, *H. spicata*, *H. suaveolens*, *H. fasciculata*, *H. graveolens*, *H. umbrosa*, *H. canescens*.

Todas de efeitos diaphoreticos e empregadas nas affecções catarraes; e externamente como mondificativas.

I

Iba-metara. Veja-se *Acaia*.

Iba-poranga. *Vitex*. Verbenaceas.

Uzos. Cs fructos contem trez amendoas brancas e comestiveis.

Ibira-ce. *Chrysophillum glycipheum*. Sapotaceas.

Ibira-payé. Veja-se *Anguay*.

Ibyra. E' o *Cravo* do Maranhão.

Ibyragiynha. E' o *Cravo* do Maranhão.

Icaco. *Chrysobalanus icaco*. Chrysobalanaceas. (Norte.)

Uzos. Tanto a casca como a raiz e as folhas são uteis nas diarrheas.

Iciy. Veja-se *Icicaribá*.

Icô. *Colecodendron-icô*. Mart. Capparidaceas. (Ceará.)

Uzos. Embededa os cavallos; a bebedeira passa com a urina nos ouvidos do animal. (Mamede.) Cedem todos os phenomenos ao oleo de ricino.

Imberova. *Aspidosperma*. Apocynaceas. (S. Paulo.)

Uzos. Suspeitamos de seus effeitos.

Imbiri. Veja-se *Mbeeryi*.

Imbaim. *Ximenia*. Olacinaceas.

Imbyratanha. *Bombax*. Sterculiaceas. (Ceará.)

Uzos. Os tuberculos que se encontrão nas extremidades das raizes são tenros e adocicados.

Imyra. E' o *Cravo* do Maranhão.

Inajarana. Veja-se *Najarana*.

Ingá Xixi. Ingá. Leguminosas. (Amazonas.)

Uzos. A infusão da casca á frio n'agua fornece um poderoso vomitorio.

Inhapecanga. Veja-se *Japecanga*.

Inharé. *Brasymum*. Malpighiacas. (Ceará.)

Uzos. Fructos acidos e comestiveis.

Inhubyba-tan. *Pseudo caryophyllus*. Myrtaceas.

Uzos. Emprega-se como excitante.

Ipu'. Veja-se *Jalopa* do Brazil.

Isca do Mato. *Batrytis fomentaria*, *Sphaeria militaris*, *Sphaerulceas*. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Póde ser empregada contra as hemorragias externas.

J

Jaborandi. *Ottonia anisum*. Piperaceas. (Ceará.)

Uzos. Os das *Piperaceas*.

Jaborandi. *Esenbeckia*. Rutaceas. (Mernioca. Ibiapaba.)

Uzos. Os do *Guaco*.

Jaborandi. *Piper reticulatum*. Piperaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. A raiz é aromática, estomachica, sialagoga e diuretica.

Jaçapucao. Veja-se *Sapucao*.

Jacaramarú. Veja-se *Jamacarú*.

Jacarandá de S. Paulo. *Jacarandá aryphylla*. Ch. Bignoniacas.

Uzos. A casca é amargosa, diuretica e cathartica.

Jacarateú. Veja-se *Mamoeiro*.

Jacare-gui-taui. *Gouania apendiculata*. Rhamnaceas.

Uzos. O cozimento em banhos limpa a caspa (*dartro furfuraceo*) da cabeça. Passa por estomachica.

Jacatupó. *Pachyrrhysus angulata*. Leguminosas.

Uzos. A raiz bulbifera e excessivamente desenvolvida, fornece 9,89% de fecula que, depois de bem lavada, pode servir de alimento, e emprega-se nas dysenterias. As sementes são tidas por

venenosas. O Sr. Dr. Peckolt, porem, julga-as innocentes. Os indios Calyguás chamão o jacatupé — *abacucu*.

Jacu-acanga. *Heliophitum indicum*. Apocynaceas.

Jalapa Brasileira. Veja-se *Batata de purga*.

Jamacarú do Sertão. E' o vegetal conhecido no Amazonas pelo nome de *Coração do Diabo*. Cactaceas.

Jamaru'. *Curcubita idolatrica*. Lacerda. Cucurbitaceas. (Pará.)

Uzos. O fructo é amargo e pouco empregado.

Jambu. Veja-se *Agrião do Purá*.

Jambu-açu'. Veja-se *Jamburana*.

Jamburana. Urticaceas.

Uzos. A raiz acre e aromatica é empregada como anti-odontalgica.

Janibu-rana. *Anthemis*. Compostas.

Uzos. Ligeiramente adstringente e alcanphorada, emprega-se como condimento.

Januauva. *Plumeria*. Apocynaceas.

Uzos. Cathartica e anti-helmintica.

Japacamim. *Securidaca*. Lac. Leguminosas. (Pará.)

Japaranduba. E' em Pernambuco a *Japoarandiba*.

Jaramataia. *Vitex*. Gardn. Verbenaceas. (Ceará.)

Uzos. E' empregada como resolutiva.

Jasmim de Italia. *Jasminum angustifolium*. Jasminaceas.

Uzos. A flôr é de um aroma suavissimo ; a raiz é amarga e serve para combater as affecções dartrosas.

Jasmim Manteiga. *Cerbera manghas*. Gaertn. Apocynaceas.

Uzos. Toxica.

Jataua-rana. *Hymæna spuria*. Leguminosas.

Uzos. Pode ser empregada como laxativa.

Jatobá. *Feuillea passiflora*. *Anisosperma passiflora*. Nhandirobaceas.

Uzos. Goza de propriedades acres e purgativas. Algumas pessoas dizem que as sementes podem ser empregadas como estomachicas. A opinião de D. Candole de que as sementes das Cucurbitaceas não participão — *jamaiz* — da acção do fructo não é exacta como se verifica na *Feuillea cordifolia*.

Jatobú-rana. Veja-se *Jataua-rana*.

Jatnauba. *Guarea pendula*. Meliaceas.

Uzos. A raiz é drástica. O povo acredita que esta planta facilita a proliferação das mulheres.

Jauna. *Salanum*. Solanaceas.

Uzos. Emprega-se como diuretica.

Jequitinguaçu'. E' o *Sapindus saponaria*. Sapindaceas.

Jeramataia. *Vitex gardneriana*. Verbenaceas,

Uzos. As folhas são empregadas em banhos nas dores reumaticas e nas hydropesias.

Jericó. (Alagóas.)

Uzos. Anti-asthmatica, diuretica e febrifuga. Dá-se na doze de meia onça para uma libra d'agua.

Jericó. Veja-se *Angelicó*.

Jetuarana. Veja-se *Batata doce*.

Jetyca. Veja-se *Batata*.

Jiraraca. Veja-se *Jararaca* no Dicionario.

Jiraca. *Dracantium polyphyllum*. Linn. Araceas (Maranhão, Pará e Amazonas.)

Uzos. Planta caustica e corrosiva, tendo sua raiz, semelhante a da tayoba, acção toxica.

Joá de Capote. *Physalis pubescens*. Solanaceas. E' o *Camapu* de Pison.

João Molle. Veja-se *Páa Judeu*.

Joapitanga. E' o *Jeticucú*.

Jua-açu'. E' a *Gingeira brava*.

Jua-uba. Veja-se *Jua-açu*.

Jonidium. Genero das Jonidaceas.

Comprehende entre as especies brasileiras: *J. ipecacuanha*, *J. paaya*, *J. brevicaulis*, *J. urticaefolium*, *J. parvifolium*. Todas são mais ou menos emeticas.

Jucá. *Casalpinia*. Leguminosas. (Ceará.)

Uzos. Fructos bechicos. A raiz é util nas diarrhéas.

Jucirí. *Solanum jucerí*. Mart. Solanaceas.

Uzos. Emprega-se em banhos como calmante.

Jucury-açu'. Leguminosas.

Jurema. *Acacia Jurema*. Mart. Leguminosas.

Uzos. Goza das propriedades do Angico, e na opinião de alguns

praticas as sementes são venenosas, servindo de contra veneno a propria raiz.

Juriquiti. *Abrus.* (Ceará.) Freire de Sisneiros.

Juripari-iba. *Strychnos.* Loganiaceas. (Pará e Amazonas.)

Jurupari-pirera. (Amazonas.)

Uzos. As fumigações feitas com a casca desta planta são uteis nas dores de cabeça.

Jutica-rana. Veja-se *Batata Brava.*

K

Kiwnja. Veja-se *Páó Cravo.*

Kopii. *Couipia tomentosa.* Aubl. Celastrinacoas.

Uzos. Acre e nauseante.

Kyinha. Veja-se *Pimenta.*

L

Lgrimas. Veja-se *Brincos.*

Lgrimas de N. Senhora. Veja-se o Dicionario.

Uzos. As sementes desta graminea são diureticas e o seu amido nutritivo. O cozimento da hastea e folhas é util na asthma e nas affecções pulmonares.

Lantana. Genero das Verbenaceas.

Entre as especies brasileiras avultão: *L. camará.* *L. aculeata.* *L. involucrata.* *L. brasiliensis.* *L. sellowiana.* *L. pseudoshea.* *L. microphylla.* Todas aromaticas e uteis nas affecções catarrhaes. rheumaticas, nervosas, etc.

Laranginha Brava. *Tinguaciba.*

Laranginha do Mato. *Monnina brasiliensis.* Polygalaceas.

Uzos. A raiz é applicada como detergente. Esfregada em agua fornece uma sorte de mucilagem que substitue o sabão, E' um optimo fortificante do cabello.

Lasiandra. Genero das Melastoinacoas.

No Brazil encontram-se entre outras as seguintes especies:
L. longiflora, *L. protaeformis*, *L. argentea*, *L. maximiliana*, D. C.
Todas mais ou menos adstringentes e tinctoriaes.

Legação. Veja-se *Salsaparrilha*.

Leiteira do Mato. No Rio de Janeiro é um *Chrysophyllum*.
Sapotaceas.

Uzos. Emprega-se como vulneraria.

Licari kanali. Veja-se *Páo Cravo*.

Limoeiro Bravo. *Citrosma cujabana*, Mart. Atherospermaceas.

Uzos. O succo das folhas ou sua infusão (1 folha para 1 chicara d'agua quente) é util nos casos de quedas e contusões. Ha praticos que a julgão proveitosa nas molestias chronicas do peito.

Li nociro do Mato. E' no Maranhão a *Aroeira* do Pará.

Lingua de Boi. *Ajuga reptans*, Labiadaceas.

Uzos. E' empregada-se como aromatica.

Lingua de Rio. *Casearia lingua*, Camb. Samydaceas. (Minaes Geraes.)

Uzos. Emprega-se nas febres inflammatorias.

Lixa. *Lippia urticoides*, Verbenaceas.

Uzos. Emprega-se como aromatica.

Louro Cerejo do Brazil. Veja-se *Cerejeira*.

M

Macambiras. *Encholium*, *Bromelia laciniosa*, Mart. (Ceará.)

Uzos. Fornecem uma batata feculifera comestivel.

Macella do Sertão. *Aphnostephus*, Sisneiros. *Grangea*, Gardn. Synantheraceas.

Uzos. Os da *Macella gallega*.

Madre Cravo. *Pluchia*, Compostas. (Ceará.)

Uzos. Aromatica e anti-hysterica em banhos.

Não será o Quitoco?

Madre Silva. *Alstroemeria peregrina*, Amaryllidaceas.

Uzos. Alem de flor de ornamento, sua raiz contem fecula e pode ser applicada como diuretica.

Maimbu. *Cissus*. Ampelidáceas. (Rio de Janeiro e Espírito Santo.)

Uzos. Emprega-se como resolutiva.

Malicia do gado. Veja-se *Melosa*.

Malva Brasileira. Veja-se *Vassoura*.

Malva Brava. E' no Pará uma *Scrophulariaceae*.

Maiva Diuretica. E' a *Pavonia* de S. Hil.

Mamona-rana. Veja-se *Mamoeiro*.

Mamminha de Porca. *Zanthoxylon sorbifolium*. S. H.
Pohlia longsdorffii. Mart. Rutaceas.

Uzos. A casca da raiz é acre e amargosa, é empregada nas dores de dentes e em banhos como tónica.

Mamono do Mato. *Mabea fistuligera*. Euphorbiaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Os do *Ricino*. Em Minas dá-se a esta planta o nome de —*Canudo de pito*—, e emprega-se como febrífuga e resolutiva.

Manapuçá. Veja-se *Puçá*.

Mandacarú. *Cactus sulcatus*. Cactaceas.

Uzos. O fructo é grande, ovalo, amarello e comestivel. A raiz fornece fecula alimenticia; o seu cozimento passa por anti-hemorrhoidal.

Mandiocahy. *Panax morotoni*. Araliaceas.

Uzos. Estimulante.

Mandioquinha do Campo. E' a *Bolsa de pastor* em Minas e S. Paulo.

Mandiyú. Veja-se *Algodoeiro*.

Mandupava. *Cinchona*. Vell. Cinchonaceas. (Minas.)

Uzos. Tónica.

Mané Molle. Veja-se *Offical da sala*.

Mangabeira de Minas. *Habsburgia comans*. Mart. Apocynaceas.

Uzos. Os da *Mangabeira Brava*.

Mangarahy. Veja-se *Mangarús*.

Mangueira. *Mangifera indica*. Anacardiaceas.

Uzos. Os fructos são deliciosos. A casca, sobre tudo a da raiz, é adstringente e aromatica e empregada em casos de diarrheas chronicas e fluxos mucosos. Os grelos são peitoraes. Os caroços

dos fructos gozão da virtude anti-helminthica e a resina do tronco passa por anti-syphilitica.

Maniba. Veja-se *Mandioca*.

Mantimento de Pobre. Veja-se *Murici*.

Mão de Mono. E' em Minas o *Azogue dos pobres*.

Mão Visinho. *Zanthoxylum*, *Zanthoxylaceas*. (Alagôas.)

Uzos. Emprega-se nas ulceras.

Maracujá-açú. *Passiflora quadrangularis*, *Passifloraceas*.

Uzos. Os fructos são agradaveis pela polpa acida que contem A raiz da planta é emetica e, na opinião do Dr. Ricord Madiãna, eminentemente venenosa, (Ilha de Reunião), e isso devido a um principio immediato chamado — *passiflorina*.

Marajoara. *Malpighia lanceolata*, *Malpighiaceas*.

Marajoara. No Pará dá-se este nome a *Curatella americana*, Lacerda.

Marapuama. *Straussea*, *Oleaceas*.

Uzos. O succo é empregado nas affecções pulmonares. A raiz é excitante e aphrodisiaca.

Maratataiba. *Machura*?

Marataua. Veja-se *Maratataiba*.

Maria da Costa. Veja-se *Herva da costa*.

Marianica. Veja-se *Caperiçoba*.

Maria Preta. *Dyospyros*, *Ebenaceas*. (Ceará.)

Maripá. *Xiphidium album*, *Iridaceas*.

Uzos. Comestivel.

Marmellada. E' o nome com que os Cariris do Ceará conhecem o fructo de uma especie de *Dyospiros*.

Marmelloiro. *Dyospiros*, *Ebenaceas*. (Coará.)

E' a *Maria Preta*.

Marmelloiro do Choiro. Veja-se *Quebra-facas*.

Marmelloiro Corno. Veja-se *Quebra-facas*.

Marmelloiro do Mato. *Casearia ulmifolia*, *Samydaceas*.

Uzos. Emprega-se nas mordeduras de cobras.

Marmelloiro do Campo. *Pentzia polpunea*, *Celastrinaceas*. (S. Paulo.)

Uzos. Pode ser empregado como adstringente e purgativo.

Marroio. Veja-se *Herva de Macahé*.

Massambará. *Trachypogon avenaceus*, Mart. *Graminaceas*.

Uzos. E' empregado como diuretico.

Massarandiba. *Eugenia*. Pison. Myrtaceas.

Massarandiba. *Lucuma procera*. Sapotaceas.

Massaranduba dos Taboleiros. *Mimosa triflora*. Sapotaceas.

Uzos. Fructo claro e doce.

Massaranduba. No Ceará dão este nome tambem ao *Enquiri*. (F. All.)

Mastruço. E' na Bahia a *Herva de Santa Maria*.

Mastruço. E' no Pará o *Agrião*.

Mata Barata. *Andira*. Leguminosas.

Mata cabras. *Ipomea fistulosa*. Convolvulaceas.

Mata cabras. *Calonyction*. Convolvulaceas. (Ceará.)

Uzos. Toxica para o gado.

Mata cães. E' a *Angelica de rama*.

Mata-calado. E' uma arvore do Paraná, e cujo fructo oblongo, de palmo de comprimento e de côr verde azulada, fornece um succoleitoso tão malefico que mata rapidamente, e d'ahi vem o nome que os indigenas lhe dão.

Mata-canna. *Vandelia diffusa*. Scrophulariaceas. (Bahia.)

Mata Caxorro. *Apocynium citrifolium*? Apocynaceas. (Norte.)

Uzos. Seu succo é toxico.

Mata Fome. E' em S. Paulo o *Camapá*.

Mata mata. *Lecythis coriacea*. Lecythidaceas.

Uzos. Emprega-se na phthisica pulmonar.

Mata-matá. Dá-se este nome tambem a uma *Dellilea*.

Mata-olho. *Ophthalmoblaton macrophyllum*. F. All. Euphorbiaceas. (Ceará.)

O succo leitoso é de cheiro forte e nauseante. E' um poderoso caustico.

Mate-me embora. *Ipomea*. Convolvulaceas. (Bahia.)

Mato de Ochos. *Lucuma neriifolia*. Sapotaceas. (Paraná e Rio Grande do Sul.)

Mbeery. *Canna glauca*. Marantaceas.

Uzos. Diuretico empregado nas uretrites e catharros da bexiga.

Meerú. Acha-se *Meerú* no Diccionario.

Meladinha. Veja-se *Paracary*.

Mela Pinto; Veja-se *Herva tostado*.

Melosa do Gado. *Bastardia*. Graminaceas.

Uzos. Emprega-se como forragem.

Montruiz. E' a *Herva de Santa Maria* no Ceará.

Mercurio dos Pobres. Veja-se *Manacá*.

Meri. *Brumelia nigra*. Sw. Sapotaceas.

Uzos. A casea é amarga, adstringente e febrifuga. A madeira é de cerne duro.

Merendiba. Veja-se *Amendoa brava* do Ceará.

Meru-caa. Veja-se *Merud*.

Mijarrona. E' nas provincias do Norte a *Zornia* do Rio de Janeiro.

Milho cozido. *Licania incana*. Chrysobalanaceas.

Milhomem. *Leptolobium orboreum*. Cæsalpiniaceas.

Uzos. Acção toxica.

Milhomem miudo. Veja-se *Jarrinha*.

Milolô. Veja-se *Coração de Boi*.

Mira-ceen. *Solanum*. Solanaceas.

Uzos. A casea é empregada como mucilaginoso.

Mira-itan. Veja-se *Marapuama*.

Monducurú. Veja-se *Mandacará*.

Monguba. *Eriodendron*. Leguminosas.

Morixi. Veja-se *Marajoara*.

Mortedo Diabo. *Scabiosa succisa*. Dipsaceas.

Moxoco. Veja-se *Mulungú*. *Erythrina crista galli*. Leguminosas.

Mucugó. *Couma rigida*. Mart. Apocynaceas.

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Mucuna. *Dolichos pruriens*. Hurub. Leguminosas.

Uzos. As sementes são venenosas na opinião de Pison; maceradas n'agua perdem a acção toxica e servem de alimento. A raiz está no mesmo caso. Nós suspeitamos desta planta. O *mucuná* fornece o chamado—*pó de mico*, que lançado sobre o corpo produz uma comieção insupportavel.

Mucuná Branco. *Gynebea panniculata*. Solanaceas.

Mucura-caa. *Solanum*. Solanaceas (Amazonas.)

Uzos. E' util nas dores de cabeça, banhando-se esta com a infusão das folhas soccadas da planta, ou cheirando-se a miúdo a infusão.

Mufumbo. *Combretum* ? *Tetacera* ? (Ceará.)

Mulungu'. *Erythrina crista galli*, Linn. Leguminosas.

Uzos. O entrecasco é um poderoso desobstruente e na doze de 2 grãos em extracto estabelece o hypnotismo. As sementes são venenosas.

Ha' a especie—*Corallodendron*.

Mulungu'-mirim. Veja-se *Tentos*.

Mungumba. Veja-se *Mogumba*.

Mureci-penima. *Byrsonima chrysophylla*.

Mureci-penima. *Byrsonima sericea*. (Bahia.)

Mureci-petinga. *Byrsonima crassifolia*. (Pernambuco.)

Murta Pelluda. *Myrtus bracteata*. Myrtaceas.

Uzos. Adstringente.

Murungu'. Veja-se *Mulungú*.

Murupica. *Sapium*. Euphorbiaceas. (Pará.)

Uzos. Emprega-se nas affecções syphiliticas externas taes como os condylomas indurações, etc. Internamente dá-se na doze de 1/2 a 1 grão do extracto das folhas. A prescrição deste vegetal reclama contelas em consequencia de sua poderosa acção emetica.

Mururé d'Agua. Veja-se *Apé*.

Mururé-rana. Veja-se *Coré*.

Mururé Vermelho. E' no Pará uma Euphorbiacea.

Murutá-caa. Veja-se *Páo Amarello*.

Muruxi. E' no Pará uma Malpighiacea.

Muscadeira. *Myristica fragans*. Myristicaceas.

Musgo Hespanhol. E' a Barba de Velho.

Musgo de New-Orleans. E' a Barba de Velho.

Mussambé de Cheiro. *Daetylena*. Capparidaceas. (Ceará e Alagoas.

Uzos. A raiz é diuretica e anti-bernariaria e muito empregada nas blenorragias.

Mussambé vermelho. *Cleome penthaphylla*. Capparidaceas.

Uzos. Cosido póde comer-se; no estado natural é acre, e ichtyotoxico.

Mutambo priquiteiro. Veja-se *Corendiba*.

Mutumujú. Veja-se *Potumujú*.

N

Najarana. *Quaribea turbinata*. Malpighiaceas. (Pará.)

Uzos. Os fructos não são comestiveis; a casca do tronco é desobstruente.

Nectandra. Genero das Lauraceas.

Entre as especies brasileiras, figurão : *N. mollis*. *N. cymbarum*. *N. puchury*. Todas aromaticas, emmenagogas e carminativas.

Negra Mina. Lauraceas.

Uzos. Aromatica e util em perfumaria.

Neurocarpum. Genero das Leguminosas.

Entre as especies brasileiras contão-se : *N. ellipticum*. *N. cojanifolium*. *N. frigidum*. *N. longifolium*.

Nhambi. *Ottonia*. Miq. Piperaceas. (Amazonas.)

Uzos. Emprega-se como estimulante, sialagoga e diuretica.

Nhambú. *Spilanthus*. Synantheraceas.

E' no Pará e Bahia o *Mastruço*—*spilanthus oleracea*.

Nhandi. *Arthante caudata*. Piperaceas.

Uzos. Os fructos servem de excitantes aromaticos.

Nhandi-papo. Veja-se *Jenipapo*.

Nhanica. *Eugenia nhanica*. Myrtaceas. (Minas.)

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Nhutinga. *Bicuiba* no Paraná.

Noz de Cayenna. E' o fructo da *Aleurites triloba*.

Noz vomica do Brazil. *Strychnos guyanensis*. Mart.

Rouhania. Aubl. Loganiaceas.

Noz vomica. Veja-se *Quina do campo*.

O

Oaçajú. Veja-se *Cajueiro*.

Oacamaty. Veja-se *Uvas do mato*.

Oambó. Aroidéa de casca acre e raiz anti-syphilitica.

Oarari-caraplú. *Moutoea debothria*. Ebenaceas.

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Ochna hexasperma. Ochnaceas.

Uzos. Emprega-se a casca em pó nas ulceras dos animaes ; a infusão contra a picada de insectos e nas dysenterias.

Official da Sala. *Asclepias curassavica*. Linn. Asclepiaceas. (S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Santa Catharina.)

Uzos. A raiz é emetica, purgativa e anti-asmathica na dozo de 20 a 30 grãos em pó. Entretanto a'acreditamos suspeita a vista de factos de envenenamentos por esta planta, que nos tem chegado ao conhecimento. Na India applicão esta planta contra os fluxos mucosos.

Oity. *Brosimum*. Mart. Artocarpaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Martius diz que algumas Artocarpaceas gozão tambem do nome de *Oiti*.

Oity Bravo. *Chrysophyllum ccarensis*. Fr. All. Sapotaceas. (Ceará.)

Oity-mirim. *Pleraginia odorata*. Arr. Chrysobalanaceas.

Uzos. Fructos doces, acidos e comestiveis. E' o *Oiti da praia*.

Olho de Boi. *Buphetalmum*. Synantheraceas.

Olhos de Pombo. E' na Bahia o *Abrus precatorius*.

Orelha de Onça. E' em Cantagallo una *Cesalpinia* de construcção. (Dr. Peckolt.)

Orelha de pão Vermelha. Veja-se *Urupepiranga*.

Orellana. Veja-se *Urucú*.

Oroé. *Phaseolus*. Leguminosas.

Uzos. A raiz tuberosa é alimenticia para os animaes irracionais.

Ortolã Brava. Veja-se *Paracary*.

P

Pacaratópú. Veja-se *Jasmim do Mato*.

Pacaratuçu. Veja-se *Jasmim do Mato*.

Pacari. *Polygala*. Polygalaceas. (Ceará.)

Uzos. Os da *Polygala*. A raiz contém saponina. Applica-se como deterativa.

Pacarivá. *Securidaca*. Papilionaceas. (Norte.)

Pacua-rana. *Canna panduryformis*. Lac. Cannaceas. (Pará.)

Uzos. Emprega-se em forma de clystores nas hemorrhoide.

Painceira Macha. *Chorisia Peckoltiana*.

» **Femea.** » *speciosa*.

» **Imbiruçú.** *Bombax carolinum*.

» **de Seda.** *Asclepias arvensis*.

» **de Oficial da sala.** *Asclepias curassiva*.

» **Carneira.** *Cynanchum rotatum*.

» **Loura.** (cipó de pennas.) *Stipecome peltigera*.

» **de Cipó.** *Phyllanthus albus*.

Pajahú. *Triplaris pajahú*. Mart. Polygonaceas. (Minas e Bahia.)

Uzos. Fornece um oleo resinoso.

Pajurá. E' o *oti-coró* no Rio Negro.

Palleurca. Genero das Rubiaceas.

Entre as mais importantes especies brasileiras contão-se : *Palliurea sonans*. *P. strepens*. *P. tetraphylla*. *P. diuretica*. *P. aurata*, *P. officinalis* e *P. speciosa*.

Palmatoria. Nome de uma *Robinia* e do um *caetus*.

Panamá. *Chenopodium ambrosioides*. Chenopodiaceas. (Pará.)

E' a *Herva de Santa Maria*.

Pananama. *Oxalis tri-bracteata*. Oxaliaceas.

Uzos. Adstringento acidulo. Tambem dá-se a esta planta o nome de *Borboleta do malô*.

Pani. *Arthante geniculata*. Miq. Piperaceas.

Uzos. Emprega-se contra os effeitos do *curare*; excitante e desobstruente.

Pão de ló de Mico. Fructo do *jetaky*.

Páo Amarello. Simarubaceas. (Pará.)

Uzos. A casca é grossa, amarga e tonica.

Páo d'Anjo. E' a *Sapucainha*.

Páo de Azeite. *Ilex aerodonta*. Reiss. *Prinos serrata*. Vill. Aquifoliaceas.

Uzos. A casca é tonica e adstringente.

Páo Branco. *Cordia oncocalix*. F. All. Borraginaceas. (Coará.)

Páo de cachimbo. E' a *Sapucainha*.

Pao de Breu. *Icica glabra* Amyridaceas.

Uzos. Fornece uma resina aromatica.

Pao Caixeta. Veja-se *Parahiba*.

Pao de Colher. *Maytenus rigida*. Celastrinaceas. (Bahia.)

Pao Fedorento. E' a *Gustavia*.

Pao Homem. *Straussea* ?

Pao Judeu. *Pisonia noxia*. Nyctaginaceas.

Uzos. Emprega-se como vesicante.

Pao de Lacre. *Vismia guianensis*.

» » *Vismia lacifera*.

» » » *micrantha*.

Pao Lepra. Veja-se *Páo Judeu*.

Pao de Mocó. *Machærium*. Leguminosas. (Norte.)

Uzos. A fumaça dos ramos queimados produz a cegueira.

Pao de Mocó. *Tipuana auriculata*. Fr. All. Leguminosas.
(Ceará.)

Uzos. Raiz mui feculenta.

Pao Molle. Veja-se *Páo Judeu*.

Pao de Moqueira. *Eupatorium corymbiferum*. Compostas.

Uzõs. Comestivel e empregada contra a diabetes.

Pao de Pernambuco. Veja-se *Páo Brazil*.

Pao de Pilão. *Callistenes minor*. Mart. Vochysiaceas

Pao Podre. Veja-se *Marapuama*.

Pao Podre. Veja-se *Bordão de Velho*. (Ceará.)

Pao de Porco. *Borreria reticulata* Rubiaceas.

Uzos. Emetica.

Pao de Rainha. *Centrolobium paraense*. Leguminosas.

Pao Santo. Dão este nome tambem a *Zollernia*.

Paode Serrote. Veja-se *Páo de Mocó*.

Pao de S. José. *Kielmeyera coriacea*. Sterculiaceas.

Uzos. Emprega-se em banhos como emolliente.

Pao Trombeta. Veja-se *Ambaiba*.

Pao de Vacca. Veja-se *Massaranduba*.

Papaconha. E' o *Itoubú* no Ceará.

Papaterra. *Calyptroma dichotoma*. Melastomaceas.

Uzos. Os fructos são comestiveis ; a planta emolliente.

Papaterra. E' em alguns lugares a *Mata-canna*.

Papo de Gallo. *Aristolochia orbiculata*. Aristolochiaceas.

Uzos. Excitante aromatico.

Papo de Perú. E' no Ceará a *Herva tostão*.

Paracari. *Clinopodium repens*. *Peltonodon radicans*. (Dr. Sisenheiros.) Labiadaceas.

E' a *Ortelã* do mato.

Paracari. *Tetraulatum veronicaforme*. Scrophulariaceas. (Ceará.)

Uzos. A raiz amarga é aromática e peitoral.

Paracatuca. Veja-se *Jasmim do mato*. (Dicionario.)

Para-para-iba. *Triplaris*. Polygonaceas.

Uzos. Ligeiramente adstringente; raiz nauseante e purgativa.

Paraperiuba. *Acacia apiculata*. Leguminosas.

Uzos. Adstringente, amarga e de cheiro desagradavel.

Paricá. *Mimosa acacioides*. Bett. Leguminosas.

Uzos. As folhas contundidas são substitutivas do tabaco. A resina e a casca empregão-se nas affecções pulmonares.

Parictaria Vermelha. *Gesnouinia rubicunda*. Urticaceas.

Uzos. Diuretica.

Párova Preta. Veja-se *Barauna*.

Parurú. *Galphimia lanceolata*. Malpighiaceas.

Uzos. Os fructos, a casca e as folhas são adstringentes e adocicadas e uteis na dysenteria.

Pataguá. *Villarsia macronata*. Nympheaceas.

Uzos. Os do *Aguapé*.

Patavua. Veja-se *Patahé*.

Pataqueira. Scrophulariaceas.

Uzos. Emprega-se como excitante e aromática.

Patuatiba. *Guarea*. Meliaceas.

Uzos. Emprega-se como emeto-cathartica.

Pecacuem. *Cissampelos glaberrima*. S. H. Menispermaceas.

E' a *Caapeba*.

Pechi-y. *Chaptalia* Compostas.

Uzos. Os fructos fornecem óleo e as sementes sebo.

Pega Pintos. (Ceará.)

Uzos. Anti-blenorrhagico.

Peipeçava. *Scoparia dulcis*. Malvaceas. E' a vassourinha.

Pellado. *Acacia*. Leguminosas. (Rio de Janeiro.)

Pematim, *Sclerolobium rubiginosum*. Mart. Leguminosas.

Penãiba. Espécie de *Hippomane*.

Ponto do Macaco, *Pithecoctenium*. Mart. Bignoniaceas.

Uzos. Empregado como depurativo.

Pentleira, *Curatella americana*. Dillineaceas.

Uzos Os da *Curatella*.

Pepino do Mato, *Sicyos*. Cucurbitaceas.

Uzos. Na opinião do Sr. Dr. Peckolt a raiz é diurotica e os fructos preparados com vinagre, comestiveis.

Pepino do Mato, *Ambelania acida*. Apocynaceas. (Pará.)

Uzos. Emprega-se o succo leitoso em forma de emplastos nas dores do estomago e articulares.

Pepino de S. Gregorio. E' uma *Momordica*.

Pepino da Terra. Veja-se *Pepino do Mato*.

Pequihy. Veja-se *Vinhatico*.

Pequohy, *Caryocar*.

Pera de Advogado. E' o fructo do *Abacateiro*.

Percegueira. Veja-se *Gingeira*.

Peré, *Avicennia nitida*. Jacq. Myoporinaceas.

E' a *Sereiba-tinga*.—*Marigue Branco*.

Pereiro, *Aspidosperma pyrifolium*. Mart. Apocynaceas.

Uzos. A casca é empregada como tonica e anti-febril, e insecticida. E' mui util para combater a affecção pedicular dos animaes e destruir os acarídeos (*sarcoptes e ixodes*.)

Periná. Dá-se este nome tambem a *Atalea compta*.

Periparoba, *Piper umbellatum*. Vell. *Arthante eucaliptifolia*. Piperaceas.

Uzos. Alem dos indicados no Diccionarie a raiz emprega-se nos casos de leucorrhéa o menorrhéa.

Periquiti. E' nas Alagôas o *Abrus precatorius*.

Perobinho do Campo, *Acosmium*. Schott. *Leptolobium elegans*. Vogel. Leguminosas. (S. Paulo.)

Uzos. A casca é amarga o util nas epilepsias. A tintura é anti-syphilitica.

Perpetua. E' a raiz do *Padre Salerma*.

Peruci, *Berrunna lanceolata* Lac. Rubiaceas.

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Potumarana. Veja-se *Pitumarana*.

Philodendron. Genero das Aroidaceas.

As mais importantes especies brasileiras são *Philodendron imbr.*
P. hederaceum. *P. arborescens*.

Pijerica. Veja-se *Pimenta do Sertão*.

Pilea Muscosa. Urticaceas (Bahia.)

Uzos. Emprega-se o succo contra a dysúria.

Pitumarana. *Lasianthus serratus*. Gentianaceas.

Uzos. Emprega-se como excitante e em cataplasma nos tumores indolentes.

Pimenta do Pará. Dá-se este nome tambem ao *Agrião*.

Pimenta Pacoin. Veja-se *Pimenta ordinaria*.

Pimenta de Macaco. *Cleome serrata*. Capparidaceas.

Uzos. De sabor estimulante e util no escorbuto.

Pimenta Negra. Veja-se *Pimenta da Índia*.

Pindaíba Preta. *Gualteria nigra*. Anonaceas.

Uzos. Emprega-se como excitante aromatica.

Segundo Martius o peso da madeira fornecida pela *pindaíba preta* é de— 0,839 e isto depois de vinte annos de consorvação em lugar secco.

Pinha. E' na Bahia a *Atta* do Ceará e a *Fructa de Conde* do Rio de Janeiro.

Pinó. Nome com que designão uma especie de urtiga; algumas vezes o *Ricinus* e outras o *Cnidoseulius*.

Piperioca. *Cyperus piperioca*. Cyperaceas. (Amazonas.)

Uzos. Emprega-se como perfume. A batatinha ralada e infundida em vinagre serve para fomentações aromaticas.

Pipi. *Petiveria tetandra*. Phytolacaceas.

Uzos. Os banhos e a tinctura alcoolica do *pipi* são excellentes nos casos de paralyrias e rheumatismos. Serve tambem para tinguijar o peixe. O Sr. Dr. Capanema julga com o Dr. Sisneiros esta planta capaz de produzir o idiotismo, quando ingerida em doze elcvada.

Piravá. *Pterygota brasiliensis*. Fr. All. Sterculiaceas.

Uzos. E' rica de potassa.

Pitangatuba. *Phyllocalyx edulis*. Myrtaccas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. Os fructos são comestiveis.

Pitaya. Cucurbitaceas.

Pitombeira. *Sapindus edulis*. Sapindaceas.

Os fructos são comestíveis ; as semontes envenenão os perús o d'ahi o epitheto de *Meleagriner* que dá Arruda a esta planta. As raizes são venenosas. A casca é ichthyotoxica. Não se deve confundir este *sapindus* com o *S. divaricatus*, cujos fructos são tambem ichthyotoxicos.

Pitomba de Leite. *Bumelia*. Sapotaceas.

Pixirica. *Mnianga*. *Clidemia frutescens*. Melastomaceas.

Uzos. A planta é ligeiramente adstringente. Os fructos são comestíveis e ennegrecem os labios.

Poaya de Minas. *Manettia cordifolia*. Cinchonaceas.

Uzos. A casca da raiz é excellente contra as hydropesias e dysenterias. Dá-se na doze de 2 a 3 grãos.

Poejo do Campo. *Keitea denudata*. Labiadaceas.

Uzos. Emprega-se como aromatica.

Poejo da Praia. *Centrospermum xanthioides*. Compostas.

Pojamarioba. No Pará dá-se este nome a *Herva de bicho* do Maranhão.

Porovaçú. Veja-se *Perobinha do Campo*.

Porova-mirim. Veja-se *Perobinha do Campo*.

Portulaca Fluminense. *Talinum patens*. Vell. Portulaceas.

Uzos. Os da *Beldroega*. As sementes infundidas em vinho são emmenagogas.

Poterio. *Neurocarpus longifolium*. Mart. Papilionaceas.

Uzos. Toxica.

Pracari. Veja-se *Visgueiro*.

Pragoá. *Banisteria emetica*. Malpighiaceas.

Uzos. A raiz é cathartica.

Preha-caa. *Vernonia subrepanda*. Pers. Compostas.

Uzos. Julga-se a semente anti-helmintica.

Procaxi. Veja-se *Visgueiro*.

Pucahy. *Phyllanthus*. Euphorbiaceas.

Uzos. Os do *Timbó*.

Punú. *Urera punú*. Urticaceas.

Punu-mirim. *Urera aurantiaca*. Urticaceas.

Purga de Amaro Leite. Veja-se *Jalapa do Brazil*.

Purga de Gentio. No Rio de Janeiro é o *Andaagú*.

Purga João Paes. E' uma *Vandellia* no Norte.

Purga de Leite. *Excacaria agollocha.* Euphorbiaceas. (Ceará.)

Uzos. Emprega-se como cathartica.

Purga de Quatro patacas. *Allamanda violacea.* Apocynaceas.

Uzos. Emprega-se como emeto-cathartica.

Purgueira. Veja-se *Pinhão*.

Purunga. Veja-se. *Aboboreira Carneira*.

Q

Quaparaiva. *Lecythis.* Lecythidaceas,

Quaró. *Galphimia brasiliensis.* Malpighiaceas.

Uzos. Emprega-se como adstringente.

Quebra Facas. *Croton fragrantissimum.* Euphorbiaceas.

Uzos. Emprega-se como aromatica, anti-syphilitica e anti-rheumatica.

Queralba. *Bignonia.* Bignoniaceas.

Quichabas. *Bumelia sartarum.* Fr. All. Sapotaceas (Ceará.)

Quijaba. E' uma especie de *Páo de colher*.

Quijaba. Leguminosa. (S. Paulo e Minas.)

Uzos. Emprega-se como adstringente.

Quimquina. *Ticorea jasminiflora.* Rutaceas.

Uzos. Emprega-se contra as bobas e nas febres.

Quina Branca. *Strichnos-pseudo-quina.* Loganiaceas.

Quillaya. *Quilaya brasiliensis.* Rosaceas.

Uzos. Emprega-se como sabão; 60 grammas de casca pulverisada são sufficientes para limpar um vestido, tirando toda a sorte de manchas em roupas de lã. O pó é esternutatorio.

Quimboa. Veja-se *Betonica*.

Quina do Campo. *Hortia brasiliiana.* Rutaceas.

Uzos. Tonica e levemente adstringente.

Quina Cruzeira. *Strichnos trinervis.* Loganiaceas (Rio de Janeiro.)

Uzos. Narcotica acre.

Quina do Pará. *Casearia adstringens*. Sapindaceas.

Uzos. Tonica e alguma cousa adstringente.

Quina de Porto Alegrê. E' a *Exostema formosum*.

Quinaquina. *Coutarea*. Rubiaceas.

Uzos. Emprega-se mais como adstringente do que como tonica.

Quina do Rio Negro. *Cinchona formula*

» » » » » *lambertiana*.

» » » » » *bergeniana*.

» » » » » *macrocmenia*.

Quiya-açu'. *Capsicum cordiforme*. Solanaceas.

Uzos. Excitante, piperacea e aromatica.

Quiya-uca. *Capsicum annuum*. Solanaceas.

R

Rabo de Arara. *Norantea*. Lac. Capparidaceas. (Pará.)

Rabo de Bugio. *Alsophylla armata*. Filiaceas (1).

Uzos. Emprega-se como mucilaginoso e ligeiramente adstringente.

Rabo de Rapoza. Veja-se *Tapira-pecú*.

Rabo de Rojão. *Tagetes graveolens*. Synantheraceas. (S. Paulo.)

Uzos. Emprega-se como aromatica, diuretica anthelmintica.

Rabugem. *Platimiscium*. Papilionaceas.

Raiz Amargosa. *Calloptisma amplexifolia*. Mart. Gentianaceas.

Uzos. Os da *Centaurea*.

Raiz de Lorangeira. Veja-se *Jalapão*.

Raiz do Sol. *Aristolochia paraensis*. Aristolochiaceas.

Uzos. A planta é aromatica, camphorada, e util na amenorrhêa. A infusão das folhas contundidas combate a ophthalmia chronica.

Rama de Prata. *Cratilia*. Leguminosas.

Rama de Vaqueiro. E' a *Bauna* do Ceará.

Rato do Bugio. E' o *Páo Cardoso* no Ceará.

Retirante. E' o *Picão da Praia* no Ceará.

(1) Sahio no Diccionario por engano, aromatica e Myrtaceas.

Ribeiria. Genero das Santalaceas.

Entre as mais importantes especies brasileiras temos: *R. calophylla*, *R. cupulata*, *R. elliptica*, *R. calva*.

Rompe gibão. *Bumelia sartorium*. Sapotaceas.

Uzos. A casca é amarga e febrifuga. O fructo é carnoso.

Rosteirinha. Veja-se *Aputi-a corauba*.

Ruti. Veja-se *Parreira brava*.

S

Sabina de Minas. *Erythroxylon*. Erythroxylaceas.

Uzos. Emprega-se como purgativa.

Sabocira. *Cestrum*. Solanaceas.

Sabonete de Cipó. *Couania*. Rhamnaceas.

Uzos. Estomachica.

Saçuaya. Veja-se *Herba grossa*.

Sageta. Veja-se *Mauritia vinifera*.

Sal do Brazil. Veja-se *Fedcgoso*.

Salsa. E' no Ceará o *Assa peixe*.

Salsa do Brazil. *Smilax papyracea*. Smilaceas.

Salsa do Ceará. *Ipomea capripede*. Convolvulaceas.

Uzos. Serve de forragem.

Samambaia. *Mertensia dichotoma*. Borraginaceas.

Samauva. *Eriodendron samauva*. Mart. Sterculiaceas. (Amazonas.)

Uzos. Fornece uma gomma succedanea da gomma arabia. A sêda que envolve as sementes são excellentes para colxões, travesseiros, etc.

Sambaibinha. *Davilla elliptica*. Dilleniaceas.

Uzos. Emprega-se como detergente.

Sanamunda. Veja-se *Herba tostão*.

Sanandú. Veja-se *Mulungú*. (Nova Friburgo.)

Sananduva. E' o *Mulungú* em S. Paulo.

Sanandui. *Erythrina falcata*. Benth. Leguminosas.

Uzos. Os mesmos da *E. cristá galli*.

Santa Luzia. E' em Maricá o *Mata-olho*.

Santoelira. Veja-se *Centaurea fluminense*.

Sapó. Esta graminea alem das propriedades apresentadas no Dicionario é sudorifica e diuretica.

Sapucaia. Designa-se tambem com este nome uma leguminosa—*Phaseolus caracalla*.

Sapucainha. *Capotroche brasiliensis*. Endl.

Uzos. Os da *Sapucaia*.

Saputá. *Tontelea*. Hippocrateaceas (S. Paulo.)

Uzos. Empregão-se os fructos como mucilaginosos e adoçantes.

Sebiu-uva. Veja-se *Sucu-uba*.

Seifaminea. *Paçobeira*.

Senne do Campo. Veja-se *Carobinha*. (Minas.)

Sericuba. Veja-se *Páo de Maqueira*.

Serralhinha. *Sonchus oleraceus*. Chicoraceas. (Pará, Maranhão.)

Uzos. Bom desobstruente nas hepatitis chronicas e infartes glandulares.

Sete cascos. Veja-se *Mão visinho*.

Sete sangrias. *Cuphea ingrata*. Lythraceas.

Uzos. O cosimento ó util nas febres intermitentes.

Sida. Genero das Malvaceas.

Entre as mais importantes especies temos : a *Sida carpinifolia*, *S. rhombifolia* e *S. multiflora*.

Silva d'Agua. Veja-se *Sensitiva*.

Silva Maritima. Veja-se *Silva da praia*.

Simiri. *Hymenaea courbaril*.

Sipoatas. *Anthodrom*. Hippocrateaceas.

Solidonia. E' no Amazonas a *Herva tostão*.

Soroco. *Sorocea*. Urticaceas.

Styrax. Genero das Styracaceas comprehendendo entre as especies brasileiras a *reticulata*, *ferruginea* e *aurea*, fornecedoras de uma resina semelhante ao verdadeiro incenso.

Sabigenguva. E' o *Vinhatico Testa de Boi*.

Sucuaya. Veja-se *Herva grossa*.

Saçu-uva. No Pará é a *Ucuuba*.

Sucuva. No Pará é a *Ucuuba*.

Sué. Veja-se *Herva moira*.

Sumaré. *Cyrtopodium brasiliensis*. Radd. Orchidaceas.

Uzos. Excelente peitoral. Suas folhas soccadas são supurativas.

Suma-uma. *Chorisia ventricosa*. Mart. Sterculiaceas.

Sururu-cujá. *Passiflora albida*. Kern. Passifloraceas.

Uzos. Emproga-so nas febres intermittentes.

Suzena. Veja-se *Cardamomo do mato*.

T

Tabaco Bravo. Veja-se *Pitumarana*.

Tabaco do Diabo. Veja-se *Isca do mato*.

Tabaco de Judeu. Veja-se *Isca do mato*.

Taboca-cem. Veja-se *Canna de assucar*.

Tajassu-ubi. *Hyospathe elegans*. Palmeiras.

Tamacoaré. Oleo fornecido por uma *Laurinca* e empregado com proveito nas empigens, pruritos, e em fricções no reumatismo.

Tamboril. *Enterolobium timbouva*. Leguminosas. (Coará.)

Uzos. A casca sorve para tinguir.

Tamujá. *Serjania tamujá*. Vell. Sapindaceas.

Uzos. Adstringente, applicada topicamente.

Tangaraca. *Rubia noxia*. Mart. Rubiaceas.

Uzos. Emprega-se como purgativo violento em dozes minimas ; em dozes elevadas torna-se um poderoso toxico.

Tangaraca. Dá-se este nome tambem á *Herba tostão*.

Tangaraca. *Eclipta palustris*. Vell. Compostas.

Uzos. Planta mucilaginoso e adstringente.

Tapaciriba. *Pisonia alculina*. F. All. Nyctaginaceas. (Rio de Janeiro.)

Uzos. A raiz é emeto-cathartica.

Taperiba. *Spondias mangifera*. Anacardiaceas.

Uzos. Os fructos são venenosos.

Tapoçoca. Veja-se *Tentis*.

Tapyra-coynanã. *Cassia sclerocarpa*. Vog. Leguminosas.

Uzos. Topicamente são as folhas mondificativas ; a raiz é desobstruente.

Tararucá. *Cassia occidentalis*. Leguminosas. (Bahia e Goyaz.)

E' a *Pajomarioba*.

Taroman. *Cytherexylon cinereum*. L. Verbenaceas.

Tarumá. *Gerascanthus*. Cordiaceas. (Rio de Janeiro e S. Paulo.)

Tarumá. *Vitex tarumá*. Verbenaceas.

Uzos. Os fructos são mucilaginosos e peitoraes, e a casca da arvore é empregada nas affecções syphiliticas.

Tassuana. Veja-se *Anil açú*.

Tatajuba. *Maclura*. (Pará.)

Tatayouba. *Caryocar glabrum*. Rhisobolaceas.

Fornece oleo como o *Piqui*.

Tatuatú. Veja-se *Mata cannas*.

Tayuya de Goyaz. *Drupania racemosa*. Cucurbitaceas.

Uzos. Cathartica.

Tayupa de S. Paulo. *Drupania racemosa*. Cucurbitaceas.

Uzos. Os dos *Tayuyús*.

Tejuiba. *Adenoropium opiferum*. Mart. Euphorbiaceas.

E' o *Jalapão*.

Tembaitar-iba. *Xanthoxylon langsdorffii*. Mart. Xanthoxylaceas.

Uzos. A raiz amarga aromatica é ligeiramente acre, emprega-se contra a odontalgia.

Tendy-iba. E' um *Spilanthus*.

Tentos. Dá-se este nome tambem ao *Mulungú*.

Tepi. E' no Maranhão o *Mucura-casa* do Pará.

Tetim. *Vitex arbustina*. Verbenaceas.

Uzos. Emprega-se em banhos nos edemas. Martius acredita que esta planta é a *Guira*.

Ticoria Jasminiflora. Rutaceas.

Uzos. Contra as bobas.

Tikira. *Lirio amarello* do campo.

Timbauba. Veja-se *Tamboril*.

Timbiucatu. Veja-se *Mangaba*.

Timbó de Boticario. *Lonchocarpus*. Peckoltii. Leguminosas.

Uzos. A raiz serve para matar os piolhos dos animaes. A casca é empregada, moída e em cataplasma contra as splenites, hepatites e affecções do utero.

Timbó de Peixe. *Serjania cuspidata*. S. H. Sapindaceas.

Uzos. Serve para tinguijar.

Timbó de Raiz. *Campocoma fluminensis*.

Uzos. Ichtyotoxica.

Timbo-titica. *Cissus cordata*.

Uzos. As folhas são acres e applicadas topicamente a pressão a suppuração dos tumores. Mata o gado e entorpece o peixe.

Tingui. *Phaeocarpus*. Mart. *Mahonia*. S.H. Berberiaceas. (Minas.)

Tingui. *Jacquinca*. Theophrastaceas. (Bahia.)

Uzos. As folhas servem para tinguijar, os fructos são venenosos. Parece ser o *Phaeocarpus* de Martius.

Tingui. de Cayena. Veja-se *Anil bravo*.

Tingui das Piranhas. E' o *Cipó de macaco* no Ceará.

Tingui da Praia. E' o *Barbasco* no Ceará.

Tipu. *Tipuana speciosa*. Leguminosas. (Ceará.)

Uzos. A raiz é venenosa; lavando-se porem a fecula que ella contem pode prestar-se a alimentação.

Tiririca. *Scleria brasiliensis*. Graminaceas.

Uzos. Emmenagoga e estomachica.

Tomba. E' em Cantagallo a *Betala de purga*.

Tortulho. Veja-se *Urupé*.

Trabuco. E' o *Sapucaieiro*.

Tranabeta. *Siderodendron inflorum*. Vahl. Rubiaceas.

Uzos. Adstringente e tonica. A madeira é de cerne duro e compacto.

Trapia. (Ceará.) *Cratava*?

Uzos. A casca da raiz é acre e rubefaciente. O cozimento é aperitivo.

Trevo de Boi. E' a *Commelinia vulgaris*.

Tripa de Gallinha. *Phascolus caracalla*. Leguminosas. (Rio de Janeiro.)

Tuai-ussu. Veja-se *Tuaupoca*.

Tuaupoca. *Plumieria bicolor*. Apocynaceas.

Uzos. Toxica.

Tuaupoca. *Trichilia glabra*. Manso. Meliaceas.

Uzos. Emeto cathartica.

- Taiatussú.** Veja-se *Utuapoca*.
Tuinantuba. Veja-se *Arvore de coral*.
Turari. *Couratari*. *Lecythidaceas*. E' o *Tauary*.
Turiuva. *Licania*. Cham. *Chrysobalanaceas*.
Uzos. Os da *Carapeirana*.

U

- Uacá.** *Chrysophyllum ramiflorum*. M. *Sapotaceas*.
Uanacu'. Veja-se *Urucu'*.
Uariuva. Veja-se *Tatagiba*.
Uba. *Gynerium* *Saccharoides*. *Saccharus sagittarius*. *Graminaceas*.
Uzos. Emprega-se como excitante e diuretico.
Uba-caya. *Costus spicatus*. Rose. C. *arabicus* Vell. *Zingibereaceas*.
Uzos. O succo é acidulo e refrigerante e empregado nas nephrites, gonorrheas, etc.
Ubatan. Veja-se *Gonsalo Alvos*.
Ubatan. *Astronium fraxinifolium*. *Terebenthinaceas*.
Uzos. A casca é applicada como meio a lstringente.
Uba-uçú. Veja-se *Páo Pereira*.
Ubi-miri. *Gconoma acaulis*. *Palmeiras*. (Pará.)
Uixe. *Myristica platysperma*. *Myristicaceas*.
Uzos. Os da *Myristica officinalis*.
Umburapuama. Veja-se *Manacú*.
Unacú. Veja-se *Urucú*.
Unha de Gato. *Phitecollobium*. Benth. *Leguminosas*.
Uzos. A gomma produzida por este vegetal é muito empregada entre os indigenas.
Upas. *Antiaris toxicaria*. *Artocarpaceas*.
Uzos. Poderoso toxico.
Urape-guaçu'. Veja-se *Jitó*.
Urapoca. *Myrsinia*. *Myrsiniaceas*.
Uzos. Goza de propriedades acres.
Urari. *Paullinia cururú*. *Sapindaceas*.
Uzos. Toxica energica.

Urari. Veja-se *Curare*.

Urari-uva. *Strychnos toxifera*. Schomb. Loganiaceas.

Uzos. Poderoso veneno.

Urauna. E' o *Miscolobium violaceum* de Vogel.

Uricana. E' a *Geonoma*.

Uritimpeva. *Enterolobium*. Leguminosas. (S. Paulo.)

Urtiga Brava. *Urtica*. Urticaceas. (Paraná.)

Uzos. A infusão da casca na doze de 2 chcaras por dia é um bom anti-syphilitico.

Urubús. *Spondias tuberosa*. Anacardiaceas (Ceará.)

E' o Joazeiro.

Urucaya. Veja-se *Canna de macaco*.

Urundeuva. Veja-se *Aroeira do Ceará*. (S. Paulo.)

Urundey-pita. Veja-se *Aroeira do Ceará*.

Urupe-piranga. *Boletus sanguineus*. Fungaceas.

Uzos. Empregado em gargarejos na angina tonxillar e em xarope nas affecções catarrhaes.

Urupetin. *Lophophytum mirabilis*. Lophophytaceas.

Urutiupeva. E' a *Timbauva*.

Utuaamba. Veja-se *Marinheiro de folha larga*.

V

Velame do campo. *Echites*. Euphorbiaceas. (S. Paulo.)

Uzos. Os mesmos do *Croton fulvus* e *C. campestris*.

Velame de Cheiro. Veja-se *Alcamphoreira*.

Velame do Mato. Veja-se *Braço de Preguiça*.

Viba-océm. Veja-se *Canna de assucar*.

Videira. *Vitis vinifera*. Viniferaceas.

Uzos. As folhas são adstringentes e empregadas nas diarrheas. A seiva (lagrimas) é um bom anti-ophtalmico. Os fructos sazoados são acidos e adocicados e fornecem vinho e alcool. As passas são peitoraes.

Vurapiá. E' o *Rhamnus iguaneus*. Rhamnaceas.

Uzos. Suas drupas são purgativas.

W

Wapa. *Eperua falcata*. Cesalpiniaceas.

X

Xiry-caa. E' uma *Piperacea*.

Xucuba. E' a *Plumieria bicolor*.

Y

Yito. Veja-se *Utuauba*.

Ymira-ita. E' a *Cesalpinia ferrea*.

Ymira-jua'. E' um *Zizyphus* no Piahy e um *Vitex* em S. Paulo.

Ymira pinima. Veja-se *Moirá pinima*.

Ymira-ataia. Lauraceas.

Ymira-tinga. *Aspidosperma*. Apocynaceas.

Ymira-una. E' a *Dalbergia miscolobia*.

Yuvia. Veja-se *Castanheiro* do Maranhão.

ERRATA

PAG.	LINHAS.	ERROS.	EMENDAS.
2	27	Stachytarpha.	Stachytarpheta.
5	14	Asclepiadaceas.	Asclepiaceas.
9	11	Trapogon pratense.	Trapogon pratensis.
"	23	Stryphnodendron.	Styphnodendron.
10	26	Myristaceas.	Myristicaceas.
14	6	"	"
24	18	Pluimeri.	Plumieri.
38	5	Bumelia.	Bumelia.

e algumas outras de facil correccão.



2
Ann. Min.

